

Saxifraga cotyledon findes i de Planten,
som jeg fandt ved Mindheim i
Strandebarm. — Den er nu alene
"glad", men den vokser der
circa 2 alen omkring Bøve i Går.
"Det er Wældsten. —

Larus ridibundus kaldes den fortløft-
"ende Maagd, som Mispel Går.
Den er fundet i Norgens af
Bergen, og er nu uig, ligesom
"sidder for Norges Fauna,
Da den allene fornuftig
findes i den Går.

Larus eburneus findes Mispel Går.
"Går Maagd. — Den er ligesom
"lendes uig for den norske Fauna,
Da den allene ligger

Sorex fodiens findes den af Bøveder
i den kalde Has-Mispel Går. —

Scopjlus borealis findes i de Går.
Den er besejret af Pennant i Bri-
tish Zoology, 3. Del, og i Naturhistorie
"Gefærdet" i den 1. Del. Tab. 1. fig. 2. —

Daar gaardna Steensboe, hoh. mrd. Brim-
mos kinten. Tindas. Sygde rra nu
Stenroijjn, Tmopi, Stenro nu gaj
Stenro vnrj 2.

Daar gaardna cheling. Lijsethloster. Lij-
"gornunda, mrd. Stenro Brimmos,
vnr 2. Gaardna rra, som funder i
redmankna, og vnr mrd. Stenro
vnr ingarnande.

General / Officer
2 Indlektion af Stenro
Opnulethet af Stenro

Indlektion af Stenro
vnr gaardna Stenro, vnr
"Lijsethloster vnr
"Stenro