U. B. BERGEN
Ms. 200a

Skandinaviens Amphibier.

Udrag af S. Nilssons skandi-
naviske Fauna, 2den Deel. 1842,
som et Haandskrift paa Reisen.

Skandinaviske Amphibier.

Fortegnelse:

Lacerta agilis.
——— vivipara — norsk. Firfisted.
Anguis fragilis. — " Blindorm, Hobbers Lange
Coluber natrix. — " Buorm, Gaardorm,
——— levis,
Vipera berus, . . " Flugorm, Hulstrøming.
Hyla viridis, . . " Løvfrø,
Rana temporaria, . " Frosk, Løs.
——— esculenta,
——— arvalis,
Bombinator igneus. " Klokkefrø.
Pelobates fuscus,
Bufo vulgaris, . . " Groe.
——— variabilis, . " Grønflekket Padde.
——— calamita.
Triton cristatus, " Større Vand-Øgle.
——— alpestris, " Brun-Øgle.
——— punctatus, " Lille Vand-Øgle?

Lacerta muralis ? Linn.

1. Lacerta agilis, Linn. Hovedet noget kort og tilspidset Hale. - Hovedet overtaa flat, med en aflang morkelig Fordybning over hvert Øie; Snudespidsen stumpet og afrundet. Overkjæben lidt længere end Underkjæben. - Det øverste Øjenlaag noget større end det øvre og dækker hvidlen belagt med en Krands af 5 Oplatte Blader. -

under Halsen, normalt Brystet, et langt Halsskrave — en Tverrad af 6-8 firkantede Plader, hvilke den midterste størst. — Brystet og Skrave belagte med 6 langstrakte Plader eller store Tværplager, af hvilke de 2 midterste, smalleste, ved Halsen, foran paa Brystet og næsten firkantet, pladedannet Felt. — Ben: Foer, med sammentrykt Laar, krumme og spidse Kloer — 1ste Par paa Halsen, de andre 3 uden Klør, paa lange som 1ste med Klør, Fingen spids og spids Vægkloet. Skjælen fra Analaabningen omtrent 1½ saa lang, som hele Kropspen med Halsdæk. — Stør, omtrent 10 C. lang. — Farven: oven graabrun med lidt, over Lænden bredest, brunt Bånd langs Rygsøn, og mørke Pletter derfra, hvori en hvid Strog, paa Siderne en Rad firkantede, rette Pletter, med en hvid Strek i, og nedenfor denne Rundom en eller 2 Rader af kantede, smaa Pletter. — Under-Kropspen gulgraae, grønagtig, med rette Smaapletter. — Halsdæk ovenpaa ligeledes, men med uregelbundne Pletter paa Siderne, Paa Skjælene Sider, en langstraaende mørk Strog med en Rad hvide Pletter paa, langs den øvre Kant. — Benene ovenlig, uden hvid-pletted. — Øjne gulrøde. Kloerne begbrune, Hammen Sider grønne. —

En Varietet har rødbrun Ryg, Opholder sig i Sandig Jord, ved Bække-

2. Talpa vivipara. mørkbrune og mere langstrakt, end T. agilis, med længere og langsommere afsmalnende Hjert. Øjenlaagene ligesom hos hiin. — Hjerten, ganske rund, ikke sammentrykt, har ofte hos Hannerne bagenfor Øiet mørkere Plet end ved Øiet, og har da paa Siderne ligesom et Belte, og en langsgaaende Linie paa Ryggen. Bagenfor denne Belte er Hjerten jævnlig lys til Siden, hvorefter den lidt efter lidt tager af. — Hjerbedækningen og Fødderne ere som hos T. agilis. — Hele Længden 6T, Halen næsten Hjertens Længde 2/3. — Farven: Overkroppen brun, med eller uden en svag Strøg langs Midten af Ryggen fra Nakken til Halerod, paa hver Side af Ryggen en langsgaaende Rad af hvidagtige Prikker, enhver ind- eller udad begrændset af en liden sort Plet, stundum løbe paa Halen de hvidagtige Prikker sammen til en Langstrøg. Siderne mørkbrune med 2 Rader hvidagtige Prikker, Hjerten som Ryggen, med paa Siderne 2 Rader hvidagtige Prikker, til Halen skantede med Sort. — De nedre Dele af Kroppen, og Hovedet samt Halen hvidagtige, nogen lysladne. Brystet

og Skaven hos Hunnen hvidagtige
spillende i Gyrbrun, med eller uden
sorte Flekker. Bagbenenes Underre-
de og Hjertens hvidagtig med sorte
sorte Flekker, der længere ude paa
Hjerten danne 2 Tværbånder. Hals,
Hannen er Brun, Skav, og Hjerten
under Roden gulrøde eller pomme
rantfarvede.

Der gives Varieteter. —
Den lever i Bjerg- og Skov-Bjæ-
der, og paa Kjær- og Enge-Aarke,

3. Angvis fragilis L. Blindorm, Kob
berslange. Lang, tynd, næsten cylinderformig, bøi, me-
get glat og glindsende; Hjer-
ten lang, længere end hele Krop-
pen med Hovedet. — Det sidste ogsaa
net afrundet, ikke bredere end Halsen
ovenfra skaftagtigt. Næsen paa Sider-
ne vertikal flat, Næsespidsen
bøi rundet, med de smaae runde
Næseborre ved dens Sider. Munden
nesten lige, endes noget bagom
Øjets Bagrande. — Det undre Øjen-
laag, tyndt med Skyldedannelse.
Øreaabningen skjult af Skjæl. Hele
Hovedet skydedækket, af hvilke to
paa Hjerten danne en rhombeide Skade; ingen Halsfure. — Hele Krop-
pen skjoldskjæl; Analaabningen

dobbelt med en Tværrad af 4, i Øgre Ende frie, Skjøl; Stjerten stumpt tilspidset. — Farven: oven brungraae, eller brun eller kob. „berrød, altid glindende. Siderne kobberbrune, med en med en mer „kjære Skandt overalt. en svagtgy „rae Strøg fra Næbbet Langs „Siden af Rygen, stundom kun „lidet synlig. — De undre Dele af Kroppen Askblaae eller svagblaa „agtige, hvilken Farve sønderluden er langstribet.

Varietet: oventil og paa Sider. „ne eensfarvet gradbrun eller kob „berbrun, undertil hvidagtig graae. Længden: 15"—16 Tommer.

Opholder sig især blandt Bøgene paa høylendt, tør Mark, i Have og blandt nedfaldet Løv.

Ukjendelig, skjør og brækkelig let itu, om man staaer den; — føder levende Unger, 2½ T. lange, ~~optrent~~ i Aug; eller Septbr.

4. Coluber natrix L. Biorm, Guldøring L.

Hovedet aflangt ogformet, bredt og flad; Næsen stumpel og tvær; Kroppen langstrakt, afsmalnen „de foran med Hovedet men bagud løbende ud i en langsomt aftagende spids Stjert som udgjør ⅓ af Kroppens

hele Longde. — Overtil og paa
Siderne er Kroppen belagt med
imbrierede Skjel, langs Ryggen
lancetlige, og langs Ryggens
Kiste forsynede med en Kjøl, men
Sideskjellene, bredere, ovale og
„ rette. — Underkroppen belagt
med hele Tvorpladser, som i En-
„ derne ere opadbøjede og ret
„ vinklede. — Analpladen dob-
„ bel, og Pladerne paa Stjertens
undre Side udgjøre en Rad,
hvorhos Skjellene paa dens
„ øvre Side ere sexkantede og for
den største Deel glatte.
Farven: ovenfra sort, eller graae
„ sort, uden Tegninger, under sort
„ blaae, langs hver Side af
Ryggen med en Rad af hvide
„ tige eller grøngule Tvorpletter,
af hvilke hver anden er læn-
„ gere og bredere; Gjæl- og Fin-
„ ved paa Undersiden hvide;
4-5 kantede hvide Pletter langs
Overkjæben; et gruelt eller
hvidt Tværbaand udgaaende
fra Halsen paa Siderne af
Nakken og overalt afbrudt.
N: En Afforandring i denne dette
Baand ved Nakken. — En an-
„ den Afforandring er oliven-
„ agtig graae, med smaae runde
„ sorte Pletter i fire alternerende
Rader, men findes nok ej hos os. —
Longden 2 Alen,
altsaa den største Orm hos os.
Opholder sig helst paa lavlendte
og vaade Steder. —
Ikke giftig.

5. Columbervis. – brunagtig med
sortagtige, i Rader stillede, Flekker
langs Ryggen og et mørkt Tver-
bånd over Nakken; ovale Øjne
med rund Pupil, – Øjenlaagene smaa
trekantet, kantet trind, under Øjen-
lågene. – Skjæret, som er lysrødt,
er kort langstrakt af og er rødt
i Enden, udgjør ½ af Hele Næbbet.
Overlæbe og paa Siderne er Næb-
bet bedækket med ovale Skjæl,
de paa Siderne bredest og rund-
formige, alle slette og glatte;
Neglen paa Overnæbet er liden og sort. –
Underlæbe belagt med hele, i Under-
læbens opadbøjede, overlapper. – Anal-
fjedren dobbel, og paa Skjæftens
Underside er en dobbel Rad af Fjedre.
Farven: Hele Ormen glat og glindsen-
de, overst og paa Siderne af Brystet
tegnet ovenpaa med i Rader lagte,
rundagtige mørkebrune eller sort-
lædne Flekker. – Paa Øjet en
bred, sortagtig Langstrek, der gaaer
frem imellem Øjnene. – En smal,

sort Stoog paa Vinden bagom Øjnene
løber tilbage paa Siden af Halsen og
forlöber i en meer eller mindre lige
lig Red af Pletter langs Kroppens Siver.
De undre Dele af Kroppen enten
cinoberröde, eller gulagtige med eller
uden Pletter, eller staalgraae og
tvraglede med gult langs Siderne,
Øvrig rödgul. — Mund og Tunge hyd
röde.
Længden: 2 Fod, 3–4 Tom.
Opholder sig helst paa höjlendte, tørre
Klippefulde, med Buske eller Lyng be
voxne Steder, og kan gaae op i Vrøer hvis
som den klatrer og løber Snore og
Vinge.
Føder levende Unger, omtrent 12, som
ere hvide,
Ikke giftig.

6. Vipera berus, s: almindelig Hugorm,
Kulfrøning s: —
Langs Ryggen et tandet Baand,
mörkere end Grundfarven, men ud
lagt om derhe er megel mörk — Hyr
den omtrent 1/5 af Kroppens Længde,
Hovedet ogformigt, bagtil bredere
end Halsen, overaa flat. Kro
pen lind, noget stadelig med Un
derviden, lidtbrest paa Midten og
smalnet med Hovedet og Hyrden.
Hyrden, kort og stærkt afsmalnen
de; endes med et kegleformigt Rød
Skjold. — Overkroppen belagt med

lanielelige, tagtagte og med en smal hjøl langs Midten forbrjnede Skjæl, omtrent 24 i hver Rad; Underkroppen fra Svulget til Gattaabningen belagt med hele Tværplader. — Farven: et mørkt Brand, fra Nakken til Hjerteligsiden, med en Rad afrundede eller rundagtige Flekker paa Siderne, Hovedet overalt mørkt, med et lidet hvidt Bjælt Baand, i hvis Midt Rygbaandet indgaaer. — En smal Stribe fra Øinene langs Tindingerne til Halsens Side forbinder paa hver Side

7. Hyla viridis /: Løv-Frø :/. overtil grøn, under hvid, med en gaul og derunder sort Stribe gjennem Øjne ne og langs Kroppens Sider. - Har 4 Fødder, de 2 Par lange og tynde, de 2 Par korte, den 2den længst, den 3die 1/2 længst. 5 Bag tæer, halvt forenede ved Strømehud, den inderste kortest, 4de længst, alle tæer endes med en rund Udvidning i Form af en Skive. Gjør hverken Løvskove, men findes ej i Norge. -

8. Rana temporaria, /: Frosk, Lyps :/. Panden er mellem Øjnene flad og lige saa bred som Øjenlaaget. - Afstanden imellem Næsebrene — som ligge foran den Kant, der adskiller Panden fra Snuden — lidt over en Tværfingers Diameter, en brun Strek gjennem Øretrakten, uden gulhvid Baand langs Midten af Ryggen, Bagfødders Langtaae har to Led udover dem, der ere udenfor Svømmehuden. Kroppen ovalt aflang. — En fra Øjenlaagene udgaaende forgrei sig fra de Øverste og de Gagbeens Ende danner en tydelig Krum imellem Ryg og Side. -

Øjnene stærkt udstaaende, en bevægelig Blinkhinde over Øjnene. — Fremberene korte, muskuløse, naar de legges frem rørker halve Fremarmen foran Næsespidsen. — Tre tæer vender foran, ad hvilke, uden Tegn til Svømmehud, i Enden stumpt afrundede. 1 og 2 korttæer, ligestore og lange som Tangtaaens halvlange, 4 lidt længere, rørker til Midten af Tangtaaens 2den halvlange; 3die længst. — Den 1ste Tommeltaaen, har sin metatarsus aformelig tyk. — Bagbenene, meget lange, udgjøre 1/3 af Kropslængden. — Fem tæer, ligetil Enden forenede ved en Hinde, undtagen Tangtaaen (2) hvis Hinde med 2 Led skjuler ufuldkommen Hinden, 2den Taae længst, med 2½ Led; 1ste næsten kortere end 3die, 4de, næsegal kortere end 3die, som 5te er kortere end 4de, en ogsaa svag Knude under den korteste Taaes Rod. — Overhuden paa det levende Dyr har forøvrigt Farvepragt, størst paa Ryggen, bagom Nakken 2 Rader af sorte eller brune Pletter som foran sløde sammen og danne en Vinkel Λ, stundom er denne Tegning blot antydet: Λ. — Mellem Øjnene et mere eller mindre tydeligt Tværbaand. — Et sort eller brunt Baand gaaer fra Næsespidsens Sider gjennem Øjnene, bliver bredere og mørkere ved Ørene og ender i Nakken over Trommehulen, adskilt, nedenfor begrændset af en hvidgrøn Strøg. — En sort eller brun Sangstrøg paa Overarmens Fremside, mørke Tværbaand over Taaen, Skinnebenene og Tarserne. Stundom langs Ryggens Sidekanter en klarere gulagtig Strøg, stundom desuden en Rad af brune Trekanter. — Underkroppen ofte pletteret, stundom tegnet

paa Brystet og Haar med store, mørke Flekker. — Grundfarven lidt lige, snart olivengrøn, snart gulagtig, snart grøn, brun. — Sidestreg bagentil ovenfor de undre Brystfødder bleggule, indentil kjødrødlige. Underhagen nedenfor Brystet og Munden indeni hvid, — Tungen kjødfarvet.

Længden 8 T. 2 L. hvoraf Hovedet 3. 2.; Fremkroppens 2. 4. deraf er Halsen 1. 3; Bagkroppens 5. 4. Halen 1. 5, Fødden 1. 6. —

Varieteter 1. Olivengul, tæt sortplettet, med sort Baand gjennem Øjetrakten. 2. grøn, med smaa, sorte uregelbundne, dog tætte Flekker ovenpaa. 3. Bleggrøn, med en blegere Stribe langs hver Side af Rygningen; ovenpaa smaa sortpletter; smaa sorte Prikker i Tværader over Haarene. —

Æggene i lave Poser og hvoraf Ungen udklækker Unger, med Fiskehale, Gjeller paa Halens Sider, og en hornartet Knop, uden Fødder. — Derpaa forsvinde Gjellerne, Forbenene udvikles, Hjerten forsvinder, Ligeledes Halen, og Munden bliver bred. — Først i 3die Aar ere de Unge avlekjætige.

Fiender af Padderne, Snoge, Ugler, Insecter og Larver, Fiskerovn, Fisk, Ørret og større Amphibier. — Insecter og Insecter fange de med den lange klæbende Tunge. —

Haarene spises i Tydskland. —

9. Rana esculenta. Pandin mellem
Øinene forbøiet og smalere end Øi-
nenes forbøiet, afstanden imellem
Nosebrorrene mindre end Trom-
hindens Diameter; oven grøn-
agtig med sorte Flekker og en
langsgaaende gual Stryg midt
efter Ryggen; ungen blir flek-
kjernere Gjennemtrakten; blot en
Rad af Langsgaaende sidestillede
Pletter for Stromhuden. En
mork langstrog foran paa For-
armen; en gul Strobe fra Ho-
vedet igjennem langs Midten af Ho-
ved og Ryg; en mindre lydelig
langs Side.
Varietet: overlæ grøn, med
runde, enkeltstaaende, sortlig
ge Flekker. Hoppen stundom
indtil 3½ T. fra Nosen til anus.
Bagbenene 5½ Lin.
Lever meest i Vand, men trosser
stundom paa Land, og redder da
sig en Hund paa forderbøide
Bagben, støttende sig paa For-
benene. Den gjør lange Hop.
Den skriger stærkt, især om Nat-
terne. Hannen har paa hver Side
af Halsen en rund Blære, som fyl-
des ved Luft, hvorved Lyden for-
stærkes.
Skal spises den, dog Laarene.
Findes i det sydlige Sverrig, men
ikke i Norge.

10: Rana arvalis. Nils. — Nosen
„ydes, Panden staar mellem Øinene,
Næseborene adskilte ved Næsens Skedehandl,
en rød Flek gjennem Øretaaken
fremgaaer med en rød Stribe gjen
„nem Næseborene. Overlæ mar.
„moreret med Sort og med 3 lang-
„gaaende blege Baand. Bag-
„ved Øregtaae med 2½ eller 3 Rader
„smaa Øyerde adskilte ved Øremuskelen,
Seet ovenfra er Hovedet tilspidset
fra Siden, er den øvre Contour beg-
„bøjet, og Næsen ydest fremstaa
„ende fremfor Underkjæben.
Næseborene Afstand fra hverand-
„regt større end Øremuskelens Di-
„mæter. — Overskjeggen paa beg.
„graae Grund uregelmæssigen
plettet eller marmoreret med
Sort, og med 3 langgaaende blege
Baand, et langt Skjegg ved og et
langt hver Side. En rød Flek
imellem Øje og Forbenet fremad-
„bøjerne til Siden af Næsespidsen,
„over denne et hvidagtigt Baand,
og under dette er Overskjæbens Hud
„farven ildrød. En rød Stribe gaar Over
Øreskjelene mellem Øjerne og hvaren
og Øregtaaen slutter ved Øjnenes Over-
„kant, stundom med 3 hele Led. —
Opholder sig gaa Agre i Ødr. blandt
Potater; men lever stundom i Vandet. —

11. Bombinator igneus. /: Klokkefrø, Pe-
der Oxe: Frø :/ Den mindste af
Scandinaviens Frøer, sjelden over
1½ T. lang, men Bagbenene 2 T. lange.
Hovedet bag Øinene slet og vortet.
Næsen ej hvas, men stumpt afrundet.
Næsebborene ovale lige langt fra
Øiet og Næseryggen. Imellem Øine-
berene og nogle bag dem 2 usædvan-
lige Huuder, forsynede med Gimleorer.
Tungen bred, rundagtig, fastet mu
hele Underviden. Fremfødderne
Tæer 4, aftagende og i Sjeldnen afrun-
dede, ved Basis forenede ved en kort
Hinde. Haanden forsynet med en
rund Knude under Tommeltaaen,
og en lige under 4de Taae. Fod-
Taae korteste, 2den og 4de lige, 3de lang-
Bagfødderne 5 Tæer, forenede ved
bred Svømmehud, indre Taae korteste
dernæst 2den, derpæn 5te, dernæst 3de,
4de længst. Fodvreden har en
rund Knude ved Roden af korteste
Taae. Øvre Side af Kroppen
bestrøet med runde Vorter, hvert med
et brunt Punct. Underviden glat
med nogle smaae, grønne Vorter,
ligeledes med et Punct. Lever
for det meste i Vandet, men ogsaa
paa Land. Dens Gang hoppende.
Findes ikke i Norge.

12. Pelobates fuscus. Uregelmæssig plet-
„tet eg brun og graat, undertiden Baand
langs Bagryggen. Øjen stor,
lys og tydelig afrundet, meget
fremstaaende over Hov-
„den. Pupil mellem og bagom Øj-
„ne opadgaaende. Næsebrynene temme-
lig vidt adskilte og længere fra
hverandre end fra Øjnene.
Bag Øjnene en utydelig, haard
Knude. Bernen overkjæbe og un-
der gamske stærk, ligeledes alle
Fingrenes Undersider fra Hage-
tie Bøkken = Regionen. Hak-
„ken, Ryggen og Siderne belagte
med lave Vorter. Fremte-
„erne gamske adskilte, 1ste og 4de
Tæa omtrent lige lange, 3die længst,
Bagfødderne Tæer fra ¼ til ¾ Deel
sammenhængende, 2den til 3die
„Led og 3die, 4de meget længere
end de andre, alle forsynede ved
en Svømmehud undtagen til Spidsen, und-
„tagen 4de, hvis 2 yderste Led blot
ere kantede med Huden. Ved
den korteste Taaes Rod en ovel
nedliggende brunlig Knude med
den indre hvasse Kaand fri.
Tungen, meget bred, fylder hele
Underkjæbebuen, og er med undre
Side lidt klæbrig fastvoxet, og
er Kanten fri. I Munden

Grabrunger, og mellem disse 2 med Torder forsynede Knuder.
Fremfjeggen uregelbunden, forsk. „ket, sidestne mere smaapletted. — Hjørnen større end Hammen, som under er hvidgul, medens Hjørnen er graasprikket. — Øvrigen 2 T. i L. Bagbenene 2 T. 7 L. Forbenene 1 T. 2 L. — Giver en stærk Lugt fra sig, hvorfor man i Sverge kalder den: Stink-Groda. Findes ikke ej i Norge!

13. Bufo vulgaris s: Groe.

Adskilles let fra Bufo calamita ved sine mere ind til Hovedet forsynede Bagfødder, fra Bufo variabilis ved sin min„dre lydelige Fremstinde, og fra beg„ge ved sin aflange, noget u[illegible] bøjede Grenvulst og sin Farve. Den er den største af alle Padder, og indtil 3¼ T. Længde og 2¼ T. Brede. Klumpet, bred og skudagtig; Bagbe„nene kruine og kun lidt længere end Forbenene. Hoden stumpt afrundet, en indtrykt Linie langs Hoden og Snuden til Næsen. — Overviden belagt med mange store vortagtige Knuder, og ligesaadanne findes paa Øjenlaagene, samt oven paa Benene. — En Knude

bag hvert Øje. — Kroppens Under-
deele, vor Underhagen, Bryst og
Bukkentraktten samt Laarenes In-
dre og Legets vom chagrinerede. —
Kjønsdelene tandløse. — Tungen kort
afrundet, bred med Enden forhøjet.
Paa Forbenene 4 adskilte Tæer, den
inderste kortest, 2den lidt længere,
4de længere end 2den, 3die længst. —
Paa Bagfødderne 5 Tæer, forenede
med indskaaren Hinde. — Den
yderste og længste staaer længst
udenfor Hinden. Iris guldgul,
Pupillen aflang i horizontal Stilling.
Farven: mørk- eller graabrun
og overflødt. — Ungen er
i Sept 1⅜ T. lang; Overkniven
halvt oval, og rød med en sort
Stribe. — Kroppen overgraabrun
(graabrun); Undersiden
forlebrune, under hvid med
mørkebrune Pletter; Pupillen ho-
rizontalt oval.

Lever i Parringstiden i Dame,
eller paa Landhaandtlige og skjø-
nne gesulde Steder. Skjuler sig gjerne
om Dagen. Krjber langsomt,
men Ungerne krjbe let. — Om
Vinteren graver den sig ned i Jor-
den under Rødder og Stene. —

Parringstiden i April eller Maij;
lægger Dg i en smal dobbel Stribe,
i en gelleagtig Vædske
Underarmene og Laarenes Bagsi-
der ligne tre lette Smaahinder.
Fremkommet fæster sig under Dage
Ende af Overkniven. —

11. Bufo variabilis /: grønflekket Padde :/

Kroppen bred, undersætsig, ovenhen belagt med ulige store og fra hin anden staaende Vorter, af hvilke en Del bagom Skuldrene, Underarmene og Laarene sidde, en stor Knude over Ørestrakten, rokker bagom Forbenet. - Nøsen borene ovale og liggende paa Siden af Overkjæben. - Kroppens Underside sortagtige, ligesom Haven og Laarenes Overside. - Kroppen fra anus til Nøsespidsen er noget længere end Bagbenene fra anus til længste Taaspids. - Bagbenene svømmehinde udvisket paa Siden af alle Tæerne, men kun ved blot Tangtaaen. - Tæ Knuder under Foden imellem Tarsen og Metatarsen, af hvilke den indre er meer aflang, den ydre kortere. Pupillen oval i horizontal Retning. Iris sort guldsprængt med en smal guldfarvet Ring inderst. Farven: øverst grøn med sorte Striber som paa Ryggen og Siderne, nedsten dunne et det ligesaa paa Benene. - Paa Hovedet gaae Striberne paa tværs, paa Bagkroppen det, hvor de ere grønne, paa langs. Kroppens Underside hvide, med mørke uregelbundne Pletter paa Brystet. Lever meest paa Landet uden i Parringstiden, helst paa skyggefulde Steder, visor sig ogsaa ved Husene. Findes neppe i Norge. -

15. Buso calamita. /: Stink-Tudse/.

Kort, stumpet Nose og adskilte Øjeborer paa dens Fremside, hele Kroppen bestrøet med mørke runde Knuder, ligner Blomst; Ørebuden aflangt oval, fladagtig, med en rund stet Flok Ørehår ved dens Fremrand. – En stor rund Knude under Haandfladen paa Forfødderne, Tæerne u. den Svømmehud; Bagbenene kun lidt længere end Frembenene, med 5 Tæer, som ved Roden forenes med en kort Svømmehud; paa Vristen 2 smaa lidt adskilte Knuder. Farven: øverst olivengrøn med nogle mørkere Knuder, en gulagtig Stribe løber midt efter Ryggen fra Panden til Enden; en Rad af runde, hvide Knuder fra Øverkjæben til Frembenene. – Siderne og Benene øverst flekkede, marmorerede, med olivengrøn og hvidagtigt. – Kroppens Underside og Benenes Undersider hvide, bestrøede med uregelmæssige smaa mørke Pletter. Længden til Anus 2 6/8 T., til den længste Tæerspids 5 T.

Opholder sig i høje Sandbakker

og skjuler sig, om Dagen under Stene og i Huller. — Ved Berørelse giver den en ækel Stank fra sig, som kan forvarsage Hovedpine og Brok„ning. — Hopper aldrig, men lø„ber hurtigt som en Rotte. — Om Vinteren findes den stundom skjult i gamle Muur, mellem Stene og under Tuer. — Lever kun i Parringstiden i Vand, og Hannen skriger da høyt. — Øyene adskilte, i 2 Strenge. — Findes neppe i Norge —

16. Triton cristatus. —

Huden kornet, overalt grønsort med meer eller mindre tydelige sorte Flekke; undertiden po„meransfarvet med sorte Letter. Siderne bestrøede med hvide Puk„ker. — Hannens Rygkam afbrudt over Lenden og dybt delt med spidse Tænder. — Hunnen større end Hannen, men uden Rygkam. Kroppen valseformig, Skjerten sammentrykket. Hovedet nedtrykt med stumpet, afrundet Snude. Øinene vidt adskilte. — Hele Dyret belagt med runde Vorter, men Kø„nene glatte. — Paa Fremfødderne 4 Tæer, bagfra uden Sporer, de Svømmehud-

den yderste og inderste Kortest og
lige; af de to mellemste er ved
yderste lidt længere. — Bagbenene,
især Vrist og Haand, tykkere
med 2 brede Tværbånd, uden Svømmehud.
De yderste paa begge Fødder Kortest.
Bagbenene for en stor
opblæst Knude, med en spræk
kke lang Hvidten (: Analaabningen)
Skjertang. Siderne have et langsgaa
ende sølvhvidt Bånd, mod den
øverste er gule.
Længden: 3 T., 4 L., hvoraf Hove
det 5 L. Brystet 2 T. 6 L.; Skjer
ten 2 T., 1 L.; Forbenene 6½ L., Bag
benene 6½ L.
Opholder sig i Vilder, Kjær og Dam
mene til Forskrækning liden er forbi
siden paa Land, om mod Vin
teren skjuler den sig imellem Bark
og Træ i gamle Stubbe eller an
densteds over Vandet, mandtee
og i Vandet selv.
Findes ikke hos os.

17. Triton cristatus. Den brune Øgle
Hvirvelhornet, overalt skiefarvet
under brandgul med en Rad af
sorte Pletter langs Maven. Siderne,
Maven lyspletted. — Overkjæben
lidt længere end Underkjæben.
Forbenene 4, Bagbenene 5 Tæer,
ei svømmefulde. Skjertens Under
rand og Tæerne gule.
Hannen har en lav utandet Kam,

der i Vandet seer ud som en hvid Bjørstribe med sorte Punkter. —
Er funden i Sverige, men gives neppe i Norge. —

18. Triton punctatus: den mindre Vand-Øgle. — Huden glat, ovenfra blegbrun eller mørk, under rød- eller hvidgul-agtig, bestrøet med runde, sorte Pletter, paa Hovedet Side og Lemmer. — Hannens Kam tandet, saxbrudt, og dens Bagtaer kantede med Hinde. —
Mindre end № 16 og 17. — Fremmenene have 4 tydelige Tæer, de Bagre 5 Tæer, den inderste meget kort. Bagbenene tykkere med 5 Tæer, den inderste meget kort, men med Hinde ovenfra. — Hjerten mindre, næsten lancetformig, uden Tvær- og Længde-Furer: 3 T. 4 L. Hjertekammeret 1 T. 3 L. Fod og Bagben 2 T. 2 L.
Opholder sig i Damme og stillestaaende Vande, i Sverige, men kun des nok ej i Norge. —

19. Laverta muralis (Mur-Øgle)

Bag Nosepladen og foran Øjen-Fedtpladen staaer en enkel Plade. — Bjeggen kommer af 3 maae rundagtige Skjol. — Undtagen med en stor rundagtig Plade omgiven af 1 maae runde Skjol. en tydelig Fure imod Bagtaaen, Hovedet ovenfor plat. — Mellem Øjnene og Nosebarene Ligge 3 Plader, den bageste størst, den fremste mindst. —

Farven: ovenfor grønagtig, rødet eller flokket af rødt. nedenfor rød eller hvidagtig. Skjerten aftagende, undertiden tyrd, dobbelt saa lang som Kroppen, og undertiden kun ⅔ af Dyrets Længde, der er 7 T. hvoraf Hovedet og Kroppen 2 T. 3 L. Skjerten 4 T. 3 L.

Levet om den fineste i Skandinavien.