

Fossile Spor af Reyneraaber
paa Skifer = Bjerge

Saa danne Spor ere i England opdage
 de af Cunningham som i
 London & Edinburgh Philosophical Magazine, 1829
 har skrevet en Beretning og undersøgt de
 derom. Sporene fandtes i Stretton
 Quarry, i rød Sandsteen, i Nærheden
 af Liverpool, 32-38 Fod fra det overste
 af Steenbruddet. - Sporene fandtes
 ogsaa Halvkluger, af samme Substant som
 Sandstenen

Professor Hüttnich i Amherst har
 i Wetterslede i Massachusetts
 undersøgt de oplyst lignende Spor
 paa Skiferbjerge, og han har nyagt-
 tigen beskrevet dem i sin "final Report
 on the geology of Massachusetts, 4. udg.",
 hvorfor han har leveret af bildning
 af dem paa Plade 49 s. 62.

Spor af Fuglespæder findes i forstjæl-
 lige Lag af Steen både over og under
 Reyneraaber = Sporrene.

Hiltschock har forvigt et eftergjørelse
"danne Spoor ved at flenke Van i Dra
"ber paa tilberedat plastisk Lær, og
han har fundet disse eftergjørelse Spoor for
"kvotren lignende de forfile. —

~~I Særlig er lignende Spoor opda
"gde af
"som derom har skrevet~~