

Naturalien,

Som ønskes till Bergens Museum:

1. Søefjær, en Polypstok, med en Klump, tilspidset-formet, og fjæddannende. Sten uforøvet. Stemmets Færv højspød, Hiltens og Rodens graalig. — Saadanne faes undertiden i Vest-Lofdens paa Linnæus, paa 80 a 100 Favns Dybde.
2. Vingulæne, et Nagt smalt Søefjære, med smaa Knuder istædt for keme, og en mindre, især smalt, Rod eller Knude i nedre Ende. — Færv graalig. Denne Polypstok faes paa samme Stæde, i Nedre og Dybde som N^o 1. Længden eller Højden er for N^o 1 fra 10 til 20 Favner, N^o 2 — 18 — 40 —

U. B. BERGEN

Ms. 200b

3, Nordusahoved / Asterias caput. Nordus,
saj, der stædse holder sig ved
Bunden, ligeledes paa store
Dybder.

4, Lodder, en Fiske-Sort, hvoraf der ved
vores Kyster findes 3 Slags, hvis
trivielle Navne i Nordlandene
er:

a, Fav-Lodde med en lodden
Sidelinje,

b, Sil-Lodde, med glatte og
blanke Sider, lidt smaa,
længere end a, og

c, Sild-Lodde, en meget ki-
dren, en Sild lignende,
Fiske, med afstumpet
Snude, en lidt Finne
paa Røgsiden herimod
Spindens, og 2 Rader
indhulede Skjolde, een
paa hver Side af Røgens

Rands, og omfrent. 9. Kjolde
i hver Kald. Den findes
stundom i Vinter- og Vaar-
Tiden opdrævet død med
Strandkanten, —

og 5. overhovedet ualmindelige Kæveri
smaae Bedjv og Soevæster, som
med Finer eller Garn
opfanges, i et præsto-
re Rybder.

Alle ønstes forvarede i Krukker
eller Flasker paa Brandevind, hvor
i de nedlægges snarest, mueligt, efter,
at de ere opfiskede. Efter 8 a 14 Da-
ges Forløb ombyttes det forstet Brande-
vind, efterat Ryrene heri ere vel afskry-
bede, med nyt Brandevind, hvorefter
Kærnet vel propfæs og overbindes med
en vaad Blære eller Sjæl. —

Bergen d. 22^e Febr. 1847.

H. H. Proximator G. Wälker, }
i Koppen. L

verte

In Enging af Virgils Læren
De 2: Virgils Læra (Kort) til
Læring af Virgils Læren
til Fortælling af den, som
maatte undersøge om den
forstæffe sig Læren. 7