

# Notiser om Vaagehvalene

Fiskenes bereyne Hvalenes Længde  
 efter Spordens Bredde, da de paastaa  
 at Dyrets Længde altid er fire Gange  
 saa stor som Spordens Bredde.  
 Tungen i en Hval, som fangedes  
 i Tellevaag d. 11<sup>te</sup> Julii 1843, og var  
 12 Aalen lang, vejede 10 Lb, eller  $4\frac{1}{2}$   
 Vogt. Den var dannet som en  
 Skindrot, i Skindkitt, og bestod af  
 en fedagtig Masse, lig Hvornes  
 Ivere, gennemskaaen paa Længde  
 af et lag fint Kjød. - Smag = Vot-  
 terne vare ikke migel store, men  
 temmelig skarpe, og Farven blev  
 uagtig paa Tungenes overside men  
 udklægraae paa underste Side.  
 I Leveren fandtes mange rødbrun-  
 ne Syler som *Tomia*; *festucaria*  
 circa  $\frac{3}{4}$  Tom: Længde og  $\frac{3}{8}$  T. brede.  
 De havde i den smalleste Ende den Lidet, med  
 Vorter bestat, Mundaabning, i den bredere,  
 en stor rund Sugeskive, paa Bugriden,  
 2 udhængende, circa  $\frac{1}{2}$  T. lange, maadelig



Remer, og tot ved disse, 2 quindelige,  
et ved hvert mandlige.  
I haven af denne Hval fandtes en  
mangde gulfagelammede Astarider, tre  
circa 3 1/2 f. lange, spidse og hvide i  
begge Ender.

Der var ogsaa fundne Srijsteddyr  
paa Huden, og at de aldrig havde  
seet Skyd / Lyderer i samstedt.

Et Fiske, 3/4 Al. langt, var i Hval  
blodet. Guldbleven var  
meget stor, og indholdt omkring  
6 Kander Guld, hvori dog hverken  
dyr eller Guldstene opdagedes.

I haven fandtes foruden bemeldte  
Srijsteddyr, intet andet, end en stor  
mangde Breen af forviede Sild.

Den ovennævnte Guldbleve er nu  
i Hvalens 3<sup>de</sup> Havn, i hvilken  
Gulden, i sin Fuld, opbevares.