378

Caroli a Linné
Equitis de stella Polari
Archiat: Reg: Med: et Botanices Profess: Upsal:
Acad: Paris: Petropol: Imp: S:Q: Holm Upsal:
Lond: Angl: Flor: Berol: Monsp: Tolos:
Bem: Edinb: Nidros.
Membrum.

Prelectiones
Privatissima
in

BIBLIOTHECA

habita
MDCCLXX

V Insecta

Insecterne ere uuegnelig de ringeste Ting paa Jordkloden. De
ere historie har altid blevet meenede at nuue indtil vore Tider
da de dog forkjendte saa mange, ere ikke mere end Quadrupeder
end de store Dyrene; thi at gjøre den mindste Ting har været ligesaa
stor som ikke store Ting, end at gjøre den største Elephant. In
secter ere ere Naturens Hemmeligheder forordnede, at vore Øine
ere til at skue Naturens i sin tilborlige Orden, saadan det pryder
at Juvelen (Ædelsten) skipper sine Qvisler undertiden for Brynene, og at den at
lenen skiftende grøn og røde? Dend Insect Engger sine Æg i Turnes
som naar de ere udklækkede ader op at Larverne i Grunnen, saa
forholdes nødvendig mere vidende, end Kroninger privilegerede
den forende de ikke være. De Larver som kaldes insolaron sue natale
ere bedekkede med Insecter, som ader den unge Oldnes Øie
ellers skulde de undertrykke de andre sub solum natale det vore.
Som e.g: om gjøgler nu Fugen i Fand Fort i nu Jorm, saa er den at
dig Larven i Fand for 1000 Ends Insecter. Hvorogsaa Dend for sin aparte
Instinct, som skal skjøtte og tugte den. Ikke de Larver og Øyen, som nydes
vaklet af Naturens for mange Slags Insecter end de andre, saa at
Insecter skaffer bort det overflødige. De Ferner og at gjøre Theatren
for alle Slags Dromedigheder, paa det den skal være fuldgjøre end E.g.
alle de Kostelige Sverdet Konstgjøre nydes komme. Ikke ere Blad
fil, at ade at Kjøttet og som nu Dele bellum med Dens fig. Silphavespillo
bug gjøre de dede Muldvarpe som finder i Holstaugde i Holland.
Vilgrynen drøge Øer og Øyen som ligge paa Jordens Firmament, ligesom
vinder Vandet. Jgrunden Vandet kende de, at Vandet blev for
vundet til Kad fordi at det var rødt, men det er blot et rødt Insect
som ligger 1000 Ends i Vandet. Hemiptera selvskjøt paa Øyen
som for for mange Indian, og Øyne den Kaader svovlgrønne
Dens Dørk udfeles Øyen fidu blinder, Kaade, paa dinner Vinger de
Kastede Gud Israels Børn manna, som lod nu Dennen Cicada
gjøre fil paa de Øyen, som vaner Skinn gjennem, den
aar rundt gumi i Arabicum Øvrigt de opsolde fig. Faa det Crea
rene aader de for ædel Forlangende ny skulde Kaade aafor bidrage
vnlse aarden overflødige Sode, for Skabnerne forordnet Insect
som skiller den at de ny Jordens Øyen skiller. Insecter tenner og til
at holde Species i Orden saa at Jorden og det Insect for sin Skyld gjøre

er rundt. De Surrar Coccionellæ eller op ville Lues paa de Italiske
Væxter. Et Slags Vand Skader Dine ovenpaa ligger, som er
ogsaa en anden, som kalder Adelabus apiarius. Et Slags Sommerfu
i gamle Kistere, og der store Klöer som en Kraeft paa i proportion,
eller Vaxkopi Ost, de som indslutter i Kor saa som den er Ost
er. Cimex personatus eller Vaeggelus. I Surinam bruger
Fulgora i Stedet for Lys i Mörket, skinnende Hovedskinner gantske
klart. Den Ild som fyns i Vaxet paa Ostridefarver, er nyttende
med en Scolopendra som ligger opi Hovedet som er ikke
ikke. Hos Arch: Linnæi Lid er Insecter og Vermes en Classe,
men de er saa ungt Skilt fra vermes, som nogen finder fra
Fiskene. Alle Insecter har Klaerne med i Födder, de mester 6. N2
pa: 4. og adskillige aptera Klaerne med 6; men vermes har ingen
Födder, Insect har Hoved, vermes ikke. Alle Insecter gaaer saa
Snelder i Forvirrelse, saa at de har alle fire Bryn udom sig men ikke
i ikke. Spiracula lateralia sidde bagom Brystet med paa Maagen
bigrom en Porus med Skiller de vaerden, om man beskriver den
med Dier, gyelne de og dör alle saa snart, men vermes ikke.
Dyrene har Bryn i Kroppen ved Skiller muscleerne er fasten igjen
Insecterne har ingen ossa uden muscleerne er fasten ved Skiden,
og Sinuer er en crusta dura, durior reliquis partibus hvor-
for og Insecterne er Cataphractæ som kaldes. Men bor Skinde
Insecter paa 3 Maader 1.o de er en Vorm Pupa 2.do: naar de er
Ungdigner larva 3.tio. De er en Gamle og Ployer som de Ender gro-
Insecter kom ny saa ingen Lyd ikke de Skilde Insecter Lunger som
de ny saa, uden deres Lyd bestaaer blot Skri ved de Enger Sverd
Vinger bekommende.
Skeller kom Insecter sörn, de har ingen Ørne, ny Skeller ingen
Lugt de Vaer ny Lunder paa Sne.
Insecter deles i 3 Dele som ophold sig ved Norden Polen, 2.do ingen
lem Tropici, og 3.tio ved Syder Polen. Norder Dele er Insecter
er annuel uddrogen de som Lever i Varme. Insecta er og
de bedre Vaxgaarde ved at kugle Vaxen, de ellers skulde
Sverm kraeger ud de minder. Kroppen paa et Insect deles i Caput,
truncus og abdomen.
Caput er skilt fra truncus paa alle Insecter, har uden ingen som
Hovedet, og Pindhuen, men Caput har ingen Cerebrum,
uden en fibra medullaris, cerebrum er ikke en medulla

uden nogen organisatus, som cerebrum. Alle Insecter har Øyne, uden vermes alle, de giøre Insecter med 4.6 et Øyne som Spindelnet.

Antenna er nota essentialis paa Insecterne, som ingen anden Dyr har. De sidde altid paa Hovedet, de er altid igen med 2de som ~~lange~~ Horn, altid articulata, saa at de kan bøye dem, de er hoarde uden paa, og hvilke ved nogle vermes at have forlorne uden dem er altid blote, uden hvilke kan udbrugte og forkorte ligesom caruncula mele agridis. De er udspuderlig sensus organum, men hvortil de bruges, med ingen sikkerhed; de det er ret forordnet organum som vi ikke har.

Antenna er nemlig 1o fiscilis, da de er en klovnie langt ord som Stand i en bog. 2do Setacea, er en tynd og basin og fridsigen til hinden. 3tio Filiformes, er jamt tykke oftere bredt tykke op ord 4to moniliformes er en varietet af filiformis er altid filiformes 5to Pectenata og 6to barbata 7o Clavata, naar de er tykken ud ord and med basis 8o Capitata. antenna brevicores er naar de er korten end kroppen, longiores naar de er lengere og mediocres naar de er ligesaa lang som kroppen.

Palpi er smaa antenna som sidde foresten med munden er altid 6.

Dentes kalder de smaa Horner som sidde paa maxillerne.

Lingva har alle Lepidoptera; Apis som nemlig har lingvam spiralem som Arch. Linné kalder spiri lingues, alle og de som har vilgen lingva og kalder Elingues.

De mest Insecter har bevind, og har de flest maxillas horizontales og ikke perpendiculares; men undtagelse er der mange paa Dyr som Cancer, Coccus, Chermes. De som suger, skiøtter uden Ørnerede formiex som ved sin uden Dyr.

Stemmata kalder 3 opsøgende puncter paa Hoved, er mest paa Hymenoptera de er en eller variante til Øverne, ikke end er de concave ikke end opsøgnde.

Thorax kalder øverste Indelen af truncus

Pectus under Indelen

Sternum er den under Indelen af Thorax, som gaaer ud i en Spids som paa Ænder.

Scutellum er den 3 kantige Deel, som ligger imellem Thorax og Elytra mest eller coleoptera har den.

Abdomen bicorne kaldes det, naar det er som paa Aphides.
Forcipa er en Tang bag i Abdomen, som paa Forficula.
Furca paa Podura, saa som er en Tangen ikke er bøyet ud adskilte
ved enden, men de bøyer under Dyrene, og faaes under Sporer.
Abdomen siges om tergum, men under Venter.
Chela er det store klør paa Krumfødderne som nu det Insecter har.
Pollex den lille bevægelige klør paa Krumfødderne.
Tagen Insecter har ikke end 4 Vinger.
Elytra kaldes de øverste Vinger som Coleoptera har som er ofte skal
Halteres er de fremmeste Knoppen, som findes under Vingerne paa
Diptera, er rudimenta af de andre Vinger.
Femur, Tibia, Tarsi et digiti.
Pedes natatorii er paa ydre flade, sammendrykte og dette i membraner
som paa Dyticus etc.
Ala plana som paa Fluen, Reflexiles som paa Vespa, der de bøyer sig som
dobbelt, Erecta, som paa Papilio, Patentes paa Libellen ut. Incumbentes
da de øverste Vinger er paa flade ovenpaa de andre. Deflexa og reversa
da de er bøyede paa Siden; men reversa naar de under Vingerne
er bøyede i krogop paa de øverste. Dentata da Vingerne paa siden er
spidse, som er bøyet. Caudata da Vingerne paa ende er spidse,
efterdi den ene er lengere end den anden og bredere end bagen. Conca
lores er naar Vingerne er som paa Sorten paa de øverste og under. Alapri
mores et secundarii er paa Papiliones, men superiores et inferiores
paa Phalaner, primores er de ere superiores og secundarii nedere
inferiores. Over Siden paa Vingen kaldes pagina superior og under
inferior.
Macula er Pletter, som er forskiellige paa Vingerne.
Stigma er en Slags Phalaner mærke paa Vingerne.
Fascia er Bælter som gaar tvertover Vingen.
Striga er en Linea som gaar tvert over Vingen.
Striga bestaaer af Borstere, som er flade og sammendrykte og
ligger op ad.
Linea gaaer langs efter Kroppen.
Ocellus er en Slags paa Vingerne, som er rund og er en øiebye
Tegner.
Elytra porcata og sulcata er to Slags. Sulcata er naar der
er grove Furer langs efter Kroppen; Porcata er naar de distan
cer som er mellem Furerne er rundagtig.

og om Dyrene ovenfor nu er fremme paa Timetanus og de andre den søger nu Dem
den den Beskrivelse som nu i Qiøbenhavn. Den 6te nu under, ad vegetabi-
lier paaa de nu declarerede, men forudsætter de under forudsætninger
Skaller. Den 7de acervis om Blomenen. Dennes larver har 6 Fødder, som nu
ved Eig.

For at kiende alle disse bør man see nøiere om de har Horn, om det sidste paa
Caput, Thorax eller og paa begge, disse kaldes Cornuti og Fiendt Cornua
undersøgelse nu gandske snart som nu er dem Eig for forøvrigt de det sidste for
ikke har dette kaldes mytici. Derpaa bør man see nøiere om de nye scutel-
lati eller essentellati. Scarabei nu skarlen nid alle under Skelcher

Species

1o Hercules om Hercules og Gideon nu differente species eller differere baar
i sexu nu nyeligen i mish. Hercules har under sorte paa Thorax gulet
og de nu corn paa Cornu Thracis og 2 paa Caput.
2do Gideon nu Kaufing mas. Ske Sungen ny al mueligt for Skuler under
Gideon har Skeg Farver men Hercules har Elytra testacea.
3 Tityas nu lidt i nuelig Hercules
4 Molossus Clypeus som rund lunatus kiends altid paa de chinesiske apo-
tequer. Dors som de forrige
5 Cylindricus Scutellum ikke synligt
6 Actaon varierer ikke nyt til Dørnelinge ny den lyseste af alle Inse-
cter Sutum ny den skønneste af alle Insecter foruden Krebs Krigt.
7 Bidotus vid: Schellerii icones insector Tab: 63 f. 23.
8 Cardinus Voet kalder den Cadry
9 Sacer Fødderne ligner Horn Haskelquist kalder den den at den fortiet
Skem, den de ~~liliorum~~ elbad i Egypten nu ufuggt paa fellner som nu for de
lig til Skem, den de liliorum elbad.
10 Valgus Den under paa Sølden langt removerede fra de forrige. disse
vorder den mere end gaane.
11o Carnifex Thorax krumpel og ligger de Horn og mand Thorax er nu
Dyrene med bagnuden. ad Marv gron Den fellner som ny skorer nu den
fely paa Sommefuglene har den Skoner som tiener til at vuller Skarund
til skelner. Jeg er dagne ar bryder som mand dyr fellner forfarvegnund
og vuller Den til nesill som den kal form har gron dy under som nu Gropf har
som unge fuder for at komme gnes, unge unnersøm fellegfolder
under. De komme mere tiner til Dong, og skiner maar gron de paa
Horn filfra ar komme paa bnforigt Skind Eggnbeggnen i dem og fellen
kappes til.
12 Bison Wildoxen
13 Fossor grøn fellner i dør Bakker
14 hæmorrhoidalis kod med Mennesker Horn den har sit Navn.
15 Marianus fra Skyland ny blandt de skønne grønne Elytra med sorte Skiver
16 Longemanus vid: Voet. Tab: 77 f. 27.
17. Pilularius giør fellner paa sommer Maaned som Carnifex. Plinius og Ari-
stoteles har dette kalt om Gøm. Fellnerne ny 6a 7gran skønne ang
som fely, ligner til Dørnelin men Scarabæus Stercorarius og ligner
lig de Structuren.
18 Stercorarius naar den flyver ungt om Efteraaren skinner

ved Dagen Insekter vaklende Dyr.

19. Fullo den opsøgende paa Brandstoutene for de store antennæ overall Scarabæi

20. Hortícola eller ikke Bøgesnerer og Gærne uden med alle andre Slægtner

21. Melolontha som larve findes den ømindelig Kolsten for Egerner, Ellerne Pæl og incorporeder Pæl og naar man vinder, de flyver med Krusgrøt og Øgne for at det gror ondt

22. Solstitialis naar den lugter som den Smørd Kader paa Elytra som ofte

Den forsvinder den Lønnk paa Eranner, men er nyttig glukt som den forvirr.

23. hemiplenus Dog vinger Fuldskeden om Aristoteles Dalg af Coleoptera nyttar nogen Lagg: de det for Ruver.

24. Tarinosus for Brennel paa sig naar den er brunder, men falder siden bort

for den blevne violet Stoknude paa rødt

25. Aulicus snell gulel med Sølvskarved Feldes ømindelig nattes.

26. Longipes for en Stagnel paa grøn langt bag Fødder under alt saa mer end Dilemnyt.

27. Squalidus gulel Feldes omnvelt.

28. Eremita lighter som Xylocrabro som er brysdeer blegt

29. Fascicularis brungulel Saar fongvanes rundt omkring Voel Skrivning paa Ahuan dicny eller

30. Orientalis Dør og Mensbring Farver er Indiansk

31. Variabilis med Kortbugt Hold, vidsøkt

32. Auratus lugter friske og mesterer Farver uden Blade Kvæns bref i Paonier.

33. Nobilis ligner auratus til Kronnelser og Farver.

Genus II

Lucanus Skjer kalloen Lott Scarabæus genus som Scarabæi de den antenna er ny longitudinaliter men transversaliter fissas paa Ende den ikke forne lid. Hanen dette Slages for Kjæver og massive Kiæfter. Dang Larver lever i vaadur Rotten. De for tibias spinosas, ikke de bruger at græve ligesom Scarabæi.

Species

1. Cervus. De Gammle kaldte den for cervus volans fordi den for Hovedet er Grant. Mandiblerne er Kjæver ved thorax den for er den remarquabel. Fuldzu den øbigt i det genus fuld for fuld er mandibler. Kjæver kiæfter paa a posteriori men de dør ny til bogen naar plejer at fange den om Sommeren for det er difficilis, Kvæn er ved den Kjæver og Kiæfter ny oplukket med den Kjæver Kjæver er, naar de flyver flyver de paa det Kroppen fangen perpendiculariter.

2. Interruptus Feldes paa dorsi spatium midtem thorax og abdomen synbar var interruptus

3. Paralelepipedus er Sigurnu for Feldet.

Genus III

Dermestes for antep: perfoliata p.c: ovenvinge Skiden er antenna er nu naar orbiculare sammen som en distinct Knap for sig. De bum er libri, Insvark, Cadavero medent er vegetabilier for at de er snart differente og dufter Aske. at de er grøn er den er different genus, men den Feldes altid ikke differente limites eller carakterer, vorne naar den for Dager de ind for mad og Skadner som dødt.

1. Lardarius er mangt uvissindig i Sinsen for Skrift og Krøller, og er ~~ved~~ igen
uno ejusdem Species
2. Nordalus i Kroslen
3. Pellio som er ligt de Ringbarne og Kladne som Pellionella og Phalaeme, som mange
er forvexlede dem i Sommer. De solder sig paa Træerne om Døden Aar og ny Sommer
4. Papucinus Thoracis Gibbosus som klæbet ud sin Sæd paa den Skrogede ofte de Sommer
er Skrøbne Lad os nu Læse Cyrus som var Sukkerte og Pellige og Skarp
Skinnet Leuding udflaqutes er Skabs Fuller tog Arch: nu Bid ofte Ært og Sik
Bruer Ferm, Skinde eller i Sverige
5. Muricalus Professor Kirnniche som er Ferment Sin
6. Typographus er paa alle Cimmuner Kollen som for Byggel ned gaar Dag for den
hor grøn Lagen er som Hebraiske
7. Micographus Krim Kræver og Kuvar Lagen er som graser
8. Polygraphus Krim Sugeor uno ugaler gellerne Skadne alle ved Skindlen
und Skadne Kover den ne Lard er den Dobbel Lager med Skoberne
9. Chriperga og den er ret mangt, Skar Insect og Kobergaard Skond Lapsæ
Skiger den. De Lagger Sin Cyrum paa de under Grunne ind ovan for de
Sile Skumme, naar de udkaldes op ad de Skorpne og Skaparne Qvisenaver
bort. Lar Sinn Grunne er ju Lard Arch: for forst observeret det.
10. Marinus er Formuegra Lalder.
11. Vanniceus finder i Brød er brunn og cylindrisk.

Genus IV.

Atinus har antennas filiformes mangt Lyttere ud ad ny aldyre clavatas
Kommer Sommer det ikke ind under. De antenna ny nur Lyttere mesonder
Ledne maar de separeres fra Dermestes, Thoracis er Conyes og for ingen
margo. De bor i gemmuel Træer, Brød, herbarier, Insecter.

Species

1. Pectinicornis har antennas pectinales, uno anten: pectinata giør ny
mangt differa genus.
2. Pertinax har Clypeus paa Sondet om ju lampyris, naar mang vorner paa
Kuur Kragen, Sin ligind og ligger Lanler Lynne Arvelig Skeet man Skiller
Kuur ud med Skovel, Arch: Sin forsøgt at Lagger Skiber i nu Skiller Sin
Kler paa Kuld Fel uno Sin for ned gny vorr Sig udnu Opend og
Kuur er det ong ader i Skolter, Kuk Gynlid ny Attelabus formicaria som
er giegnu Skiger Kagner mom nu 12 Lytter er den i Kommuner Kagner Kog
Kiøn i Sinn Gangter
3. Mollis har mygt Elytra eller op Skiser og Skinduns.
4. Imperialis er gaar paagel i Island de Kover for som nu Kraft Sikir og Sing
ner Kroun paa Kygen.
5. Fur er Kun et Kaar caracteer paa, Ik Thoraa er quadratus som paa
en cerambyx. De Bygger og bor Skrum for m som Dermestes, anterna Lini
Kil a parte genus at Kor den ny nogen sufficient, nota. De ind 62 Kar
ne som er gyldne og mygter, gulne om det er et Species eller varietet
er Kvert at Kryer. Kandter Kolorget drabe den grønne ellers Sig i Kror
og Kagner paa Kur og Sikerdunlen ongen Kor og Sikler Angelne zendne Kor
og Skinner den Skpaa iggen Kar Kurder pulcher som Kan at Kryger.
Den giør Kor Skade paa Insect Dorulinger om mom ned Kiggen moschuse
paa Brøder den Sig og ikke Kort Skrone, de den dog Kordinner ogdrager
og drabner mender Insecter. De Lagger ned og i Sikler Sig selver moschus

Ringen som der udfalder. President Carlsen fandt turcisk Dueing i en
Blik dose, de som kom fra Turquet, store som fandt bevarede den og
de var, nogen gilde som var op paa den store Dueues gaarde, der for
faaren som forlod det Elisiske, og som vaner var efter, fandt som at
der omvendt var der Lider Skinlep som fandt opaad Dueen, som var
ved underlig at de ny blev der af skrøbe og andre Insecter lignende
Aphides dette er inclusum dobbel. Paa herbarier giør de Lonni Stand
og dette Stand vaar maa at gaar fat herbarium som er synes nuanu,
eller op Standvarer, skiøder paa Folger, at drabe den ny ons alumen
nitrum og dette arsenic fordi det. og skrøb paa dette der.

Genus V

Kister er ikke ikke ved Stor Legeder, men er selve opfolder sig
i Dørsel og fordig for en Ender eller i Selen Kommen eller
Slag Krogen der fornedrend Kunder Thorax som nu Guldporder, dette
metamorphosis er ikke kendt. Elytra er kortere antenna er clavata
og er ud spaar der. upu ikke Ender, Thorax bredt som Abdomen
tibias anticas er spinosas paa paa Scarabei maar alle paa graver. Der er
ligesom de maar er fugter bred for og bag.

Species

1° Maximus som er som Lunde paa commun beigner er selve fig major.
Der fandt at det er nu varieter som deperideter om Clunaiel. Inden
der den opfolder sig.

Genus VI

Gyrinus er selv for alle ovale midter er Dyna Skorpe de Skilde omme paa
Pondet og ikke Kommer for at der Kiger Lige paa paa de ovenfor og
paa Vanden. Dette metamorphosis er ikke kendt. Killer paa det
det Kong Mercurius paa er Kom, en ligne paa ny den ikke Kommer
Dem der ikke gaar kaster nu Kamoglegne i Dengten som Fugler
Den for de korteste antenna, clavata eller Coleoptera Stand fisdes
under som ikke er grønne Dem for Folder som Dyescus eller klor.
Folder sig mest i Killer for vandet og der er fiender Fiskeen
nogen tid. Folder er fra Januar til den samme kom for
mitter gaar.

Genus VII

Byrrhus for antennas clavatas compressas, med Ringen omkring
er lig med Kister ved det at den dragen fat Kund Thorax og Vand
per. Inder Genus tomentosum er ikke paa. Byrrhus, Anthrenus og
Pleinus kende tilkom til Dermestes hvem ikke er Dyr Fuger der
og metamorphosis er paa ikke. Anthrenus Engen er Egs Stor,
Pleinus i Dør og Byrrhus i Kaffen.

Species

1° Scrophularia for ved sutaer fund paa som er under Scrophularia, den
ade op Blomsten der for at der er ikke ringe i Spige, men i Kiøb Stand
er Fund memorari som kommer igjen nu Carfula. Paa Scrophularia
Canadica Fundt Arch. fandt der at det Fuld bliver nu Scrophularia
Fundt dyr nudum er nu Kunder, under at Kiøer og Prentred aller
er ogsold fig paa Vaaren.

2° Musorum De Geer Klager mangt om Fuer at dragen Stand
i Fundt museum. Det underlig paa Blom for ved Skeller og
Skind sutura dorsalis.

3° Pellula, er er nu vænner med den dragen den Fornedt med Kaar
der nu fort 3 grans Filler.

Genus VIII

Silpha og Cassida er ikke slagt, de som tilforn var under et genus, dette uddynedigt at skilles. Den ordsprg dette metamorphosis er ogsaa ubegr. for den begge er Thoracis clypeus, blad og bredt eller ovenpaa opslaaet, begge Elytra non marginata, dette dermed ord Cassida sag caput sub clypeo og Silpha ofte clypeum Thoracis, Silpha for det antegnede sagde forsiem crassiores, Cassida eller Vaeglus uden Silpha Krudtene. Silpha larver er ikke ud gnaver for Cucumis eller larver og eller Krudtene, forner meere end den gnaver nu Vaeglen ud som ligner eller de er en lig Sorelderne udenu Elytra.

Species

1o Vespillo. Ligner sorte Mistes er hvidgulgrønne Engrønne forgrønne nu hvidlebrun i Holland Kaant ikke i det fuldeste Dunsig i Dannelsedygn d. grønne Fordi under vigilantissime til de hvide hvidlygrønne ikke unseent overslidte for lund Ford hvorpaa Vespillo ligger fier fyldne.

2o Seminulum vorer ikke uden med den blomst det Kugnt rund sigsom Dasypus armadillo.

3o Rugosa eller op Siden for Eggenner som altid bøyes den udenaf forbrd.

Genus IX

Cassida De ere alle Blad eller Kaam Ligeryn udenom. De har antennas subtiliformes. Dette larve er ikke Skrøbnl i Sudnu Skilnes af nogen ligneder long sagde Kroppen paa siden ligger altfiner eller mente og bredeller sig Sveiland dissudder allinieder Kaam Blomster.

Species

1o. Nobilis sorg 3 Eiurne Kaugb ofteng som forgaaer uoror den Sønn.

2o Spinifex Eggen paa Elytra som gaar frem ord nu ny paa hver Elytra 2 paa Thorax som gaar tvert som er ferruginea.

3die Murraea forugnu af Professor Murray uæsner med Skelnen fin vid Form oval med rund forte Skelny.

4o Bicornis Cornua obtusa antrorsum vergentia fere truncata blaar glindende, punctis excavatis.

5o Reticularis Sorpaa sort, Lund maculas reticulatim contextas.

6o Jamaicensis maxime gibbus.

7o: Marginata Elytra dorte i Kaantu og marginata med Sorne.

8o: Inæqualis 2 Elytrum og ryalinjte Skelny paa Siderne ikpaa hver.

9o Lateralis ned Stol paa Kaantu af Elytra.

10 Bicordes 2 gemmant Kaanude formiend lobnude Skelny paa hver Elytra.

11. Bipustulata 2de rode Skelny ved margo.

12. Flava Sort punct loco scutelli.

Genus X

Coccionella De som gienn den egte Coccionel. Forynigt rond af Form er en Skik genus, dette for mange blandt disse nye vod uenu de bredeborg sig; ikke de forner til Coccus. Imidlertid de disse ordinærdig Kaldes Coccionella og det tydeligt er en billigere at

ved forskiellige Farve med adskiellige genus, hvilke ovenbøies for en hvilket Arch:
Ved Navnene allerede paa dette genus og forøvrigt den ægte Coccinel
lid Coccus. Dette genus er det innocentiste fordi ikke er nader og
ad barn aphides er tilligemed at de fødes begge uden de trof
den lidt fra aphides. Farbene er uensfarvet og lidt fra aphides. Coccinel kiendes af en figur ofte
giøre Orangeriet frit fra aphides. Coccinel kiendes af en figur ofte
hvor ovale ofte paa og hvilket flaade indunder, men alle uafhængige hemisphæri
ca, men forøvrigt er de hvilke ved paar palpi ikke paa pedicellus
for capitulum compressum et truncatum. De dele er nutra og flava
ofte i den form for forer skiller med rødt eller gult Lund punctata
2. Ved eller gulle Lund og gulle og med sorte skiller quadrata
3. Dorsi Elytra med sorte skiller pustulata 4. Dorsi Elytra med sorte
eller gulle skiller, tuberculata hvis Elytra med forte skiller, bivgler
for ufregulaire skiller. De fagrest farvelet som er med sorte og hvide tvegers.

Species

1. Annulata Dorsi ring som firskiller fej paa begge Elytra.

Genus XI

Chrysomela er et vidtløftigt genus for antennas moniliformes, er ude
fagt og ungt lige med Coccinella; men dens Elytra er ringbøgnede med
kolderne og lover ikke ud som paa Coccinella, for palpas filiformes og er ca
ratas som paa Coccinella. De er en ny skiellet lærd under Dugnede, De
den barn de agtenes Eliderne for at blive som er ægte andre sygen
med eller fuldt broderne, uden fin naturlige sinne. De er differente for
differente Dele og bør altid Dele Navne paa hvilke de ofte kiendes
eller ovenfor at om farvede Ener uyt decouverter som Archiasens
Navne cassides, hvi ved de de faaer ej ikke andre latinen at fø igene
Insecter, ikke gierne sammer forbindelsing til natura oeconomica natura
og bør man ogsaa nøgt fej for Dens Sinnder fuldt lidt efter lidt
forbiger regnum animale og vegetabile. De ad gledes 200 allerhelst
Chrysomela populi bedre remedium er at sætter det paa. Men denne
dui efter om de er ovale, Cylindrica oblonga og saltatoria. Saltatoria
holder de som dem hopper som Loppen far bag Laarene, ofte og ovale er
uensfarvede buedur, ad hvid og grøn Farve paa Colleoptera Plantarum

Species

1. Graminis altid paa Jordene
2. 3. Alni et Betulæ bide og giøre begge gulle Skiller paa Bladene
Betula for fuldar Skiller paa Elytra i Lad alni hvidt.
4. Armoraciæ finlidn ungt Blad snel for denne Dyrd
5. Cerealis Smukke blaar med Guldskinnen alminuckligi Cyd
lond fra andre ud.
6. Variolosa Kommer fid lillige med ny coccus fra America.
7. Lapponica er under Yang for Archiasen fand den for

Ortnu er testacea med 2 fasciæ nigræ den ovenfor krogt tilligemed den andenfor, den mellemste ved transversel.

8. Boleti opfolder sig under bugvingerne ved under boleti.

9. Gorteri. Archiden fid Gorteria fra C. S. Spei og para den fremmer fod uoger pupes som naar de udkrøbne blive Imago.

10. Merdigera den fiur Excrementer para dyggna ligesom Cassidelarv eller Lagner og ligner corrigi.

11. Nymphæa for nu overvinding falion fiddre ollenlider gaa blandner om Nymphæa de den oftest vilde? 2 d. nu.

12. Phellandrii i stedet nu Phellandrium ?

13. Asparagi fra Archeaten opfeldfig i Kaptberg Kagerbe ovenpaa den; ifr. mend klodner fremdi de faaent fiuer fra Ruslaand og mine rede alle Drugnes total.

Genus XII.

Hispa er den vornfer ligaalle Coleoptera. Antennæ approximata. Naar begyndt ad, nu filiformes mindre lystnu mod para naar de naar lugner antenna bifoliatum ogner der uogne Elytrafed ollenz puncter para disse. De uofer for Elytra aculeata. Dette metha morphosis nu ubekendt.

Genus XIII.

Bruchus fiir antennas filiformes senem crassiores Capud ~~ex~~ ~~ertum~~ latis clypeo nu fuoar og ligner Dermestes de ringelle forvand som Carcellio og lafer ligefor med Sodderner ved ovlt det de kom nu i ligesom Curculio Cerambyx og Attelabus dog kan de pij fø~~rne~~ til uogne af disse genera; ifr. smedne fore de Capud elongatum som Attelabus ellen rostrum som Carcelio ellen anten: sedaceas som Cerambyx, naar uogen fomgenaligner disse 3 generra ny det uogne Kaufl & facie ad Kniger Branchus. Podex er mest uogne og fraaen ved de ads eller Trør, naar uoen Ebbner Ærts og under Ærts i Kondbønner fra Ferne uoen ofte disse ubrendte Ærter naar Frøer fra Ostindien ved ofte ogsaa ved disse, i fer Dia delphiskilerne.

Species.

1. Pisorum for 3 d. uoen Ærter para nu fiid argus, Halm fø~~rd~~ den lynnud fid fra Nordre America fra den forflnur Travel. Dage fraudes Ærter i fordøn Omnfledighed ved den ved ny crusi. ~~ed~~ nu fermula er Sandt. Naar denne Sandt er gaaet gjetner bidt fortil det ronde nu fugne gracula quiscula som ogsaa ig para Ærter Ent dgrer ved Vraaf ~~Sandt~~ Ilt de fraa Ærter Kjøner ved Ulemperne Ordbunde gaa fand Ærter ellen under uogler Sorgner unger Kadrik og ingen Ærter Ærter Bortfeende. Quiscula ellen ved fra dennes til dø de igen widner. Examen og ellen en Commendanten Spence fal til præmium para fremsand

Tilbud de landets 1000 Dalr paa Regnen vidskiøn de dog bortrinde Dem
Stogle Studer Guld de poneredes paa Dennes Fugl, men nu vilde man
giøre gjøm Dobbelt paa uegtet om uiøn saa ikke den egenn; Ej man
for finden af den opaad larverne til Dette insect og saa det nu
paa vorsaadenlighed at man uapper Lavny for uengt som en Solvnt til Sund
Solurigen paa formuer Dalr og Kragnerne her Solunds, Ser et Ti-
gula som ligger under Dyrs Nodhrat.

Theobroma finden oftte ligger dødt i Chocolade Sammenrullet den
forlanger.

Gledisia eller altid og gledisicaria canika Dar.

Bactris eller nu for palmeder som paa Dalr Jacquin fundt arch
for ogs Denne sprøbelvand Landets Denne Bruckus, er benyndig af
at Jacquin nylig uegt for Arch uegt om Denne Bruckii Landsta-
ner i Sin bog for Dalr Indtrædt Dalrnd Solum Cyrant

Cratarius eller nu de Trær som følger til Sammenlacia Dvor blant ny
Dafid og flere som Denne Trær som tabuner Dvor Indien paa og for
os og

Rectizicornis følger uend alle Trær fra Ostindien og forder vor den
alle total.

Genus IV

Curculio nyd formidabeli genus ~~dal~~ Dobin Dlæne i Dem paa bagen.
Inden i den forsaa rostrum elongatum Capute longius og i Dem for
er abbreviatum et depressum siden om de for de nest paa femora,
nu denes Lemmen tage ikkend allnu nem paa Dalr for paa
Dlandt paa det for og fisser og ikkend paa alle 6. fulbrea forskin
som følger bag fem Tapper, et dette for Dvekinnen de pyegtiger og paa
Dalr Dnel paa disse ikke Trær og Krigter nu nuuge ad Dalr og Dalter.

Species V

Palmarum gror paa Dalm paa Dalm Dræmen, de de gaar i medulla
paa Dennes. Ser Dant er stort og specieust nu for i Elmenia gioder de laver
el und Dalm og fænger den.

Frumentarius ruinerer Dem total Denne altid paa Dem paa Dem
og fiden begynder paa at ok. De Gjer for uegt und 4 og nu for Dem Dånd
uegt uden uden effect.

Pini og abietis differere i Rusinnen til Dem paa Dalmer Dalstrtil paa
Scarabaeus Rustici i den Dommer paa Dyland.

Lapathi ruinerer altid Dnus Dlad.

Paraplectiscus larver bor i Dody og Chellandrium paa nu Dlat nu Dem paa
Dbaa igennem nu Denne Dver, paa aart larven Dal formuldt Dyter
den og i alle Dynner og Dinne den uger fæstner gjiden de Dlier de Dlara
ylig paa Dæyhnen som forklaare paa det nu nu Dillner nu Dobe i medulla
spinali under Dnil und nu Dnaggmaal Dlier efterne Dvap paa aart
det er paa bnfoxet und Denne Curculio at den Dorm fig op det Dem fra Dem

man lægger den i nu Øl-tøl om ∴ derfor er troligt at den barn igennem
Jarmenter og til dig dette vanskelige ydlader den bedre end er den Skarn.
Den blæser aldrig igen den, det er det Prøv, det er det samme.
6. Fagi er ikke fildes underlinie under og over superficies om Bladene som derfor
er gandske Blatter
7. Rumicis gjærne Ædere paa Rumex som den æder under korn
8. Niccumoli Scolanier og bagen man dette lægger ikke hvad det var for nu som
var og Blæderne; men spiste Arch: hende fat prameem er nu for den
fonds Elever som kunde klatre ud dinner og nogle under Gyldende det nødlig
mand Dinner for at ringt og gjeder rostrum Bremen den barn ved hæftet
fil i Mødrene og paa Enggen efter Gjed; Dugen er for at gjøre et klat
gil med dinner; det som med Barken for med gallen Kort; det er derfor
bedst at ligge Mødrene ind Ikke fylt med lugtig Dand
9. Pomatum i Æblen er Skaf larver den under Jorden fil
10. Albinus er en det zærnst.
11. Bacchus æder og Den drenner
12. Betula æder og Den paa under Dæken om Dæderne som Chrysomela
13. Scrophularia opsolder og paa scrophularia som Dæder punkter pla fig nu
14. Storax og under med Dæderne
15. Pyri Condiens er det som er lygtsen Dæm om Jorden paa Jernner.

Genus XV

Attelabus er et nogenlunde genus at defenere ved Bogl med Curculiones anten
det er Tøllner eller er forendt er altid indvendig Caput postice retractum,
og bagfil sammenbragt, solder fig fast med Dingner som Curculio.

Species

Corylii naar man gaar ud om Dæderne saa ser man Bladene
der sammenrullede med krøbede Kanter dre Dingen ny eller
nogle Eg ellen Dæderne sammen blæser den er stærkelig at udlatter.
2. Formicarius Dræber Dermes: pertinax
3. Apiarius er den der æder larverne til Phalæna mellonella
som gjør paa stor paa vore Bie-Kuber, den gjør ingen Skade paa Bie-Kubner
ellen i Sverige.

Sp: Rapresloides og Ceramboides som Arch: med sin Dæder lord til det Dr genus
4. altera er den facies, methamorphosis og udbrudt, men den man
fraar nogle caracterer som den Fifle den fra Attelabi, selvogne gjør
udvig fri Stamme det som frøl som, bygge ner Stor og sorter

Genus XVI

Cerambyx er vanskelig at Fille fra Lepture, alle ner Sværd som Curcu-
liones, eller som antennas setaceas, Elytra ner ligger bygde fremmer og bag
den som ner skjemmelig dergnen paa Thorax og som den natten ner ellen fle-
ver paa Træer. Alle flæsk fig med Dræns Lægger Sædder som Cur-
culiones. Dræns larver ligger i gamler Dæderne den de barn fig
igennem paa Bænge og paa Æmner, saa fig ner man Dræns fil

paa Trans falder den undtil dertil apterede Hulsfølger sut, saltu Hals
bud i Fallet og giber lidet. Allarum lygnu forg Pent for at form om svagnet
nu inden form; Ifr om den er vagnet dersteff søger den at Arbeyde sig ud igjen
og giøre sommerten dette stillen den fra Cange ind fond ni Ormagtig
ind Dorfen paa Ludnu og Skaar tilbagebøyde fiddel larven genaunuide
nu maar følger ind. De Indlet i den forsøg Thorax spiculosus og inermis,
spinosus er af Ydlog umulig de fun for spinas mobiles, dentes ad latera og tem-
porales paa Hyggen. Inermes nemlig cylindrico Thorace aut subrotundo de-
presso.

Species

1. Longimanus spina Thoracis fiddel med dens bøgeis og paa eminentia sporisen
den Lou bøyes Snorsomhedt, tilbøyer min vagnet langt og paa nu den Hvnmud
paa de Indlet, som Lorde giøre different species. Elytra er caracteriserede
og fremmum del med fortt Dreb Dr punctet, Tibiæ anticæ subtus retrorsum
scabratæ og vagnet langen nu Kroppen. Fra America.

2. Cervicornis paa Halsen fordi ora Maxillæ Hjørnu ud Lige som paa Lucanus, og
Elytra vagnet flade lineis flavis anastomosantibus notata, maxillæ Lou
ny for paa yder Dieborn nu Lund uden paa indre flanger fugere at de ends.

3. 4. 1 5. Faber Coriarius et Desparius er vagnet lige Ira snoegudn, uden
faber er aterrimus, Coriarius piceus med fortt antenner og Desparius
er piceus med antennis fervugineis compressis.

6. Bardicornis den funden fir blant Insecta antennæ 4 articulos vagnfortt Dis-
den som gulen fremad, eggen paa Dorsum thoracis som haar fortt og ellers
Gnid med brunlir Anuder.

7. Moschatus fanz ud som glødet Guld lugten som muscus

8. Alpinus funden nygang i Vraane almindelig i Schweitz graar med fortt
macula.

9. suaveolens farver med moschat. Thorax glindser som ogildet Guld.

10. Sutor har gulet scutellum

11. Cerdo ligner den forriger Thorax rugosissimus langfortt antenne.

12. Textor brunfortt aftomen o valgen. alle 3 langt antenne

13. Stictis, fulgerator, Curculoides og holosericeus vagnet uden dagl tristis
graan brunlu med 2 fortt Flekken paa Elytra Fulgen: graar nelner fortt El-
ytra Holoser: fortt med fuchsia alba og paa ovan superficies nu lodd: som ligner
noget Floyel.

14. Kalleri fra Italien, ved med macula communis nigra

15. Depressus lidet farver med nu Dagrlinus valde depressus

16. Adilis lamina har under antenner med mas og fæmmarca med
vorunder Hanti Indnu forigenmum sitte Fingen fier og i Lorfe Dieller
vaffen mere ofte gnider, som den gnidner Wiland fol den forntgort Ergu
og den altid vagnet langt for at flade; Ifr Insiffen Dræn den at at Dlyder

for sin Oprindelse.

20. Carcharias grådbrydig med lade korte puncter eg nærmer Schagrin

21. Bajulus ofte i Brudnødter i gamle Bygninger som den totalt ruinerer og lader ud efter sig.

22. Crabricornis antennis squamis condecoratis inferioribus distantibus superioribus approximatis.

Genus XVII

Leptura er uegnet nogen Enkeltat faar caracter paa, men facies uegnet meerdelig Tydingiverer ved det at Corpus er postice attenuatum, Thorax nesten ved Depressus ellar for Dygnet paa sig og ikke Snelner Callos paa sig uegnet mere end en cylindrisk Arch. Lidt vilfoyn saa til nu subdivisione Blomdl Grambyces men saa er ottenrbn vrich end at det er et naturligt og ikke Kilt genus; Jeg skal lagt over nen ovenstaaende Tabel i det at De nye nen fra Forordet som De ogsaa. Det var ønskelig om nogen vilde examinere dem; Jeg har ogsaa Kilde mere faa paaskrivelige Tillægsnavne, ligesom det og var nu farlig at Numerere paa Insecter apparentes. De ad Vertnu.

Species

1o Verbasci paa Verbascum hvor larven opholder sig er ukiv

2o Betanld, er ligesom ofstidt begimod det saa Forunder fremad nersa Sofr.

Genus XVIII

Necydalis De forste 3 gamle forst characterer paa dette genus at de yder Vingerne vaar korter end de andre, men ellers slenger nen og dogsaa paa er det Kenjedmaner ikke lidt Tydelig, Jeg paa de andre species nem. Elytra ligger paa langt som Skoppen, men dog paa femoral bagved alder under, fidder ikke som paa eller Tiger eller dens bag femora nen Klum pigt som er beskyldelig. Jugum saa fand dens larv og nen de under vaar, Kiøndt eller nen Carpacist dognen minor, umbellatarum og Podagraria passim occurrentes.

Species

1o Major er stor

2o Cærulea blaar, Cylinder Laar men ellers lidt.

Genus XIX

Lampyris og Cantharis vaar tilforn under et genus, Jeg bygger saa Elytra flexilia, bryst maar men bøjelig med latera Thoracis Capitis nesten Synes incisur, Ekstremi paa dette bryst er saa mig og rodt, men er bryst Ker paa den saa bigger den i Colebbs. Dyre Dæler saa de ny Scutellum semiorbiculatum, planum og sondet snelt og solden under Thorax Lampi: saa antenna filiformes saa mange ikke Linnæus og Lampyris saa nen Kiempner end den aptera, men om eller saa det er nogen ikke Lodd. Baade den og saa bygger i Skovdet ligger Skinnene og gaar ellers under Skinnene bagved under Dugen og er Inge et Kiøndt Dnelen ellid ligger. I bryggede Gnie bronde men at famere

Kiøndt Dnelen ellid ligger.

naar larver til de Vinger, men Forskal opfødte i long Eidulaire og saae ikke den Forvandlingen saaledes den fik for, som blev apterа
Men Forvandlingen lidt de. Larverne differere meest ved at
fra declarerede. De ere Væpner og nem pellucide ovenpaa Vingerne.
Mares flyve om frem.

Species

1. Noctiluca paa Vandet paa land Græs som testuca ovina saaledes
den lidt lil
2. Sanguinea paa opladte Dunge. De 2de fikke Sammen for Arch.
ikke fant om de nem apterа

Genus XX

Cantharis Canth: Pharmac: lagde meloë tilforn men nu er det
paa samme genus. Ja Naturen noget synes at vere det samme og ly
tra flexilia men de har antennæ moniliformes de er sedaceæ. Cantharis
kjendes derved at Elytra nem mere lave og bøie sig ned, Capsul cefalum
og Thorax er semiorbiculatus saaledes den skilles fra Lampyris. Dens
larver har ikke nye taand ved paa. Arch: har forsøgt at skille nogle ud
men forgjæves, i hanner findes nu larve som har fort for vandvandig
krop, nu saae, den kronen Archiaten vere larve til dyr, de opæde Bladlus
og Væpt Æddere. Ing nu er Archiaten for under den nu den samme
som findes annoteret i Vestgothe Arkiv, Lepture navalis til det smelten
destruerer totalt Skibe saaledes i Gothebog den bore ligesom Cerambyx i Træer bore de vendt sig horizontelt i Træet gaaer siden perpendiculaire op ad og naar Eidne indholder at den skal forvandles gaaer den ud igjen i en ny Vinter og bore paa Stabning forbi, hvor aa gaaer den tilbage og lægger sig ned ovenpaa Vinduerne saae den forklarer til det den som et perfect dyr kan gaae ud, vil jeg conservere i Eidne men saae er det bedst at overfytte det med Eiser. Ina de Aphides

Genus XXI

Clater kjendes derved at de nye menen klodsagtige ud paa Ryggen, og altid aflange, Thorax gaaer ud i en Spids med Elytra, basis toracis subtus har en mucro som falder ned til ved siden Indelen er abdomen og indeler
De sig op med den naar de ligger paa Ryggen, ja de løfter op Thorax og
bøjelser clastice mucro ind i Hullet paa at abdomen fremtræder og de faaer
Vistorgt at vende denne Kroppen om.

Species

1. Oculatus har ligesom Øyen paa Thorax det lige ~~som fled er fra America~~
Beskrevet i Act: Par: 1766. Tab: 10. fig: 1.2. er Efter pupiller men Sveiv Drugger
det findes ofte i dette genus at mas har antennas pectinatas og fem
men filiformes
2. Noctilucus har ligesom 2de Øyer paa Thorax den lige som fled er
fra America skrevet i Act: Par: 1766. Tab: 10. fig: 1.2.

3. Spulator Insector Rolander beskriver i Vetenskaps Samlingar som han observerat at en Carabus som forfølger Insecter, men undan sinu Insecter under vand som en Crepitus som Kuttu snes und Skjuner, hvorav Carabus en Slag som forfølger mere forfølger Insecter og bergader da Elater igjen und forunder effect Kuppe nytes, und 3. Allaquen som Carabus ny vedrørende estimere, skjuer Crepitus under oad Insecter op de fute marken ock Sinuden ny Fiod und Kuglen.

Genus XXII

Cicindela og Buprestis nyt 3. generera som nu enumeriga bigligr. Cicindela som und Fyrk Sinne Coln forbest om alle Coleoptera som en Engen blomst under Insecter, tagne den i Slugtnæsolde fig ofte i Blomsten og paa Sand Strand, men som pudun ny Sandens larva. Arch. V. Kjøne som negong und Chrysoping saaes fant und nu Vand paa Sandu at bende Sæl und Vestfold omme paa de som fra gjeldsnyr blomsage mann nu underlig Klump som fonn Sprop under saa at jeg ny fat paa Insecten fronde ock Ikke noch Insectens larva.

Dynner flaar pd. Thorax paa Ophegnen ock bredere ned for mere Lattes Kindes Dna und fiur maxilla exserta som Insiggner i Roos. Sella nu funden.

Species

1. Hybrida, Ikke Vlamusaf Dna forand Sandi Dna Sjuns at giør medium mel Linn. Sylvatica og Campestris

2. Capensis Sviges und forr fascia

3. Carolina Skinner som glødnik Guld som nu blinge Skut bagen til.

Genus XXIII

Buprestis som bortnu Dnenge om Sommer ikke indrøgnt Gnaden Thorax saaes caput ny Thorace impressum usq. ad oculos ikon dæyner ny Elytra non dentata vel serrata in apice. Dn solde fig ofte i Dsen alle Sæder Lorvam og ofte mest alle nu skrinnende og saa mogen Guld Farven metamorphosis ikke kande.

Species

1. Gigantea stor Sommer som fuul Kobber Farve paa Elytra og Thorax og Abdomen subtus.

2. Ignita nu den smukkeste om alle Coleoptera Skinner som glødnik Guld og paa Dyggen Dn. Andre gange farvet som inclinere til Guld. Chiagerne selv Dna de nu saa ofte mere smukke end i Dna Vlademer som Forrisofnerne ofte nu er bn, nu serrata bagtil.

3. Semicornis som Ikke Skinnende Vlang Sving Farve paa Thorax og abdomen subtus.

4. Fascicularis Elytra punctis excavatis Sinne punct fur fasces om Sear, paa fort graan Elytra, gulen til Farven Dna gaar ny ind Sinderne som nu Skrufnl Sinde und Caput bonae spei.

Dytiscus og Carabus nu ungt nu slagt nu Dytiscus er skilt fra alle andre
undtagen pedibus posticis ultimis unguibus utrinque ciliatis saa at de kan bruge
dem i stedet for Roarer og svømmen derunder i Vandet. En Vandskilpadde
er i sitt genere at nogle har antennas clavatas og nogle setaceas. Der allerede
i Coleoptera kunde det antennis diversis, men dette er ikke nogen ung
dem og Eremita Wiedem. I saa alle Slags paa selve Kroppen og
formelt, men de har antennas clavatas som Plinden minnen undtagen
Man vind ikke dette metamorphosis som har antennas clavatas som de
ikke kan gjøre til et andet genus. Sternum er paa midtel med fiskene og abu
latum men paa andre siden midtel har plantas pedis antici udvidede, saa
det er ordet er paares lodi som hinden kan sold gjøre dette paa
midtel dilati som er segnem femina at segnem kan sold sig i sin paa
midtel, midtel nu og striata de ikke ogsaa cervina. Hvor de paa under
Maaen variere lit sexum, men alle er forskellige og dette man ogsaa
andre difference med magnitudinem saa nu de ungt mærkelige at deter-
minere saa at det var vistnok om nogen under kunde nu almindelige caracter
til at skille species. Alle kan under vor Dagen men om Natten
de er snedt under vor men mere velsomt dagen dem op og ikke sigter dem med
vaby de nu blev nu torven saa er ungt svært for at komme under vingerne.
I sit sommer er de ungt kiedeligt, de er paa sig selv. Dem er larverne
ud som Crocodiller med horrible kiæber. Hvor man ligger dem paa Myggen
gaarer de rænde omkring for at komme om igen.

Species

1° Latissimus sin saa ungt bredere end med langen, kugladen saa i Dette
den øverst ogsaa. Den er er ungt opsagt og altid glat, som Dytiscus
Dringer. Det er et glimmende brunt som man under er sit og det er med
den skin kant er det er gode med korte saar. I den under er Skaal bar man
der Skarlagen til hvorfor den dem med kan lægge sig paa fod, og saa altid
kollaan sig, hvorfor mas alle nu saa dem dem, og ny sammen. Den sidder
overalt og det med noget 100 kugleformede Legemer ny kaldt formiger som
Roesel signe. Med et godt microscop det nogle saar man det altid gemmen
Kuglerne alle saar Blære, som ovenfor til alle saa er puttet, alle
de er nu en membranus sid, som under til ny Dødt. Dø man paa
Kugler er temmelig lang det om gaar under kugler dragen sigende lang den
og blive alt mere og mere tyed. Under det blir den sidd og lænde sigende
Spidsen i fuldmuningen af kugladen Grund. Alle kilderne er der og
gemmen fremmed, ligesom kort pedicelli er under til
overgrænser og elastiger 2° Saaen de alle noget over kugladen Aand 3° den
man ligger den med prang Glatter.

Den kan gjøre 2de Spørsmaal? hvorfor er Naturen at det Legemet i
kugladen sidder, og hvorfor er det? og 2do hvorfor og hvad Tilsigt saa
formerer og ny fremmer saa det? Svad det for en nytte saa for Roesel

og friisk søgte at forklare hvorledes den sengte sig fast, men de var ellnier ved
gjøring Hatten til Stadens som dette Punct var paa, uned nyan Instrumentets
Beskaffenhed at det var Kundskab og nye undersøgelse. Efterdes bemeldte nyhedens
Naturgrund var en ovelange Kroppe Ladet det sig vistig forklare paa følgende
Maade: Da Kvaslaalen er stille saa lade den uendsiden Kropper stand, der de
ud om er bøjet, dette lykker sig paa nu glat Stank. Jeg nyttiggjorde
lille Stank Staal saaes Sferoale corpuscula ind og, men forekommer at
Kugleserne nu ovne paa. Ende saae Enden for Stankens Aand. Vibeen
Dybet fester sig strenge saa meget imod nye forglemmelse at der er på Staal
Tyr, og forholder Sfer Ende stadig fyldte med Kugleskal. Derefter den
alle Kugler nu med fine Kvaslaal paa mogen; fantrediers
1º De runde Skaerne forundrede dette classisk Scholus mogen tilbagerø
2º Blinde de ovne til indtrykt, og lagde i nygrund Skaf paa Svellen af
mellem Cimmer og Skibets Bund og saaledes Dage nye mogne Luft
kommer ind. paa denne Stanks fine. 3º Kvaslaalen og Ender fast, den
udvendige Luft trykker paa den ogsaa saa den fiid
bigjorde lose som nu Glas Klokke paa det flygtige Lar ved en Luft Pumpe. Den
Kvaslaalen udvortes torne Ender faaledes det formen som Glas-Klokke
paa Luft Pumpen. De aflange flugtige Corpuscula, som formentlig
kes til nu Skarfed, giør formen Cimmer som Lamt paa Luftpumpens
Cylinderen, og det lastefrie, hvorfremfed, saa bortjagne de Luftrum
paa med den udvendige Dens blinde dette lastefrie tilbytte. Men mere
end mere, at den korte Rudsigning punct vor fogns i 2det muscler vidfa:
som ligger i Øjeblikken hvorfor de og fiidt under, med fillen Dens Øjne
og forøge glemme at praeset. Denne observation for og Stand paa nuden
Insecter som paa acaruscabder: for ingen Skiver mere end Stand nyttid paa
alle & Sidderne fulde for figura hemisphaerica. Acarus avium de Geer
act: Holm 116:

Saa paa de 2det Lemmen Denne smaa Klare Skam som blinde flaad var In-
sektet lastefrie den paa mogen.

2º Hvorfor saa mares den ellner i nyellner derfor at den kunde fast sig
paa fil Aag; Ske de bunde de og finde sob Sitten, naar de ovenunder ligger,
bevoxne til Dyrets Spole tordenden Ende. Men mere bør jeg Udregnen
i Dyrets Forring, at den dette bedre kunde fast sig paa Luminus glatte
Aag, de denne actus naaes Immerlig lengre sob Øjet Dyr som Frisch saa
ommerkt.

Mas saa paa de Lemmen Sølder nu besynderlig Kvaslaal, hvormed
kan selvfølge sig gomdt fast. Denne Kvaslaal saa ende til nu Muskel
som Dyrets Kom kreller tilbagerø. Naar denne nu fatter Strenge fast
paa mogen, saa sætter den accurat til med fine Kand og omkring den-

med haar, den flugtige Muskel som ligger i Ryggen, og klæber fast, saa at ingen Luft kan blive igennem Dynen og det Dyrd som han har fat den. Naar nu Dyrd drager Muskelen i Blæsten tilbagerø, trykker Luften den sammen, og paa den saared materie fast, og altsaa minder paa den Blod, som Barn plejer at gjøre med naar de paa Dynen Dynkar 3de Sordenter ex Dynen Blive 1o in cocto da den tilligesaa holder sig fast med sinu Klemmer fast med Thorax og halsen. Ellers skulde Maadet det fælle den ovs, da den ofte tilligemed skimmen maar og i superficies aas for at drage Luft, og at dale om aftilligen under saligen Bevegelser den Dyr da den saa holder sig fast med nogen at ny Luften i Dynk, og under Dyngemaa skulde løsst den i Mytyrk.



Genus XXV

Carabus er en gemeenlig Slags at forstaaer under Insecter. Thorax er som en Sinnet som man bestaaer i omny for Hovedet. Insolet fig in locis conspurcatis den skal larver eller ordskillige Insecter deponere. Dy Slinie i majores og minores bruger Skildpad Paa dem ikke saar og skrøbelig er mauskelig at behandle hvorfra den bestaaer saa Paa dog sine øyne om attentis oculis pertustrer bygge Slagnur lettelig merke for Slenkelen paa facies. Majores saa det at ingen er den under Elytra ingen Vinger. De skar sold fig med i varadur Ender Skubber paa allerede mestnu saa forvundet fig til ford. Den Dagen er de rieder i skjul Huus ung om Middaaer lysen de ud ellers pruger allerede ud til at øyne Insecter som de forskrekkelig ubød saa er saa gemeenligt at om man saa finder Carabi i et Glas eller i Sinvandet og ligesom Lytiset i larver giver. Dy man finder paa nu varuddeu Slok Engen den i nu Bed og siden ondtrug ni Aar i nu saa som er fuld af Maden Angaaer Sid. udøyende og Maden giver sinu Huus Forudsaar lade de blive. Velenuiche lad til species

Species

1o Decerngultatus stor, fort, sulcatus med 10 sved puncter.

2o Sycophanta stort guldfarvet. Se den grummenster, mangen er ofte Skadeser paa Hen ogsaa af Maaden, saar man pilsar aftenfuardet

er for Qinsterne saa lunder uden barn sonder, so dnuer for lille ung fit Hel-
skab og ædel Krygen.

Genus XXVI

Tenerio er ungt lig Carabus uden antenna men moniliformes og gaar
langsom som sig in locis tenebrosis og gaar ofte i Skorstene og Skeltnygger
nu Snil og Sjøn for elytra til gummen vopen og har ingen Vinger. In
den barn Vinterlighed. In africanske er ofte Snuchnals Kniger lettrat
linde.

Species

1. Molitor Dens larve findes for Bygen og Mollenen i Mennlet Kaltnigalne
eller ellnen Snuens larver findes i Canis Brød.
2. Culinaris eller Brød og ofte alle esculenta.
3. Fossor uden fner den altid graver med Fremfødderne i Jorden, uden
Vingen?
4. Mortisagus og Gages er Sorte uden ungt lig uden Snufpunen for obtusere
Spids paa Elytra og er i Vingen Lørre end mortisagus. Apterasom sig gryg
ind med Snufpuen for Fiskligheds og Ernuligheds er. Studnerne er
ingen Tal for naar mortisagus finds i Snufpuer.

Genus XXVII

Meloe er Paracelsi Navn for elytra molia som Canthardes uden anten-
nas moniliformes Navn ungt Sorten i sin Gang og Snil er i Spil og
har korte Elytra oppen ude i Vingen kaldes proscarabæi Kyllen uden
paa Snuen paa Kommen og i gennemen Sand og Øer og
Vinter jo nudog de allerregelig som Ranunculus og Veratrum uden
ellers ordinairt Gras og ligger altid paa Jorden

Species

1. Proscarabæus Det er vor og gemeines scarabæus majalis som er solid paa
apothegi. Af Skellen er bruges for Gift lignelse den Olie, som den
ligger ud gennemen Luchner naar den ondrøns. Man bruger forfar
den ny for somen Kraft som vesicatoria som Augenus Clusius saa
vel nu Dogvoi er 1. Proscarab og majalis Kallen 1. magnitudine den
gennem ungt Lørre 2. at majalis har Blokbød i Incisure som Prosca
rab: ikke har.
2. Vesicatoria ellers Spanske Flue er grøn, eller ligustrum og grøn
Gladiour serrata saa som den uden er ny fnr. Den kiltom
lagt fra Spanien men nu i England og Skaane er at anemal
tinepsum nogen finds og paa salices og Fraxinus
3. Cichorii findes i Egypten af Hasselquist eller folia Cicho-
rii Arch: Ikke finds apoteque fra China til Friaulz og var den
Snvolen og som Arch: ny faar vom Spanske Flue Snvide

og hvem var var formum genus kuttrich som af dette var hvem vesicatorius Discorides var som taler om hvem vesic: en fræmmer som hvem vesicatoria som ved 3 gyldne fascis, som ordene quadrcrer med hvem og bonsch som og i Orient var med Egypten for at man kan tro fandt Ord Indianernes vesicator gidrik af for og Cichoreum.

4o 5o. Quadrimaculata og bimaculata kunde tiddigt om Naarnu i Danmk var den oppravnd og gior ikkeret sommt effect

6o Marci kunden om Marx von Nurtenberg: nu Upsal Student

7o Antherinus ligner Cicindela om i alle Blomster

Ville i dette genus ligge und sommtt var mon rømer den.

Genus XXVIII

Mordella er det ponctyligt genus af kinnch. Alle er lange ligger, alle sommtt unbøyne, ikke for elytra smalere oppe, forder segmentet paa abdomen for i lamina som ligger løs og øverst, de andre bagar sammenvoxne i Dantrne nu Lagg skjul. Aristoteles ejner af ungen Coleoptera for Egg. Hvem finder den paa de skjellige slags Blomster for de fidt og den Pollen.

Species

1o Paradoxa skjøt dig ny Lørn nud nu Kun antennæ rectinatæ var different usammen med de andre.

2o Aculeata for nu Lagg i Brand nu, om ligger sexus for den grønmon ikke.

Genus XXIX

Staphylinus De gamle kaldte det pediculus pulsatorius og nu Staphylinus navn falder. De under ogsaa fig i fugtig Jord, løben fort. Alle har korte elytra uden Vinger der ligger ny ud ovenpaa kroppen uden sammenhænger under elytra ligner nogle forficula. Hvem ligger rømer med de ny er de 2de Flaver i Dantrne den kan boyner op, ligger som de vilde filler, vesicula er oblonga. Insar klaver maxillas exertas.

Species

1o Boleti ogsaa fig i gamle Svampe og boleti er ungat fuder.

Genus XXX

Follicula er ni flygt Dyr ogny, ugan ungnd bange for at de falder ned i Pant, arch: ynnd ny vist om fan Kanner, uden flaver observatores kunde ikke af de sar kunde sande Cranium forsan er som trontes fogatede af ligner sommt Bark og Grundet sar ikke som ikke. Tulpius som at nu gor observator bestemmer ogsaa dette sar korte elytra und Vinger og i Dantrne nu Lard klor und sidelen den liebner ikke filler.

11 Hemiptera

hvad slags und Coleoptera nuhnelsor skal undersøges skal og nogle indtil
skal vores Dringnen almindelig ligger Dringnen lad mig her anmærke
bemærke, men den ny und nu sidste lad passede til sammenvanden som paa Coleop-
tera, ikke bør underes som nu nota generalis om disse, at paa hvilke lig-
ger forrige Dringen over mustre ellers vice versa og er denne Character
for dingel mærkværdigere end gryllo og Cocci ellers som mere at forens
til Coleoptera, som og er skrevet i de forrige S.S. editioner. Dette skulde
er bøjet under Dørsten.

Genus 1

Platta alias plana et planiuscula ellers 2 store appendices i Bunden Dens larver
som staar op paa de løv. Alarum Coriacea nu lucifuga. Dens ova rudimenta alder
composita som nu skulle i ordelige transverselle dele i sidst plane Man finder alder
ne og for at den faaer 8 Vinger ved Bunden sygnd er catenatum. ved Nautilus Sø

Species

1o Americana kommer ofte til Stockholm und ikkeuden skiber mere
end storp.

2o Orientalis kom først til Venedig fra Ostindien derfra til Tyrkiet nordne
beteiner sig ved i Vordningen som ingens og varmens synes paa Tyrkerne,
derfra til Polen og Rusland paa til Finland nor den kalde Torrazer
og Torrazani: ope de ved Coriaceum, farinosum og Carnosum i Kollier
opholder sig gerne for Mandens skyld. methodenat Dem den fore dyre,
der at vaere ved paa Mandens bagen ud ofte Mandens og la den den fren-
ifrel. sammen for ingen Dringer og er sort brune. Dens ligesaa ud paa den
er larve som naar den er perfect finnes bagpaa som siden saa sig er galarbut
den accelereres at fremloquum bedre at ligaa skrighen Terpentin paa dyrets
den er ellers og underlig extremiteter og supra Carinatus under
i flere loculamenter som Nautilus.

Genus 2

Mantis som Arch: tillord for først til gryllus und skiller de ner slags!
mantis kommer av andre Insecter und gryllus av vegetabilier de gaar og
lygger ikke naar de selv paa selver de sidst fremfødder i Kors ligesom de vilde
bede og selver de 2de fynder bene i Vinterne und staar paa de bagen for
ser denne Karsygjorne Catoliquerne den ikke de den prg gustryggier.
Den er Kollentolterne Bud og falder de paa Kuen naar de fore den flyn.
de pregtiger av disse dieder i Vormingens Cabinet. De har nu klor
paa de fremfødder, de fremste laar den bende, thora er elongatus:
de gaar ny langsen og nier til fremsiden.

Species

1o Gongylodes er mærkværdig den ved at femora har membranasala
tas.

2. Religiosa er i Østrigr og strækker sig ind til Africa Kalkes fora er ikke synd
dræbe den som er ovenfor.
3. Unicornis forårsager kalket ufærdi den for rostrum i Jamaica maxantennis
pectinat: uden af femina Arch: farbenisk ok det er Anthobiis viridis Gryllus
Precarius

Genus IV

Gryllus og Locusta dømme Arch: til ugenus dog ingen limites imellem dem ligger
fastes. Caput er maxillosum som para mantis uden forstilk og tænder fra ovan
oppen sittende og det udlevfolgende genus giør uden det fast rostrum ok skuinker
ud maxilla para synes Tid, grylli er fem uden tydelig det para dræber uden Cicada
flach depresse: En ede oppreiserede vinger. Sammenrullede fyldige ved Dangrer.
En for para Dangrer ud fik som er bredt ud nu membran stillet bag
membranen igjennem Ådernet som nu er gråtun og lyser af sine. En Gaude
for kalket dem ved Cicada som mere af fuldkomnet Flight og vegetos. Dette
genus er ingen videlig forundelse i Skriften fora udakte inden Kniplis
i flere subdivisiones 1. En for Caput conicum Thorace longiusculo og antennas
ensiformes Ikke bør ugler grøn øgl para ant: figur ellers faare bura ingen
Overdring para dem acrida.
2. Thorax Carinatus antenna filiformes Thorace brevioris Pilla 3. Cauda
selas duas Ackela 4. Cauda ensiformis para sammenser Fettigonia 5. for antenna
filiformes uden Jeugnen med Thorax Locustas. Larverne gata ens, fop-
pnt, ellers lidt ligefom imagines

Species

1. Nasutus langt forend hvid grønt og grøn.

Pilla

2. Antenna er filiformes uden fordeven med Kroppen som af Scutellum
som gaar gennem langt ud og er Carina carinatum larven bliver declaratus.
3. Variolus Arch: for oftrig fra Dangren para dem er variolus grøn med
Øjlstorrende flade og synende Ketler. Den Scutellum er ellers Dørren hvid grød
for remarquabel
Subulatus gaarer ud i en Spids bagtil. Dufsen varierer ellers om følgende
men lad ikke Species for Arch: nudum ikke decideret. En er der para en hvid med
Øjne para Øjnen, en for hvid margo, og en hvid Kniplis som er
subulat i venstre Forten.
Obs: Dog alle disse gaaer Scutellum ovenfra Øjnen og underliggende
Dangrer, som ikke forfra er igjengroet

Ackela

4. Gryllotalpa er den som gnager om Sladder ruinerer forårsager End-
lod og i graane ved det fore opædte ord grøn graver i forhen ugen
gjen fyldt Fremfoldner og giør fit bor som er tuved og stort som et
kalkon og under Øran Ørkner ogsaa det opfyldt med myriader af

Sanger, hvad Opmærksomhed gjør paa saavel bæsten som vingerne Folk beviser
Nollet naar han taler om dennem. han beretter om en Viingaards mand
nogle Miil fra Paris hvilken havde haft en Bod i haven og holdt der for at
Trold Kiöster i hvilken Landet han blev bekiendt ogsaa hvis han hentede dit
som begyndte at lase over det Trold-Kiöster. Ingen vidste hvor man skulde
søge Aldre og om de end vidste det saa nøgtede de ingen sig til at søge
det om Frygt for at henderne, som de sagde skulde volde dem der for vidste
hverken Præsten eller Viingaards Manden hvorledes de skulde bære sig ad
derved skrevs derfore til Cyprianus om Landfogden med største Bevægelse
hvilken Ulykke der var skeed, og de Aldre bevidnede hierde Nollet det samme
ogsaa og saae hvad som skeer var han ansøgt om at faae det til sig hvilke
de saa vidste var at der ingen sinn var dernæst resolveredes omsider med mange
Ceremonier og maatte en gammel udlært Kiering søge det ud med nu
Lauge men efter de det siden anbundne og betragtede om Nollet uden at Stad
hus bon begaae et Kiöster.

5.° Domesticus formenne hvilke Sætterne de hundredvis ud og hen-
ut borer sig igiennem Leer og Lime Muurene om Nætterne høre de ofte deres
Sang. Paa Sölen Vingernes basis anat, rundt hul som er bedækket med
en tynd hinde ligesom membrana tympani, men andre grylli som
og synger have ogsaa dette hul. De bande ud Vingerne synge med deres tagger
födder paa Vingernes under Kant hvilken Lyden som saavel ar afspan-
dige Kroppen som Vingerne igien lader til dem omtalte hinder og gjennem
der Echo som fordobler Lyden. brender man Dyr paa fordrives de ligesom
en man blander gule Rødder og arsenic og strøer paa.

6.° Umbra aculatus har meget lille Lyd men indad concave hinne
ved samme sidder, ut bider hvem ad rundt umbracula eller ascons
som ar camelleus som han bor ~~tracula~~ sig og lader sig ned efter Behag.

7.° Campestris almindelig i Jylland, biden i Skaane synger i alle Enker dage
for det at Lyden hører ud, bege til Solstitium.

Locusta

Har faaet dette Navn fra de Ældste og en vore almindelige bekiendte
Græshopper i hus i de 2.den Classer Tettigonia og locusta. Tettigonia hulmer
er i Vinteren at Overdøgnes formener men locusta ikke. Den ene har foran
en 2de lameller hvor som Stikket paa en lancet og begge uigientrængelige
som er sagnd i Kroppen, hvorved de stiger hel paa Barken af Træer
lægger sine Æg. Locusta lægger sine Æg i Jorden hvorfore de ikke behøv-
ver Bagg. Om man alene havde formeent skulde det være
menskeli slat hage til hvilken Inclusion de holde hvorfore man bør
for sig antennarum differentia bekiendt. Tettigonia har ant: seta-
ceas og locusta filiformes.

8. 9. 10. Cibrifolius, myrtifolius og Laurifolius kalder de Jonuln folium ambulans. De komme først nyst til Ostindien og beskriver de der findes Naturvidenskaber, og da de paa et Slags Træ som de kalder Nu Nalur et navn de gjøre indforlibes paa gik de ligesom de var levende hele heltes med for nu Forbi, men til alle Fabler som man og ingen Tvivl og tvivl den bygger i nu er de 3 nemlig Gryllus eller Cicada solitaria et frondilia hvilke begge Blad, som falder ned om Træet og gaar saaledes ligesom 4 Blade om Laurus med sine vinger.

7. Migratorius er den som gjør at faa store Skarn, da den paa en Dag kommer saa lidt som nu Ulge og ødelægger Græs og. De komme fra Tartarien gjennem Preussen, Fringilla følger altid efter denne Bonden i Preussen paaslaaede fuer Vinder saaledes at de hele Sorgen disse Ungfor komme der ihen og deres Qvedser, men kræfter de Vaadne Blomme Løver de ei med friedes ingen som deres Dug og. De Fringilla menes bor paaaaiches at altid vigtig paaredes at forker Sorgen i Korn Gaarden for at fordrive Korn Mæfferer, men nu er ved Forsøg bevist at dette ny Kan directe uden at Fringilla caleb og Capriatina kalder en Sorgen til Kornlagaarden som fejlen paa Mæfferer.

8. Viridissimus om Sofer Eyne, den dræbt mange Fuerkt og continuerer friske musiquen i evig nat.

9. Verrucivorus kaldes bort perfect Vorfner man lader den bide og gnage paa Vorten, de lillige nu Dage gaarne ud og giør at Vorten forsvinder inden kort tid.

10. Cristatus omvendt i Arabien og den som Johannes taal i Dukn, under fier med trant at fru, som, forlorne Dollinen med Ceratorca Fligga Dulcis for faa ved de kroner at Huer cristatus er Karp mere Vaselquist for fant den ders da de først Dagen fedes ligger i Ildelider. Ved fuerke ofte at naar de flyver over mogen Skov for de Fuerkt og Kaffes fedes av Dolgnerfalnprovelser til Dvergen Kaetnes og den nu detaalelig Skaadelig som ofte egeiserer Ilfenes Dyr paastaaes at naar Skaals Dorles Dyr Sous som blevne optaget med Dvergenes da nu Engelsk Autor som har gjemt Angiffer paa alle Dyr som bestemmelser Dvergen os ovenat lidet Land i Africa hvor Sølt Kalmer Kal lum og disse mere blive aldrig over 30 Dage de Mosfer Kal avlinge i den som gaar ud og suger og ler nyeste. Under Dvergenes navn paa disse Dembo Nigro condecorata ogner mange Kanner.

15. Morbillosus Thorax quadratus niberrimus, verrucosus; Elytra violetlee med gule Tværbånd.

16. Miliaris grøn med ophøjede puncter.

17. Tridulus springer godt.

18. Pedestris som Arch: langt forhøjet for en Puppe indtil dens forsynet at den paarend sig og ligeledes hver paarer sig forneden det nidoclamatum.

Genus IV

Fulgora er ungt lig Cicada ved det de begge har rostrum uden Fulgora har para antennæ et capitulum som fødder para pedicellus brevissimus

Species

1. Lalernaria har en ocellus para under Vingerne para forandret fødder at ødelægge rostrum som er bøjet og lyser om Natten, kaldes derfor Lucernarische Lygten. America bringer de at falde af Glas ogner finder de den ved at skrive og om Vinteren falder de ikke i den Lysgt. paa hvor det er at de gaaer om end Lys.

2. Candelaria er fra China lyser og para som Lys den bliver i Frankrig naar og lyser

3. Francatus fra Savoien er lig sig brun som langt Vinger

4. Europæa bidrager, grøn, ligner Cicada, ingen har fundet hvor den grøn det andre Tvivl

Genus V

Cicada er storere end alle Cicadæ uden de uden der har Pelver kaldet Manatra. Arch: ikke giver det storre det at aparte genus om hvor allerede kunde faar tilstrækkelige caracteres para dem, de dens metamorphosis er ukjent. Arch: kaldes de storre manniferæ fordi de afsted commen vælter manna fabrication. I Calabrien vokser Fraxinus Ornus som er lig vor Ask allerede fuldt sorte Blade, de store Cicada sidder selv paa Fraxini Blad med dens Nab og suger omkring en quantitet Saft som Vaxtræer efter bevarer vilder Saften fiden ud og faaer consistence som Bolnus Vederknude, men kaldes fiden langsom udgaa Dagen om de dertil de opsamlende begges forud nogle Blader for at den ferdige veritable manna Calabrina. Hedysarum alhagi giver ogsaa Slags manna og har den samme forfølder Cicada. Tamarisken Træer voxer i Spanien ved Kongen under dager ved siden Bathanici om det Land Moden at plantere dem for fit manna Skyld men de blatter ikke derbrydet. Anjsbonfrøerne bruges at der i Arabisk Ørken hvor Israels Børn gik igennem, uden ingen manna

og vore det Korte og det Forskaal nykomne til at undersøge det Archiælens
Beskaffenhed nye Inseker: hvoraf Jeg nu og saae Prøven i gemmen nogen
af dem som paa arabisk kaldes Chillim og bolanice acacia bifolia
som giver Gume Senegal eller arabicum dette var arch: ny
lidt udseende Cicada skik. som sidde ny undforlidt, dørket, og saa
det under Skorpa om manna, at de hverandre kunde meddele sig
præsser experiencer paa Senegal hvor mange dem opholde sig at forlade
dem uden at blive synderlig vanny. Det bortgaar begge det Kort
efter. Jeg det ungvanny forskjellige i Tidslere at de ny para 7de
dagene kunde formele uenny, og ogsaa dagenen altid bliver formeles
dem det ellers blev, udtænkt saa troer jeg det allerede var nu ved
dagene Erstatning og Frigt. Alt dette er hypothetice sagt uenny
manna nødvendig saa er kommen nuuge klart nok.
Skorpe Cicada sidder stiller ligger de Vingerne over hverandre
om Kroppen, Rostrum under Thorax og antenna setacea. De fødes
ikke paa Træer og udfør dæslen flygt uendelig ud av blade
den flæsne sig som Skjæn omkring dem, dem ligger skjøn fly fra
det de ny hens ved Fugler.

Species

Cornutus findes paa Cap det Trans Kinnes Calan Farvan

Genus VI

Noctonela bigent ingen Cicadæ uden opholde sig i Dagsholdernenn
uden Pylon, cilcatos som paa Dyliscus: Vrøvlingen den allerede
paa ryggen, med Sølvhaver op. Vi gjøre Fiskene gaverfi saa
og Fiskene paa Fiskenes Dage vor Skrekke.

Genus VII

Cimices gaar kunde dem at de alle ny Fiskeskude vor Cimæ
saa regne Vingen fuer ud som en Pupe ny udlænk Kiøbenhavn
en Fiskefat ny kommen fra Indien. Arch: Linne har vaagt paa
det de Indien forvandlet til flygende. Scopoli siger at saa
ent den flygende, det maatte vaere uenny den som uden Dæk
Vinger, som i Indien har Corollas uenny fuer kaaner de ikke ud Corolla
flores mutilatos) ny den uenfer uden Vinger. Archigten var
Tilforn ungvergen og det at faar fri Vestlen Cimicifuga fra
Iberien som den nu har faaet uenny den siger uden at Cimices
den forderves. Alle Sverige findes de og Lande staar i den Kreds
til den falder i forder til Slim Vaerfjæt det paa den forderves
de. Alle Flak Vaagtrøver dette fuer de Kraftene ud, og dette
Lantan de den.

Species

1° Lectularii som rudimenta alarum Capitain Eriebergpaastod som Arch: at paa et Dyr i Ostindien foraarsagede disse Skadeligt ungt, gaar om Vaelkinzen. 1670 kom de første til Engeland Lugger 3 Gange som Skarvl, selv man nu med Weggelues og besvellet Kraft i Castlen saa man dala paa at de ny nem blemme udlellede uden Liggen med Liv i Stat i Paris nu de forstraellelig at dem.

2° nobilis De 3 paar forste Ruder fjuns ny paa violette Lyggen naar den ny dod

Coleoptrati

Kalkes de fogusar cartilagineuse Weiggen mau ny sutura vel conjunctio alarum udden ligger omm fonn under i Denne Afskrivning er ingen til Dens Oeconomi Videnskaber Linnebled og Coulelaren.

2° Cristatus Horst ar oller

3° Personatus Dens larver besyndelig i Dens Gang med det at faa Caster Fodderner i Korsbog at som altid Dyr Dyr over sig paa det at saa ny maar fjunde. Arch: sar saa Dennes i fil Kommens de Dender med fik restrum fattede i Crinexlectularius og funder ud Castlen mau siden slipper fra den sand mau molan Dennes Kunde mau blive frie fra Weggelusen. Weg Dennes fik Clerx som forst fandt den Eyst at arbejde med Insecterne.

4° 5° 6° Tipulans stagnorum og lacustris som langer antenner; langer Fodder, stragnales finder paa V paa som lacustris mau er faldne de.

7° Baccarum paa blaar Dar og Dytt Dar.

Genus VIII

Nepa som Fremforder ved Forendel med nu Klor paa og nu Horn med under, fodder forny den fenn som nu Scorpion som i Dennelnu nu lang mig Dygg som dreles i Dor

Genus IX

Aphides nu gantske smaar grönner de har 2 Horn i Dennelnu som nu Dnnl Dg Ell. fa mau i Dens 2dr Tuberculla Lider nu Dennes anus og altfor saa de 2dr naar de ad som fe ud de altid Excrementer ne langt ud fra sig som nu fodl, og Kalder Honningdug, nu mor Ent lil Faruu. De nu Wlgrnrens Wlrlk Kogn Ile Dor Wlgrnner gaar fenn den finder aphides og Wlgrnner i den ny opslider som ouden Insecter, uden de lagne Dnu ou bugen Ar de fenn til den 2dr 3dr 4dr og mehr lifom de mellnd fem Dder

Indtil i 5te Generation udøve de parvens uden nye vingen og Sommerfugle, de kommende Vinger uden om Sommerfugle for Aristoteles Tydelig para Dyrene i Vivipara og Ovipara for exception. Naar Vingerne fuldes undergaaer de ny ydelse uagtet Forandring om ikke den at de fiskene Lud. Nogen Gange Vinger ovenfra ingen nu Tid for Sommer og nu ovenfra Tid for Sommer Vinger uden de flyder nu udøve. Det er vanligt at for naar de fedt para ellers Blomster de Blomst begynder sig ind og bedækker den og bliver vådt, saa at det ny vinger paa den. Nogen Gange aabne de ofte og foldes. Naar gior species ikke Vintrer som de solder sig paa dog bor det flere paa samt og ny lagt der saa nu ikke ovenfra fiskene paa den ovenfra Vint og grøn species de forenes mere paa ønskelig mange som Geoffroy Arch: for gjorde den til species som virkelig Levende opfølger sig paa nu Vinter og ny de species som som er virkelig Differente. Naar man varsling de den det facit de er nu vanskelige at bestemme. Color og proportio naar skiller mangt der nu den er saa at den ny kan expromeres Dyd. Naar for ovenfor det den saa Vinger begge under aphides der lagne de under til.

Species

1o Quercii proboscis dobbelt langen med Kroppen som gaaer bagad i en Krog.

2o Bursaria paa Populus grøn Kraftuden for Blomster paa Petiolus for bøde Kugler der ligger papilla mogt paa Bladene og gjord i opfyldt med 1000 om det species forudne Klorer den ligsom Blomster paa over Tiden og gaaer paa den under ligsom en Ring som fremkommer sig paa Inden Bladets Langde ½ rodagtig og opfyldt med Lidt fuldt Springen til Bunden paa over Tiden men paa fint grøndt at det ugger Kanudes fr Anches Krone paa Land ad ved Sandt Gaard Rumekjød Dræber som bor Inden Trigt, uden det paa bort om Sommer. Bursaria som fandt indtagt alle Blad paa Populus Sommer Tung aptærer Bursaria paa under Tiden om Blomster paa det at det ny moder vinger ind i Vinter bor

3o Pistacia med alas foliorum og ny paa under Ærker om pistacia vera, dannere disse aphides ruder vådt folliculos hvilke nogen med til ny pilhoris Klorenfor og bliver onne nu Sommer lyst ovenfor bor Inde, de folliculi findes i Spanien og onne Inden Orient, bruges til Sovrød farven.

Genus X

Chermes ligaphis uden alle for Vinger og de nudent aphides for

Vingers, som den det blomstes med dem; men disse lygger som en Overbyggelse
ikke er lukket som omvendt ikke som en Krystal om hvilken de som en Dagsom
de fugnes fil som Blomster med, de som ny Horn i Vinterne. Disse Ko
som Ulmus Vingerne Planer som Tilbage og de nye Ennuch og Vingerne
Communiceres mere som Aphides der de hegatinisk og udbredt i Larverne
nye Loraler og hvid selv fra om Qvistenes som hvid Velv. Trans oeconomie
mand man ikke som Grøn Qvistens hvilken ofte vøde tubercula som ligner
Jordbær, og ikke Corall farlig er som findes Ester ved egne ligesom sucker
strobili en tinctare giøres om Chermes abietis Copenhar ad dem. Kaspel
det som forangaaende genus forenes fem species alle ofte Vingeløse og
sidde fast og have en mere bøn end disse Ennuner som mere cauteraftagne
som med de forrige.

Genus XI

Coccus et Slags Insect Kaldes Coccus et Slags Farver Ester kaldes Coccus og gramen
finder som grøn Coccum den Mand som Insecten som Archiater, hvilken
en sådant farve Auctorerne ulimuddelig kalder om Coccus polonicus og Coccus
opuntiæ, men Forlum. Ikke som gemer de almindelige bukaut Coccus
Kaldes forrenter Archiater til Coccos som det aftjæneligen mere mere end
dem til Navnet og de man altid finder som Diverse Ung i Naturens
Skov Skovir under et Navn. Femina non apterae, men mares alteriorum
for Vingers. Corcine naturali som de positiosis, men bør medtaget til hemip
tera og just besøges Vinger; de ellers flukt mogle cimices som have Vinger
for og mogle grylli marchere hvisser. Ville nu mangel sucker. Der er rostram
som Krystal som de forrige og fare som en Dorsler i Vinterne. Mere sumere
nu frugtsommelig bøner fun fil rostrum i Lomt som at fun nye mere som
det er de Kvinder fun og blinde Kong og Ligner et Øje; men Vingerne
blinde indskrænkede Sumer som ardeh og Skovene og Kommer ud. Det Chermes som
apotequel giøres confectio alkermes, dreber mere Vingerne som de nu
Guldvoer som blinde det den Fiduenster Farven ere. Karmesin Farver.
Som Scleranthus, urg urse etc. fejeres nudent Vingeløse som nu som de nu
med St. Hans Dags Sicher som Modhaver, nu lyst, mere de kornblomster
det den højeste Coccionel Farven som kaldes Coccus polonica nu ubekendt
som mere som Fald det blive det et fornil den ophøjnes Dager nu
den coccionelle som nu i America som Cactus opuntia de forøger fig ubeli
gnu bøn men som Erg opner et det ikke ringere som den mere de vil
dreber den forøger det fortil de er.

Species

1o Hesperidum mere de nu Vinger nu de unge fjuligr spiegurtig
som Qvistenes men mere finder nu frugtsommelig bestrøede

fin Duroul i Borkn og Commen vilbrig unnen Kiøbere, fra det Konigeriger
Brüar Kint ved uno fra Ingns Folder som altid nu indtrager begge
de og undnu Kiøl paa dyg de ved en Ofuaar Folder for at skulle
fig. Dugnerin vopa fora lauge til de ny unnen fiaay Ainer Modrenus
Dig unnu uirkenlig billegner og Modrenu ufornlig Kjøvnelse og
de fig der ud om Modrenu Enunch allnu Kalline, begnsing Onisci ad
op Ingns Moder. Dark uengt Citronerne i saadanne folde Kuger
Orangenerne unu Commenie de fuard i fra Lufkn Kiøns Cocci eller
Lauge. Sapindus og andre fordanner norn Kaptner bin utrolig Dark
om Kuger:

2o Aoridum fulgte und Camellia til Jorenu i Upsala unu propagerede
sig eller

3o Capensis Folder sig paa graspkalium muricatum paa alle Kiøbn
und fuid Tuberculata.

4o Ilicus paa i Provence og Kanln Orienter gresunger begnsing for de
uuidte Klad i det genus Torgnede i Conlnu Kjøbnt Ilex paa Kuer
nad alla foliorum fiden vden folliculi begnaude Dyrnbeer unu Kjøer
fom de bruger ad forenn Carmosin und og paa Apoteqnet til confectio
alkermes. Dreich fom det vierk ad Cochinin begnt fom dyr fiuogler
Qvistner und Folliculi tilfnuch og giorde ungnu Farn skuron og und
Jorn wonnde ad tenere Archiater und ad giøre hvad det paa forne Kuegl
og paa hvad Mordn den Kulin propagereres unu Arch: fom i udfaar Kjøer
Kjøenu fiernede paa det gun ofteu det ovgt. paabnbig Mordn. Du Insecter
fom giber disse folliculi nu uafnu ufuuligr unu paarnb de fuunge
fuidne fasten sig und til rost rygn paa Kuer quercus og nogn Kilaf forman
pisinibri nuvnlig fuikkne i fonder og ad de ovn Jorenuer
5o Coryli unu unnd ny ovnden grin Jeruu, bon forsøgnes unu Kal bøsnb
und fortb.

6o Kusci ovn den uoraa fnns Columni unudr figur

7o Caprea 8o Salicis den fonste paa Blackuer, den anden paa Kilenu

9o 10. Polonicus og Pilosus ny uerkkad fora ad uaree ny unnd uegt
ovn de nu differente species, gienn Coccus Polonicus og fuidns paa Kol,
Kuer ovn Scleranthus perennis fora og paa annulus Kjøny fom nd
Kruns Kopu gienn fosser Jorenu und den ager Coccionel Kal og fuidn
paa Formentille og Potentilla Kolder.

11o Cacti paa Opuntia ny uden Coccionel. Arch: fiøbra Polander
fra America Opuntia bedekkad und Coccionel unu Kjøbnhaarn
uoruenu Kjøbnd op Vnedrnfnd aller ovn de Arch: prasiderede
Garden fom Kiøbnl figur ovn Coccus cocci til Ellis fuikkne nu und
fonde i den Kugnder acterne de faalr eller Kø

Genus XII

Gripe nl. den mindste Insecter ved mindelige Blomsterne af Leonboden. De svinger Bugen opad og hopper fra hosk i Vinkel som en lav stal skal dette. De Geer mener at de Pal som Horne under Fødderne som naturen vente over dem som elastiske Krogger hvorved de hopper. Dens species er det at finde af Coleoptera ingen fødder nuden Kaude og dager dens Vinge.

III Lepidoptera

Ved λε πιδ squama og πτερον ala, de det Vinen som ved dette paa dens Vinger seer ud som Støv under microscopio. Ellers synes at Naturen har caracteren paa dem ved at de har 4 Vinge pr. som er squamatas og de under linguam quasi in spiram contractam som en Ørs Fødder. Hvilken de kan strekke ud og saaledes føre Dasten af Blomsterne, men nuden Phalaner har ingen Vinge og allerede rudimentum linguæ. Ellers i denne Klasse er for Archiaten tilfaldne papiliones og som under dette indbefattes nu for ordenlig Vinger med Insecter, hvilke man dem i Diurni og Nocturni og de første kaldes proprie papiliones men de andre phalenas. Vi kunne notere nøie var ny kjøbelig og de Archiaten fandt at antennarum forholdet var constant lang som deres caracteres generum kaldes dette papiliones som havde antennas capitatas, hvilke tilligemed Diurni h: e: flyver om Dagen, de Phalenas som havde antennas setaceas og flyver om Natten. Papillione har Vingerne perpendicularit oprette men Phalæna horizontelt paa det de ligger bevarende fra Kulden. De som flyver om Dagen er ofte meerde pragtig malede end de som flyver om Natten, de pragtigste blandt insecterne, det samme som Lilierne blandt Blomsterne. Sphinges har antennæ midt paa hvilken flyver om Aftenen og sover de tilligemed dens larver forandrer at sove blind og for en Dag i Vinteren fra at de nogenlunde formilde de gamles Sphinges som i Egypten ere udsugne i Ulme og fremsende Arch: lagde Kulstuing at Kalde den Sphinx har alas deflexas. Af papilion har vi 273 species beskrevne og Sphinges 47 og af Phalæna 460 som Linnæus udgiver 779. Lepidopterorum las versar lit under Dørene 16 Fødder. Larvæ papilion har Dagen men Phalæna om natten under 6 Fødder under Bugen og 2 i Vinden hvorved de skilles fra larvas Pentrediarum som er ikke mange lige og ade Kladen men har med 16 Fødder. Dennes Ordo er det samme som planta coriacea fos Vaxlinen. Vaxlinen opædes af dem.

Deres larven bliver pupa bliver den Poetiq ment gemeen papiliones
rund ligesom et Korn i Brød som Phalænæ ligesom Sphingum og saa
de nu Dygge paa bag Delen af abdomen. Sphinges ligger ofte 2 dage i
Puppen. Papilion: larver spinder aldrig Huse forfærdige allenn
med bag Enden med noget Trey ellers crudt. Phalænæ spinder alle
og giør nu Dnel Slat om sig, under dend under hoyer fuldeer ringe med
Steer Bider Kelommenes saa vel de ligger ligesom i Follicler. Sphinges
ligger dem i Jorden.

Papiliones Dele i 6 Vrudnedelinger og Phalænæ i 8 som nu papilion
nen saa megt differente i deres Klødnelse og sijnes ligesoge at der
er ildige Skand og den dykke Archiaten at det kunde ved en Lupe ligt
at dage Skarn om den gamle Sollskags caracterer paa deres Skelne
og bør nemen trivialt forenumerlegt lagne ved de Dæglige forudsiges
larver ade, uden som mindst Dnilen nedenfor bekrecke de fin Fød
og lang Ind Kurve gaar bort ruden Vinden fregsperiere Hjelp Vaptu
ille ade ifer Indianske og mindre dig ner uoungningelige at forvende
mennesk Kurde Skjemmt er uogen Ting lagne fee det lagn Skarnet
er Sjemmeruns Skabning er unyttig og derfor lagne Skarnet
er Homero. Jer Arch: supponerer at nyttner stadere bør nem finder
i veterum eruditionem.

1° Equites nen de Papilion: som per pregelige, Skibner de fer ofte Vejg
ner paa ligesom et Korrem paa det Vaingnen blim Engegnen paa
Jeyen det ynlesten med bag i Ryg fremme ad. Bog undergnes nesten Skam
Priamus forung uden Skonnets uma er Skorte nesten Equanter
bend ligesom Priam: uer Skam baard ned og Ydendgrugen forder
paa Vaiggnes egen Skegnt og det grønagen det Kundlende Dillenkoffe
Helena Kinnenkiblaer Kortnn glandsnei paa Kiæbet det nesten
end i Ryggen med Skeen et fen Langen paa nu fer Kunst Kunst ou
det med Kaan Provinger Skarn 2° Menelaus som Kriger med Hele
na sonis Vaingner nen fer Kergelder at ikke pregelegnen konconci
peres in rerum natura. In equites som selv nu Kant Kæmnet det
Kamid Kæmnen paa Vaingnerne Kalder som efter Trojanerne som
Kaabe Ratdillen og disse Kar ikke nu vel Blod Kæmnen ved Kryfent
ellers Basis alarum, uden den brogede Kæmn som er nu Kæmnen
og Kæmnen Kæmn som Kaaner Grækerne. Blandt disse er Kaard Kaan
ligt og mindre Personer. Indlangelige Bruger ikke Kniskuchile Skab
ellesolor som Kæmn Kaldet den som Kar alas caudatas efter Kaanelige

Tvivlsomme men de som nyttes ikke under.

2. Heliconii som er ofteste Dyrene men nye Fiskene og nogle andre ligne ofte Fiskene paa nogle Maade uden at Slutte Kappelen ligesom efterfølgende som er alle Dyrene uden Skaller i proportion med de andre Navnene til dette er taget af Apollo som fiskes paa Helicon med Musen som differerte Navn som er ofte Fiskeligt Poeter og ellers er de lidt ligt Navn at faa paa denne Classe.

3. Danai som alas integerrimas metaphoren er denne Indbilding er taget af Danaus som havde 50 Døtre og Egyptus som havde 50 Sønner hvilke giftede sig med hinanden men som Oracel som denne Generering foraarsagede Danaushungen Skylde befalede Danaus sine Døtre paa Natten at dræbe deres allerformuende Forældre nu under Skyn af Trøbl. Danai er nulen til Grund forringe hvide eller brogede. Indvendes Navne som Arch: taget af Danai Døtre og de brogedes Navne af Egypti Sønner.

4. Nymphales som lyseende Dyrene. Navnet er taget af de Gamles Nymfer gemmati de som er ligesom ædle Ænder paa sig, Phalera tilnøyer forskellige underlige farver.

5. Plebeii fuldende dens larver er ikke og ligen Cniscos Navnene paa denne er taget af Argonautiske Expeditioner som udfordres eller de af Drageen bevogtede aureum vellus.

Ved de Navne gjemmes som mere ofteste commoditeter end gjøre Kundskab i Historien. De som mere nærmere er Papilion medens ovenfor er blevne equites achivi eller Troes etc: Plebeii er nulen rurales eller urbicolæ de fødes som er mere Skeiende og ucrudte forskellige end de fremmede som er gjemmende Kreiende.

II Genus

Papilio er mest alle, i regarder de forrige, flygge og smukke paa en Maade fine mest triste ved sværfoge de har foran Navne af Furies infernalibus eller andre som Poeterne siger findes i Helvede. De Dele og de som har anum acutum og de som har anum barbatum hvortil kommer de som har ikke form og differerte larver fra de andre ligesaa lir og smukke Dagne.

Genus III

Phalæna Dele i fem Slægter de som har antennas setaceas og de som har antennas pectenales de første Noctua og de sidste Bombyces de andre Indbilding er 1. Attaci Lakes de hvis Dreiger er ikke inflexæ som Bombycum eller Noctuarum ikke skraat udbredte

forvandler Dyrene ere de under Vingers Gjøns. Geometræ larver for
ellenen 6 Fødder under Bukken i under Dinnerne og ingen under
Rygne for forend den Worm forde de gaar bøjnen De ikke geometræ
for de under Vingers bøjende maaende som de øvrige de ovrige Phalæner
skrimod for deres grøron Dens Vingers Horons horizontal ud for
at den ikke skiller para den anden.

Tortrices Dens Vingers ere Klumpigen eller bøjnen af Sugur Tortri-
ces kaldes de fordi deres larver ville Blomster sammen.

Pyralides for udsom et med basin Konigl Delta Vingerne ligger flade
og bredelling de under ere de øvrige Micrips for gemme deres Horn para
vis Phalæner og derfor benævnes det.

Tineæ indbefatter de Dvergen, nem som sammenrullede cylinder far-
verne gjøre folliculos som ere overbun i Kuhne ellers og ligger den under
bygn superficies af Blomsten. disse Frøene ere subulatæ og blive hængende
i deres ringere udvortes Bor.

Alucitæ Kjenes med det at ala ere fiske eller digitatæ.

Species af Tineæ indbefatte nu sol auctores Worm som saa groft fig
begaaet i deres Dint af Naturhistorien men det maaer afferoches
at specierum Worm forøvrigt i dette genus som de øvrige bør forandres
forafvard men op degne para sord Dvert de opholder sig og bør de ved
sætter dem ellers udøgt end uyr specierum Worm uanerkendt at holde sig
ved de ovenfor gjen allegorier. Mere Worm gemme para Lepidoptera af
Verlenzen, Hvad mere vil mere sig de nuhed ere polyphagi, under ad
vil at Morgen uen for Mad Dyrets Lord de ad flenen som Phal: mori der
ikke molus uen kom og ad folia Lactucæ, Fici og ulmus. Ellers ordines
dette ind i dem som ere spirilingues og clingates de Bombyces og Noctuæ
ere for mange, dette de igenem ind i dem som ere cristati h:e: for
og Horonud Hjørn para Mygnen og laves de som ikke for.

Phalænæ for uden spinas para Bennener men ny Papilion: Hvoldfar
alas reversas h:e: ala inferioris margo exterior eminet, dumfedert
extra superiorem. Bombycis og Noctuæ Dentlinger artificiel,
men ere bombyces for mange at de ingen uden differentiis
specificis kom expedieres, og bør paaske de Fuuenser ere dem,
med forfer para Fnuch fjuns at forse antennas setaceas men
de ere dog para latera pilosa Skjellet ordrig fens para Noctuæ
Attaci, Bombyces og Noctuæ ere til larver meenflegt fora at
de vil kom langt under nu Slot, men geometræ ere different

for ovenn forvandt i Krusenuch i larven som til Kornbiugnen. Naar de fiske
for de flaver udspren de Vingner de den blondt den nen mange forskjel
Arch: Inelnt den i 18de Skiller ungelig i den som for antennas setaceas
og de den for antennas pectinatas eller dyder for Arch: for alle ligger
Skikkommelsen giennt dennes Navne nu ogsa termination for at aller
pectinicornes slutter sig paa aria og alle seticornes paa ata Tortrices
paa ana Tinea paa ella for for nidt at de nen finnar Pyralides nuche
paa alis og alucita paa Dactyla, hvoraf man i nuforst kan nide til
hvilken ordo nu fornt forfaiert man finner nu Malan: naman, atta
ci, Bombyces og Noctuæ som ny forskjen termination, man for fraguent
man finder nogen uyr gien den fornuen termination som den ordo
for hvertil hun finner. Tortrices for oftes Navne ov Insect Bonelnyr
nun Nb ov forskjenn som nygrordt sig navnet undigr ved nogen Ord
nun tinea Kriniod ov forskjenn som gennid ad nogen ovn Insecter.

1o Reaumurella ov Reamur som giennt ad 6 Tomer ovn historia insec
torum, nl hyppelig Werk kan ad mind fit Dagl skrap nflnr Arthia
ten, som for finder figurer nun nor finly ungat indtagnt i den forde
forudo maitresse falsch omvidnt den fonds observationer nun ar
lagt.

2o De Gerella ov Grinn De Geer for observeret ved ficcidt metamorpho
ses og skjønt til Lutikke Arbi Skulingner som for finder giordt. Di under for
foynter Ogen Reamur omskiftr og ov som repeterede og affirmerede.

3o Sulzella ov Sulz nu Freiberg. Ifil for fal forskjen mange uorvegtige
Judfold og tolnr ovn nu Officer forge bnskjell som at vekn nu Compilator
ov Arch: hvori den former forsynt det mid skiendt Sulz ny vil belsoar de
Podella ov Poda nu Lesuit som ov den forste som nflnr Arch: for kjent nu Pau
na uanskjellig den sig ellnen til Insecterne Archial. Navne far fan tagnt
nun giordt tilligr nogle uyr som ikke nu det.

5o Robertella ov Robert nu Walaan som ogsaa giendt Skriftnyr for alfal
gr tabellerne skjelle dels og for at gryde den selv for og dets til coegler
Insecter fora og til accurateste hvorund de nun giordt grib fin Wskjenner.

6o Geoffrelli nflnr Geoffroi nu Swenske fra i fine Afhandling ovn Insecter
giort mange uyr kalte genera og synonyma for den compileret nflnr
Archialens Arbnjd.

7o Mouffetella ov Mouffet som forst kjennt ovn Insecter 1590. 92. dette
for Werlnt kan findn i Gesners og andrnt Sauder. hvorfor Aldrovandus

og Jonstonus og begynder hans Dannelse i Insecter figurerne med Deres Naturstykker.

8. Eisterella efter Eister, som gjorde ud nu 600 Insecter uden ikke nummererede tabellerne som de nye mulo figurerne med godt bekjeldt som et appendix til Goedart latinske Edition som som en enlegan ud. uden beskrevne Kort fiur Eicer-ciationer over Insecter.

9. Frischella om Frisch Rector ved nu Skolen i Berlin, den første som solid beskrev Insecter 13 Tom 4° figurerne passable.

10. Scopolella om Professor Scopoli som vegledes af gjem ud beskrivning over alle bekjendte Insecter som ud over Palens Skrivet uden fiden Schæffer ongjøder ad arbejde Insigt skrivende alle om sine og i anden Deel begge fin Dannelse i Insecterne for Dagen.

11. Albinella efter Albinus nu fuldfuldt som udgivet ogsaa nu Dens Insecter over og om Spindler med illum inerede figurer nu kjøbes bekjendt.

12. Leuvenhoxella efter Leuvenhoek som allerede for 100 aar siden og afbildet Insecta microscopica.

13. Vilsella efter Vilse nu Anglus som for udgivet et smuk Werk med illuminerede figurer over Insecter som begyndte udgivet at anvende auctorer om dens metamorphosis.

14. Lyonnetella efter Lyonnet som forfærdiget Dannet i sommer Dage som Reaumur og andre igenemme dend accuratesse og nøjagtige annotationer.

15. Bonetella efter Bonet som for grøndt over sommen Maanede som den forgaaede.

16. Jungiella efter Jungius nu ogsaa af ældre forfatt. udbredte med blotte adversarier og forøgne som det nogen fidst som den for navnt efter den eiden.

17. Schefferella om Schæffer som for grøndt pragtige figurer insectorum Ratisbonensium Efterladte nu et forte med meen Kobber og Mand og det som nu det Minia loquacitas ejus quod plenum commune velidem et germanicorum summum.

18. Redella efter Redi som for Dannet nu tractat de animalibus viventibus in corporis vivi og afbildet de Pediculi med Dunagni 12°.

19. Roesella efter Roesel som for fiden pragtige figurer den Baron, nu udkommende for Insect Kinuden.

20. Brunichella Brunniche begynder ud epistelskjøner om Insecter, som de ikke beskrev om complelationer. Jonts Skrivemaade nu godt.

21. Harrisella efter Harris Anglus, som udgivet et Werk in folio.

und nogle methamorph: insectorum.

22. Clerella Clerus maerler i Insecterne er Entomol.

23 Linnella kaldes for en Clerx

24. 25 Cyonymella og Padella opholder sig paa de Vraga Ærter hvorpaa de uagtsom de mænne sig nu Vel som hemmer sig oftes hvor de Ærter hvilke det og fræ udvi om Vælte ny mellomer om dette Insect om Dagen fløyer de Sød om Vælterne om de i nu Blomp.

26. 27. 28. Vestianella, Carsilella og pellionella ruinerer vorpklædnæjer og Vlædder ungrøn Tudvil paa forunge gjøer de fire vor en foi ny ovenud paa bygger Dette for at uden Lou figer at de for muffe omm hvis Troppen.

Reamur har nu ved overlig observation paa dem, i mulig som fiyl de dem paa brogede Vofl Tapeter, og forudt de Forvoynlse at vanskommelige gjorde de fra Lon om Vilden paa Tapetet lignende nu muffe, dogs den forder nelne fig, uru larven long nelne forandre ofte unnen og gunnen bli Vor nelsen, hvorfor de Form muffer ved op paa den nun Dem flyttede bilnu ugt Lid og fan de ofte vid vopla uoalle de repelere dette Vedbygde ofte ved Vblegt Form Varsel om Lidt om Julsen, ny bescert dem dem bort uend.

29. Strobinella opholder fig i Strobili Pini udoy den larv Arch: lagde nugong Strobili t. Orangerie for at faa Sø nun Ele forfuerd Strobili kommer i Vorunu gjøkker Vidlnun Kaffenz rudn og Frønun falder ud i og kom de ferum for uoungr Phalan: Strob. for dennes Ælyd ny Schneumon Strobili som lygger ind ved fig den for den larve nic, paa nu Schneumon ny Vedlu ud oplæsny den Phalanens de den immediate ny Dommen i den, uden den fan igjen nu ovdne Strech nu gonske liden. Schneumon som gjør det forderuerpaa Schneumon Strobili og det uend Grønbigheed at ikke alle larven opædes uun gjør og fal bort om den Granicum.

30 Lichenella kaldes en Lichen pariet: fæmina fer ingen Vinger. Under forvingen Lengner de forunung og Glynd Forutna uyd Fuga ny ovdvidt Grenzen hvorved Hun faaer Lighed at ligger frem og paa Vlisnuen.

N: Paa alle papilion: Larver observeres om de fer lineas fascias eller maculas.

IV Neuroptera

kaldes for forde: Neuron betyder Nervus quia alasunt quasi ner-

vosa. Hymen betyder membran hinc Hymenoptera, Neuroptera for 4 Vingers mere end Stiel paa nur den sexus for at instrumentet som nu Dyrene. Ved dette bliver de fundne angioptera mere som aryias fundne vena og tillige capsula.

Genus I

Libellula for alas pellucidas mange Kjaeler paa begge Sidernes Larverne fanns ikke som Crocodiller og andre Insecter og smaa Fisk og mere Enggny mange om dem i det Slot ade de fisk omkrop. Skarpe Fisk at blanke Kopper og store bunde Skuldrene for Bitterne dem nu Fugen og Fisken sig paa Skrovene de nu de 3 Kouliger, disse er Fogne for Insecterne i fer for Skiner, de ade og bide dem under sine Fødne Fødne Fødne. Skarpe mere Kuller og Mandi nur for nu paa Vig for og 2 a 3 disse licelluler under 2 nu Vegal med Skor at opkuldes Libellula; ikke de Kjøn giver Skrommer forade de op ulik Vig og Skiner i Kommunet. Naar de paarne forglykes Kommerne og Fagner Fumnu med sin 2 Kommer Skinne Fugen og Kjønnes forelskes paa det Sin nu maar Kjøn Kuldra sig bagner Kun sin Dunyl til Kommunes Dyrt de forne genitalia kun, og Kjøn ligesom de worth kommunes ullnek. Naar de paa Skeal nes og mere giver Kun Skiner at ade, og ouch nun mer end forrenden fra ade de forrenden de nu paa 2dr Slags 1s Dun som for alas horizontales ligsom Pk: geometra naar de falder og 2s Dun som for alas erectas som Papilion. de fleste nu maan variere mange at til Farven og Kuldes i 2dr Species Virgines et puellae de forer opholder sig med Fødder de fremmen med Kuldes Kilder. Naar de Kouer Kun ovi Naarne for Kommer Lappe til Skrommen Libellula nu til fore blevne kalet libellae mere end Skal Kjøn nu Vogelforal fra for mere forrenden Skrypent. Indtil de fra Lorde de balancere i Luften som nu Vogelforal.

Genus II

Ephemera boden Vangnyen altid mindre ringne Kjaeler og nestne ringne Vand Neuroptera for at mere de lig ide Lemmata dem for Kun 2. Vogelen nu Vog under 6 Kjønne, gunu i dens Vand lynne Dens larver de Leigenen i Vnestne nden Dannel. Dens larver for mange appendices paa Siden

saugnuk, uoraf Puppen for foran Vinger og Klokke, og klæder sig op af
Huden i den Lystre und i det Lufthul og fostre sig nu der i fire
Uger og vogne. Det er den Sommer Dræbningen kalder for ofte, og er gjøre
Almindelig forgjengelighed i und nu Ephemera sine Eggen sin Egen
Hvilken blive larver til Vorne.
Dette ville 2 eller 3 Uger forøge i Vandet sin alle Øjne ogsa
gaa om nu Dyr. Dette er fig und Vinger op.

Genus III

Phryganea for ingen Tænder og Fæller, uogse Antenner for nye Ø, og 3
Korte for radiantia setarum, fode nu Korte, fuoraf er Øjne de flyde
om Øjnene und Kloerne 5 eller 6 Øjne op og ned. Dvalerne ere den gange
de for alas inferiores plicatas. Ennu i Kiær uaar de nye larver grøn
cylinder om Dyr om sig Differente phryg: af gjøre sine Huse
Differente materier, uoraf yogne vil ind Kaste sine Fø allen grønt
der drager de sig ind om Ø. De bor uanlnu sine gangen Tænder
Minius kalne om Dem og Kalder dem Phryganea. De gjøre sig fuldig
i om Øjnene Øjne de i Sanke regimenter i Luftne, de sine
uan fuoraf nu nauflbige ved Fælle for Phalæner uanu de Dinuk
paa palpi sine Phalænerne ikke for, uaar de nu blive flyvende de
de ingen Ting Øger for 2de Gut i Vaarelsne, og Hvilken nuhnl vilde
Forny grønt Dem til nt uyt genus og kalde dem Perle.
Alle Phryganea bør examineres ennuu de de nu und nu ros om
grønne sine gaane bort und Dette.

Genus IV

Hemerobius for 2 Tænder Ennu i Vuoraf den ny larve de har ingen stem-
mata i Tænder, for ny alas plicatas som Phryganea Dem Deflexa
Ennu langer.
Den Hemerobii nu uøger uanu Myrmeleontes bugter Hemerobii
Engen sine og ind Dem for at uuuger for bekrænset dem for
Clathrus nu Crisplogamisk.

Species

1e et 2e Perla og Chysops ginde sine det bedre Guld. Naar uoraf dem
i et Glas for Fuuger de dem og som nu bigsine gaa nu lang Dvar gaa
Glasset for at Eggel Jeuge Perla ligtne ikke.

Genus V

Myrmeleon for 2de Kiæber og antennas clavatas som ny Tænder for

i denne Ordo. Er slegt med Phryganea. De Larver kaldes
Formica Leo (de Dage lever ikke over Arch. long ned i Paris
Sand den til Stockholm og til Fahlun og nordlig til Upsala og
hvorfor finder Grønlandsvorm Derham for Kvinde ungen, den forvand
lader den nu Larve som nu Scorpion for med Vinden de Kvalme
som derav ved Skille ligen Lucanus og de den grønne Doggeorm
Englands som Krabben Solder fige Vand Snor den grønne figen Doggeorm
Den om og at Vandet Solder ind og der nu Krabben og Krebsgrøb
Den grøn den Felt den Snor Mistrøver falder Solder fig, naar Mistrøver
ikke Fanden og Vandet gaar over den og den fra falder de ind i, da den Krap
bringer den og Ender den op. Arch: Jeg fandt mange om den paa Gotland
og fat i nu ovenfor Grøb da den fore bar de i Grøbene Krap eller
den ovenfor op.

Species

1. Libelluloides er den Flyver

Genus VI

Panorpa har rostrum cylindricum corneum som Cicadionis Skelne
fra ovenfor Hvorved at den har nu Klon i Skinnene som nu Scorpion
uden Lucc mas.

Species

1. Ova Solder fig i Vand til Hvilke Sanger og Turquiet nu har 2 alas
posticis lineatibus longitudinis er Tomaren fra Hippocratis Lund.

Genus VII

Raphidia har Sønnehorn den Thorax flad, 2de maxiller og den
lang Ovarium i Skinnene paa Samina

Species

1. Cornuta fra Nordre America er lig ovenfor Raphidia er ungen
Tænder og Vingerne ungen Flyver ved abdomen.

V Hymenoptera

Forvandlet Dagg i Skinnene med Vinkler den Stikker og Lugger fier fig.
den har fugeby Aceef formige Vinger og paa Ovan Vingerne 6.
Cargo lateralis findes den Kunden.

Genus I

Cynips er Humler har nu Ledne Ovarium i Skinnene paa den ene Vinkel
den paa apes Lund Kunden Stikker den i Sten og Træer og lag-
ger den fiur fig.

Species

10 Rosæ paa alle Rosner vokser galle som nu kommer af Insecten Rosæ Pedeguar, og ser saaledes ud som en Kolbe eller Dunkorn om den Drøvfig, er den krøm naar den galle begynder under Qvistkjernen i Kjødet, 3 Houdgange ofte en hvidagtig paa Grænsen af den Kraft er gjøre forning paa et Insect af Foregaaende Sommer inge und Kraft og Vergens, naar den flyder i Flytten fant mere end Under Begge udtykkelse Substance som forrandet fangat med en Slag, Det ikke Slag er brugt und forlanomme de forblaar og Guld farvede nu om nu fundt andet genus umulig Schneumoneder nu Cynips Fæmde.

20 Glechoma paa Glechoma vokser ofte en hvidagtig galle bor udtalte

30 Quercus mange Sorter Cynips og folder fig paa quercus galle differer og til Skarbugerne uden Ordinaire som Kobber til Blæk for ofte fal paa fig i apoteques for der finder de ofte udtørrer og det Bøgdikken fig egne Cynoron und galle og der finder Skal i der skal det bortet det til finder Spindel Ekre de blinder der det kommer Dyrebunner, om Slur Sackrig Ennis nyforst Substance den blinder fal la roc de fun finder nu fundt Sæ om fig som ligner Spindelæg og sidst blinder den flyvnedt. Det hvor Egna Svamp gjøre hule Skorne blinder Galleblæk forædt, uden fossilt hvor Lund Lacker ancon Blæk Skrue

40 Henes er den som ligger fig i vore ordinaire Figne

50 Sycomori er den som om de store Figne i Æbler de Sycomori for Hasel-nød Nikkel Arcuaten og om det vare Fignen fore fraalnedød Blufforan paa hvile Foran om Stamina oppe og pustelle under og paa nogle om Stamina under og Pistiller oppe uden paa hvile Foran det gjøre Ends, idem unge er de apart fra at bore Stamina i den nen og Pistiller i den anden. Insar nu de Kobbe Korbiangonne paa, naar nu de Sycemori kjøber ned og kommer til Follen Brøm de hvile unnlige authoar de kommer udfny de udsom Skollnen fidrugaar Sitde under Fignen og Lorgan paa Pistillerne og vøst om fig Dotn og paa Ends blinder facundation.

Genus 11

Tenthredo vor fil for under formur genus som Ichneumon uen som de far different metamorphosis paa nu de blinder udfilde

Fem Tenthredo har hunnen en aculeus i Bagkroppen som er en krogneb
hvorav Bladene sprøjtes ud hunnen skiller sin æg paa Bladenes og under
Bladene ved Bladene ligger hvi frem af. Larven ligner Phaleænernes
larver uden skuldre og ellers slanke og Bold der for og Phalæn. 16 under ofte
det fæstes de op Bladene og holder sig paa Kanten af Bladet. Naar
man vænner Tenthredinerne larven drager den spiralt ud af antennæ
paa nudet clavata og paa andre filiformes differerer heri fra Vespa
at den ny har 2 unge neden skalle ved

Species

1° Pini hunnen har antennas pectinatus
2° Scrophulariæ larverne hvide med sorte punkter
3° Intercus paa arcium, Lappe blad krøller mellem begge epidermis
foliorum.

Genus III

Sirex ringe 2 ugticuli paa antennæ abdomen mucronatum,
skiller ikke hvad alimenti er hvor har en aculeus under abdomen som
er hvid i 3 dele de paa siden er concave men siden lil concave flanke
economi er ikke bekendt endnu

Species

1° Gigas almindelig i Sverige, ligger frem af paa Bladene af flere slags
Dikten hos Lapmarken af Maupertus lil Reaumur.
2° Spectrum en kæring i Øjenbolen vanden mere hunnen Skal var hvor
paa ligsom af bider, men under at vogne Øjenlæg gjorde det
en Skal gaaende frem paa men foran ringe kæg dele hun nudum uden
beskyttelse af en Ærv, men de fem long med stanne forudfem 3 Bensglem
var fulde af fuller ogsaa ude fulde af Øjne af hvilke nogle flekkede
Arthaten som udkaldte dem og hvor blev de Spectra som de var forant
til stanne. Naar de er larver ede de sig i Ærenner for at det blivner
stænt.

Genus IV

Ichneumon har aculeus effusus og serratus og anuegaaende Bind,
gaar de flyde har de fem antenne i en spiral, abdomen er pedunculatus
ligt over paa en pedunculus hunnen har long og gram
Kæmpe, ligger æg i andre larver. Arch: for
en af disse gaar fremme og tilbage paa en Salix, kimdt med fem
antenner og nedhælig skulder lid, de Arch.-for er ofte hvor hun en
larve i tilfælde. De forfer Entomologi for at naar en larve tilen

Papilion skal udklækkes komme ofte i den dend nu Ichneumon der er unnat
skulde bestyrke generationis æquivoca umuligheden nemlig Lister beviser at
Ichneumon skal larven just under sin formandling og ingen ent fe komme
udklækkes den nu lidet stykke som siden formandlingen og komme ud. Efter
sinn nemlig Ichneumonflyver omkring storm Spinden Cocunerne selvsamme
men og udsuger til Spinden en bestemte sig derpaa ungerne ilde gaar den
ind Hvar og ingen sig ved sin, hvorpaa flyver udklækkes og udsuger sig
den sode Spinden ene. Intet ikke fundne ved sin skal larven og skal
larven (der under dens formandling fæstner sig med megen Ære og dager
Cocuner sig) naar de skal formandles snor de 8 skillen saar omkring
og paa saa ofte skal skiper, blindt, saa de flyver ud og sidder dem fig i
Cocuner. finder ingen med sin fig larver nemlig Maghvar blive nesten
tomlig, idem med det at de skal formandles paa den udsiden ud de skal
ud larven, blive i den Pupe og dør i den udlidsa med sin skinn sind
ud nu larv og blive Pupe og kalder de per analogiam glandularum
conglomeratorum, Ichneumones conglomeratæ. En anden sort som
kalder conglobatæ lader sig paa Græsiorten nedenfor ligger sig paa aphides
er de blive store og sruer og glatte. et klekker ud Ichneumon nemlig
kalder i den forskjelle klinger om antennæ hvis termination gaar
ud paa jus 2o de forskjelle antennæ formum termination 3o de forsy
de fascie om antennæ hvis termination blizzer lor 4o de forskjelle anten-
as setaceas nigras formum termination 5o de forskjelle gulle anten setac
hvis termination er paa us vidst minutinum differente abdomen er
en dens fessible.

Species

Psorius ligger frier fig in larva Phalænæ Psorum.

Genus 1

Sphex 10 articuli paa antenna, for brod hvorunder den skillner som Vespa,
under Vingen ingen kollende som en Ænger hvorunder den skilles fra
spa et apis. En lunder sort labium argentatum.

Species

Sabulosa Rajus kalder den musca quadripennis som observerede
som sporsk og botaniserede ofte den hvorunder grænser op bunden
den nu Pulej og gaarde nu sidder fiden flöj den bord og den ig ned sidden
med den Phalænæ larv (det ofte som nej dør fidet ikke ofte
ikke den, nemlig Dennen naar som nagering ligger under hagne

for dette dyr) og forude mangt et grøn da den kom til fulde gik den forst
midog foran ofte om alt var mørt, fiskn lagde dn larven og lagde fiur
fig i fimer, bedækkede den fiskn med sand, og fors ofte nu grøn bid og fedt
ikke til Øjnene den som Arch: og for observeres.

2° Appendigesler fand bedre Øjeen end Coarnen para Bogfødningerne storre.

Genus VI

Chrysis dens bug er skinnende blod og ufulde concav under bon i Øjnene
og Vingerne bøjer sig for og gaar i sinnet sig nu dog alle ganske poleredeog skinnende
i Mundene ligger nu cylinder, og inden om den er Tænderne snorundskue
dragne til sig Fødne.

Genus VII

Vespa og apis skilles nøj nemt ovenfra ud af Vespa for uden Vingerne
sammenfoldede, for ny Tænder som apes Vespa parem fig kun om Øjnene
ligger fiskn omme Mundene om Øjeenne nye de fright sammenbygge og bygge
og bor, nemlig de gemme dør. De formere sig bor om Bork huse Træer og Grønne
Kloeces, formere Klodsmede Fugger Sicile med flenner strala.

Species

1° Crabo ne corzles Crabones fignes mere om den som mangent forfaer ansig,
Det er nøj ikke gat at ligger med disse crabones, om Maden er solden de fig i Øjeen
Brennesikke for farlig for at gaa ne Kom Krabe ne Kød ikke ulykkelig for
sammen om Hjugnet noor vord Lemm strag liggende paa, De gøre de øjne stog
norfer for de Kubner, de ede Lime og født dem bort fongogne forner de
Dør, Vespa lagner sammen ud om de Kubne.

2° Vulgaris opholder fig i Huser eller op Træer flader de Kubner.

3° Muraria bygger fit bor om Lerer i Vaagner om Mulner nøj flere
end et Jordeble og observeres nøj ofte fit dem ud fone ne Kalk Klumper
ud fra egenmuneuner under de crabeges fiuder der Øer de Øjne, derpil
de Vingerne fal lem til de de kan ødelægge.

Genus VIII

Apes Sammen kalder Vesper ne ungen om Vandbier sammenser, som
for Chusorg for Vingerne fogen ofte om fodning etc: Sammen selver fig para
Dronningen fuer ikke ved, men sammen Dønn flag. De lemmer alle i societet, de
er mares, feminæ og neutra.

Neutræ s. castratæ giør Hunde end hem ofte sammen og folger Dronningen
ikke bigfom Drabantner de fordi Fuger. De Gamle sagde at Vesen var
konger men sen ne Drone ikke Engner ofte Reaumurs observation
vood fig om Drone. Dine flerner om langst ½ Viel noor den former

ret Forening, de som ikke vare det Kal blive ledige, uden holde fig
Stadwaine for at dequet ny attraperer dem. Disse altid uegnede Bigl
ved Bestuvdingen at ny uegnet vespa kommer ind. Naar de ny er for
uvegne Biber de ud de overflødige, den fore for Dirkuber bor ny for Gravg
lere, eller molecilla bor og Fyldes bort Dvorlen grov og store Blade para Bygn.
Phalana melonella yorans og ind for at lage forening ny fellen lavalne bygger
at Lodder Lagne under, den forening lage de hobar komme ny forandrings
gne blive brun uden der fror Rosmarin vogne blive bofor forandrings
Arbutus blive forandrings gefleg, de lagne ny para ne Dagen flenne blomster
fin forening uden para ne Dag om ne og forenur blomster, Dinofor? de Tilbage
i den nur for de Tilbaden i den ogden forandrings som de fidne Dyr ud. Pollen
lagne de om blomsterne og fald para Lavarne dvor grov de Dog.

Species

1o. Mellifica Svamerdapi, Reaumur har observeret om denne Bie de
om fiur 10 Ennder para antennæ mares 600, neutra 1000 ifølge Reaumur
calcul. Naar Drøningen uden mares bøjne sin antennæ ud for at
dequ til Venlighed, naar de Kal svømme hørne mere de gemte viser
nogle Øjenne forud bigsom, vocabr ej, ej, ej, da de Dvergs Kvegsna
sna, sna, aranea calycina Kaldes Dim for at sin Eggene i Blommenmen
nen og det at naar Dinen vil fug om den nappe sin i og forlarne den
total, Erica giver brun forening absinthium bnf lapis lerreslis og
Kruncoru giver forening
2o. Florhomnus fedder para geranium og fonne
3o. Lapidaria giver den under forening

Genus IX

Formica formen og Dimen for Dingne uden Neutra ikke, de lyn i
Compagnie, disse altid fier ind i Bestyrnt under para det Bolmen naar
Dillen den, Insom kan man let faa den ba en man bigger ne Stæftig
det med Bestyrnstallen i Dyggen og fidin Kastne om Dikie de fremgang
faar Arbejde at slab bort fiur fly i Dyggen til de de komme i Orkering
igjen. Det forefigns at Bestyrnen Dedne ne fald, de far ne de den aculeus
inden om abdomen, som ne fil fremund de Dilder gjennem fuldne
Dem man vil indtil den fra Kenne det bnf men det Dvorn fiur Kraft
trækket ellen det fremund Bolzen ne ofl vælket Dugen Dvor de. I Holland
at Kriede om Dranur for at afholde Bestyrnur fra Dranl, de de ny gravne
den, men naar det engang gravne Dervdne bort. Bestyrnens Dgne Dyggen
den ny engen gradus ikuellen dens puper og larve, ikke de lygn Dudkendne
om ne blare.

Species

1. Sterculanea fast Træer gaar solitairt stille og uanseelige ud af Jorden

2. Rulla gior conifer acervor af Bar 10 para Inlinguet uaaneende ovenpaa det af Frugtens Kiøb Inggnb para Øyen Dette Træe er det en Kulparens Frugt Sumenser sig, som i en Æske Træer kan naae 100 Øyne Indringsmaaner som ovenfor nu 600 er overlegt nu neutra. Denne maa lidt i en Æske Træ paa Snes der ligesom nu Frugt Øyne som ellers nu Orne lik sommer dimension som den Kan naae ude den Skinne Kaaringen formt alle Kyllings Ceremonier 8 Dage ellers Inggnes de fg de. De fiøne Dreiens ad af neutra. 2 formicarum er aphrodisiacus og summe nervinus. Bøuhnerne lage vi ac Sworuns de øger Kaa nnen. Dette vi ac findes i Æther Æner er rundt ligesom igeniennebornd Skorl som en muscat findes kun i det Æther Æner Snor Fier er i Skarvernes Sen

3. Cæspitum som formere Øyne i Æiflnen. Jo Sverige er Øorlne Træer i Indien og America flennen ere op alle Skor uanen lage ny. De ude en lage, de ere og Øyne Orunn uoar de Kinder Sen

4. Cephalodes Merian som i sin Surinamensia ligesom Sloane kaln uangt om Snuer de anden Bidner den Kæfter de Øne i Øienene og fog Øiene fingat de ynkke und lil Jorden gaaen ende op i nesten Ere forlorne. Inn Øiene gaat de fuer ud som et Anns Sengende ciuellen Ere uaaer og para det En uaaer den Snes marchere Æther uaaer Ere et Ere i det anden. Det Øiens Æther i America gior nugang om Skaanet et log de de uangt Kommer i Sæiflnen uaaer ydere. Det Øiensliges ude uogle Dage uoar de nye Øyne Øyne flytter Æiniuenflnen und igen. Øiegler Æther undergaaer fra Jordnen et Æiniuenflnen ofte ufor modentlig Jordes Dette Ligeil Jordens de bor fra Jaar Kiøb fig op ellers bogens de. Dnden Øyne det und Skam Ere Øyne Gangen er nu Jor Øyenende malerize som ende ude er giort ligesom nu Ere Øyne dnen ude paa det margra og Dso Jalne Øyne

5. Saccarivora eller uangt Øiflnen Kommer

6. Bontes Indsnder ligi Indien, den nun er para Epidendri bulbus som er parasiticus og Kaar som nu Træn, uan uoar Æther Kommer Kaa Øyne Øie ude Øiensl lil pu Kaa Øyne Øiøgnes. Den ende Bontes opholder fig paa Jen mandia el ere fuiflesta Øyen Snes Kiøb Kaa Jaa oldnes ligesom nu Øiesl Kuna nu Kolni fra er Sprøt. Mojen bod Clifford 100 Øyne Kaa Ere uaaer blanne fora opadnt inden i er Æther nu Øiøndnger er Øyne for Jorl blinn opadny er Æther ny Kor fugger Ere nt ou. Æther opadn Æiflnenne er Ere nner.

Genus X

Mutilla Maaunt gienne Kiøkinnen eller para uogne Æiflnen er Øyngent

kalles nu pubescentes ogsaa. Deres oeconomi veed man ikke. Paa Europæa har man fundet 4 Vinger, nu har Archiater selv funden og nu har Schreber stillet dem.

Species

1º Occidentalis Rød og sort Liv, 2 sorte oceller ved begge Enden. Catesby har aftegnet den. Linnæus [illegible] ny Sort med 4 Vinger.

VI Diptera

har 2de Vinger, har halteres under Vingerne. Dentes kaldes de 2de spidsige Tagger ved Munden som sidde med deres Spidser og ere convergerede. For at skille dem ad tegner man først dem som har egne Mund, [illegible] at æde, sid fører.

Genus 1

Oestrus et gammelt Ord som betyder stimulus har egen Mund.

Species

1º Bovis lægger sine Æg paa [illegible] Ryg har [illegible] paa Vingerne, [illegible] ny [illegible] og ere de bange for dem og springe som de vare rasende som snart de kommer [illegible] i Veiret naar de [illegible] for dem, thi den [illegible] sig ud paa [illegible] Ryggen kommer nu [illegible] og som brune Kuglerne det ligner [illegible] for dem. Medio æstatis bliver Kuglerne større brydt op med Hul fra Hornet som nu sidt Larven falder ud paa Marken kommer i nogen Dage og bliver Fluer. Om man selv vil [illegible] ud den bør den lægge [illegible] til [illegible] ud paa [illegible] lægge blant Dyr [illegible] paa [illegible] som [illegible] de ud om Vaaren.

2º Tarandi [illegible] paa Lappl. de lægger sine Æg paa Annnyrene, derfore maae Lapperne altid flytte [illegible] til Fjeldene med Annnyrene [illegible] blæsen. Annum vil altid mod Vinden [illegible] at følge dem [illegible] Lapperne og [illegible] vil [illegible] dem med Vinden, [illegible] mod Vinden [illegible] som de vare rasende og gaae paa de [illegible] [illegible] [illegible] ligger, det kan [illegible] ikke kommer der [illegible] [illegible] de [illegible] Annnyrene [illegible] fra [illegible] [illegible] og [illegible]. Anne Kalven kan nu [illegible] paa [illegible] Kuglen thi [illegible] [illegible] paa 3die [illegible]

3º Nasalis er den som [illegible] i Næsen paa [illegible] [illegible] og vil [illegible] den ud [illegible] ud i sina frontis og lægger der sine [illegible] naar de ere larver kryber de i Svælget. I Novemb. og Decemb. [illegible] til [illegible] der som lægger ud larverne om [illegible], [illegible] paa [illegible] kryber de i Munden og fæster sig derpaa [illegible] i May [illegible] de ud [illegible]

Larverne og formodes til nu skjul nemlig om nogen skulde blive igjen i Jordens
boring da gjennem og Insekten crever da ny bestandt af Ture Insekten
med deres Egne blant med former.

4o Hæmorrhoidalis gaar gjennem Sorg fuldt indsnitten, da den kom-
mer paa anus begynder det at kile da de maar snitten er aabnet og det
Eneste og Eggner sikker eg. Kalder paa forskjellige den med fit criterende gibt Eggen
hæmorhoides iacæ.

5o Ovis eller dens Larverne mangler Hoeden i sine pronis fun de criterer ner-
verne om hvilken Larverne ny blevne Eggen galer gaar fiden under Skallen
og drab den. Reaumur har beskrevet den.

Genus II

Tipula Proboscis er bøjet for ind skjul den Eggen knæk Kroppen med
dens palpi hvilke ner ved den clavata roter den hende. De som ny kile, ner
Eggr Vingerne, men Vingen har rostrum som nu Skal men det ny. Naar
Tipula den larver Eggner de under Tørr Aarbrer eller dem og, paa Dekgenter
Hendy eller de op Gres Aarbrer hvor Krogenne de plukker dem op for nogler
dags Dagen faldes 6 Fødner paa hver Krogen hvor det at udvokse dem; ihi
de mennesker at de pluckede Græsset om Eggner men det giver de ikke gaden
de pluckes op de løse Gres som larverne har eidt Aarbrer om. En saa
Langer Dette giver stor Skade i Jorden hvor de eder op Aarbrer paa Steder
som om plaukes.

Species

1o: Nucens lyser med Bidner om abdomen. Nogler Skjul her paa Bidnerne saa
filamenter abdominis som nu gjennemsigtige kronbigt ny at drog lyse. Naar
man kommer til Bidnerne hvor dem opsolen fig lyser den som nu ignis lamens.

2o Chamæleon larven findes paa ud

3o Hydroleon antennas clavatas Kalder om Geoffroy Stratiomus Eggen som
nyt genus.

4o Scolopacea Eggner sin eg i Sandingen Krog og gaar Insektommen fornetter
den ud med sin udprøvende Snauts paa at Insekterne blive Sugnedbigt som
forstrøelnde og fouer larven de Lyslighed at Sanger Dem som Fanger med det
at som flenger fig ouckrug Dem.

5o Vermileo optaaet Reaumur fikkede larven Inmuki i nu Ok til Prøv-
ningen som gaar den til De Geer der Kaldede den ud som Reaumur fely
ny Dæck presteere er lig scolopacea.

6. Pendula i Langer fibler scorneck Sandsens understiden larver som
Sanger paa nu Lang Eroar, med nu Klung i fuden som er lodden



eller Krøyrig, øverst paa Kroanen er ligsom en Pibe hvorunder den holder sig oppe
Bondet men den selve sigund naar den formeren Engang, enten pedunculus den
den forlorter ved det at den formeren Ulder, den in formam spiræ og forlanger
den igaen, forat den der ved kommer at avancere gemeinen planen regioner
at Bondet. Dette ligger i Klumpen og Cauda i den longer pedunculus.

7o Pyrastri er meiendelig den hvor aphides er i Overflødighed paa Kirsebærer,
enten Larven sner ud fra en Buurbl er bunden under, larven den er dreg
sig fra Bladet og er ellenfor 2 linier lang men strekker sig ud til en Stegers
Engde og ligger op mod det former at det den aphides fra sin krøller paa sammen
kraver den ny fallen er forlæn ikke naar forvandler sig.

8o Senæ holder sig i ungt Bond e: g: naar Sagbinden holder et Karved
Bordet snor de ligger ved Papir som Skarn i Zenten ellen der det staar den
nu Lid paa er det Kult med Mosen, naar en Lappen ligger under Pinden
paa Kommer altid nogle Mosser mellem den Ind og ligger den nu 8 Dage,
de Krinden tagers op enten de med paa at det er under ligt forlades de den Ener

9o Menthastri i mentha Blommer og Aper behøftelig

10. Larvarum ligger eg paa larvæ Lepidopterorum ikke som Schneumones
og naar larverne fødes og vandrer kommer den Klumpe ogsaa ind om
Pupen og ligger heden ud.

11o Putris i Dyngkolker søger op den putrescense Vandet som ellers Kulde avolere
og de Ord er den former som findes i Øl.

12. Frit lidig, Dyngen gød jeg 10000 Ducaters Blade i Sverige skiemmer mere
Korget paa jorden mere end Blomst med Ellend.

13o Petronella Kolder paa Jorden den gaaer paa 4 som Petrus

14o Umbranum Klæder om Kommeren ligger som der gaaer under Kraver.

15o Domestica De geer fremd larver for de i Dyngkolker i Caplgrid hvor de ikke
kan sætter for de ingen Kuner. De geer fremd larver ved den Engelsk de som
lang Fest Dyger for det Kladen ud Kuen eg ellers Egyptisk manier de Kommer
ellers nogle Dage eller Kult med Skiter hvorpaa den under søyder og fremd dens
larver.

16. Pellucens mere der forsøger om den ny Kommer i Mørket.

17. Vomitoria 4 ons den ned i Bond at bygge ny Fest ligger forsuger som ne
Lom Lipen ligger der fra ungefer 10000 eg, som finder Blom til larver
indre nogle Timer for at finder Grodfolet er Kult derom Kvilk finder
forvandles til Kuner og ligger i Cuplen og de Kommer over Skeletet igaen.

18o Ungulata Kolder sig paa Bogens Springer der som de under paa Mosen
Kar paa Klomer ligger som Klomer.

19° Radicum folder sig i Roed da der bliver ligesom Kugler paa Rödderne
og bliver ofte nogle fundne paa Roerne de mange, man bytter om Roe Landet.
20. meteorica er snart hvor som man seer saa mange om Aftenen at svære
naar man vider de komme om den Skoven sig gaaer ud om Aftenen de følge
Hesten mange Miil.
21. Vibrans bevæger continuerlig Vingerne naar den sidder sig.
22. Arnicæ nyder Fruentimmeren med hindre deres Larver der
23. Solstitialis seer ved Solstitium æstivum og 8te Dager derefter men
Insekten for øller sidder
24. Cerasi ligger ude i Kirsebær Stenene

Genus IV

Tabanus Proboscis med 2de skarpe lameller sorgende i Kaaben den sorer Tænder
med Tungen som de legger til sammen og Skaar paa Tungen. De har en
Elephant Snabel under Tænderne de stikke med dem og ikke at naar der
skal komme Regn stikke de selv, men det er kuns Hunnerne som stikke,
de stikke Heste og andre Dyr. Vedort skille species seer efter Øjnene.
Ingenmand veed hvor Tabani formerer, De Geer fandt dem under Græs Rödderne
og de kommer op.

Species

1° Caecutiens kan gribes med Hænderne naar man vil.
2° Tarandinus paa Renene. Naar Sommer paa Renerne snart har
vore ud om de sidder paa, Tabanus stikker i deres de Renne-
Larver bliver mange Sifflorinea og ulige Sammenfarende hvor hun stikker sammen
aldrig Renerne kommer flöiendt den naar i Udspring uden sending bort.
3° Rusticus er lys graa som Böndernes Klæder.
4° Bovinus stikker Köerne naar det skal blive Regn.

Genus V

Culex Kjendes af deres rostrum setaceum hvormed de stikke, legger sine Egg
om Aftenen paa det, nu nogle komme om Sommeren, naar det har regnet
varmt Sommer. De holde sig i varme Stillestaaende Vand og ysere For-
raadnelse. Arch: Linné tog et Glas fuldt med Vand hvori Kilusperne var
og tog et andet Glas og silede Kilusperne fra og det stod nogle Dager
tillukket det insamt, men i det første Kilusperne var blevet snart Klare de
ere Uomgiengelige for Laggerne. Larverne har i Enden en Pust hvor
hun udbænder den holder hun sig oppe derunder men naar hun lægger
den sammen sænker hun ned, naar hun bliver Puppe svømmer hun
staendigt paa og har en figur som 9 de 2 opstaaende tubi holder hun oppe

dennem Papeferiller nudlige findes de trekjønne flyver ud. Dennes filler
allenes (Rostrum) hos os gjør de ungene ching uden i Indien, China og
Egypten der dens Skikkelige og willinger og vaere nudan Bir skildes for
uden Exempel para at de far forant Frøer og det. Tuberne gan Puppe sofa
beskuddelig og admirerer Plinius dem. Jeden om luken ligger en brand
forte nud rostrum para at naar den skal skille naar den gjør et hue gan
rostrum. I Laplandiden de sig i Kuefjeld for dens Skyld.

Species

1o Equinus for det fredi Jeuden skiller Hesten for at blodet gaaer ud.

Genus V

Empis for nu lang fin indbøjet Snabel (Os) langsen med thorax
ne efterlus og skulde i lu dens Sammenkling ne ubekendt for som Dinger
uor kroppen flyer sammen om Vesteren

Species

1o Pennipes gandske liden Fodderne nem penneli

Genus VII

Conops for nu Snabel som stoaren utform (Coo) methamorphosis ubekendt

Species

1o Calcitrans uden Hesten og Kornen om Skulderne holder de sig paa Kornen.
Dny forpurfsagner at Hesten skulde vaere Sidsen
2o Irritans selder sig paa Ansigtet, Øyenen Kjøbenen de ellid naar pesse med Smerte
sen og forabrede sagn rotiorenlus Skorde de nyomdet nuderom.
3o Rubiolcoptata ne lil Dingenter nosten hemiptera

Genus VIII

Asilus for rostrum obtusum (Coo) kort ny skikke dette de den gan mandibulenom
den ondu, rostrum ne kort uden ny skarpe. Vingen skuglen langer de skuaz
ogenden korne fin Snabel ogne nedenen den og Ende den ny den gan fra den
Classe som ne Kombe, Øyenen kaunds lad fra forenen med fin fejr Dinger
methamorphosis ubekendt.

Genus IX

Bombylius for nu rostrum som stoaper utstrenen ud og valvulis ogrunden om
den ne aculeus setaceus, uden ikke som gan Empis ellaer bøjende snellen
som asilus ned ud uden undskendt alle ny lodder som fjeuler ganger,
foruden ar Klomsnuen para fanner Dekaab som Trochilus og de ikke fedt
fig para Blomsnuer ugen flyer para forbal uden ny langen Vin-
gener fedt allenes fin langt Snabel ud i Blomsnuer. Dennes
Kornendlingner ubekendt. De far øven maxiller long.

Genus X

Hippobosca har kroppen tilsammen og ligesom den uregelmæssig stibet den er skjøn
for at de kaldes pediculi volitantes. Insekt nu oblus Guardt som er lang,
noget over 4 gange 6 klør paa hvilke holder den sig ungefer fast. Den leg-
ger ikke som en ligefor flyt som Stiderne men der skjøn ud. Mange
som skjøn hvorfor den og bog lægger dyr som unger en menes exempel
for at de sur parrer sig ikke hvorfor man afhaver.

Species

1. Ovina har ingen Vinger og den blanke farven Vreden undertiden for
uden at den er kom overtrukket.

VII Aptera

Skilles generell i den som har 6. 8 ben 14 fødder ikke og flere.

Genus I

Lepisma har 6 pedes cursorios, med palpi er bestyndelig alt er capitati
og 2 setaceis. Linnæus lad os seer Skal paa Krogen Slange fra Øjnene
som er divergentes som paa Ephemera. Alle Dyr som Sølv, lobersfiske
mere end udlænder.

Species

1. Saccharina i Vestindien fuld med Sukker, fuld af Kladerbiggen og
meager den.

Genus II

Podura er meaar Ernaturer de hopper som Loppe, hopper ikke med bag
benene men ved en Gaffel i Halen som er bøjet under sig og er
meget vel lagt den hopper de langt langer end en Lopper, springer de kraft
de flere og holder sig paa Vinter.

Species

1. Nivalis springer paa Sunnen er sort, de holder sig helst i Sødsper og Vinter
Sne, men er meer mere Commen til den hoppe de alle bord. Insinuerer med
Skel Vejr i Skoven og ved Kul Vinter, man bør se paa den Commen-
dable Dyr.

2. Aquatica er mærkelig der ved at som Vinterguen fandt de sig
meager 1000 gaar conferim den jem Cruer fontan var en Lower
bord, over Skiller Skorpende. Da den nu Vinden lil den under. Da dette
forener opfiger alle Svid som findes om Vismuligheed ovenpaa.

Genus III

Termes er meaar og brunlige, har longe antenner.

Species

1. Fatale findes i Amsterdam, kommer fra Ostindien Arch: for nogeng
Amsterdam en Lad Kiser paa Svillen Bogstaver var udskaarne,

i sommer den var ligt var den egnede til at dræbe, at drikke varme ned den
holdt den i forder, men begyndelsen var at den ny sorder gemmemborn bini-
tial bogstaver som var indvævet paa Kistens ende og den bevaret den gamle
Konens at holde superficies upröret. Arch: faar nogen gange Bladene ware
mere varde end den fort de forder kommer dette ud Ærerfuus eller den
op allesnart Ærer Vederne faa at det med ingether Vind blæser i Kuldne
slutlig i Stib Instor Lybens og nogen Stib i Ostindien med mieder mere
saare skriftlig Forklaring paa at det er fri fra dauer. Vdmiendlig i Suri-
man.

2. Pulsatorius i gamle Ærer Vaggen pillen neffen St: Hans Berg. En gamle
mandt at det skulde en Slaphiines der løsendrig med Kiekkerne ned Ærend
og skrumpnede ned bogstaverne, men Derham nærter forst at det var Termes
Corbitherles en Holander. Den var mieder med nu ikke mere sammen
med saar mas det sig pillen Sin, gaaer der fremmed til nogen Ærer latel skumpner
med bogstaverne skriftet skrumpnede som skulde paa nogen Sinds gemmer Eche
gnumnet Sokkelrom at nogen skal dø i Sinds ikke i de Sorne den. Kaldes ogsaa
pediculus pulsatorius. Findes i Herbarier hvor den opadne Klistret

3. Fatidicum er dette ubekendt Træer med den forrige Arch: for foran den
med forudsiger Vaekter skiekkeren fra Spanien en Løsling, den vilde conservere
den i sin Skr, men inden som nærter en var den Ødsperred omrystnen Kommer
ud og er nu vdmiendlig i Upsala.

Genus IV

Pediculus en Vaand med Aculeus, antenna longitudine thoracis abdomen
depressum.

Species

1. Humanus at udiaud Insect for sob ob skiegne den om mere skiebligt gaaer i
Vordskuen, med Sabadil Frøer menisperthum Coculi, Frøer af Sucka ange-
lica, Lavnerber, Decock af Eduns, for Bonsob Snud gemmer paa Pinguicula.
Den Kiøs fordrimes sob Bøtte Lou Vaekrem skaar sig gaaer sob og blirin
Bonsnd, Kuer, Ellepsi, Kiendsnd. Lysfuen i sommel er sommer species med
den i Skadrer, men de i sommel gaaer ud og i Skadrer ed vice versa.

2. Lubis med den bruger Sobels Skix. Skedisar skrynet ned Sracta oculus,
det er ikke at synes Skyr for fer skiller Slag af Kiøs Sikrinsor og Kiøs.

Genus V

Pulex irritans fordrimes med Satureja, Kilegium Rexicatoria alnus,
naar blad strøes paa Gulvet de faster Loppernes sig paa den skiebligt blad
Foraarer nen ikke Loppe, skiepper man saar i ny Skur saar Loppe er ikke
Stok, for gaaer alle Loppernes bort. Farer for ungen Loppe.

Inner skuffer blomst aptera som nu den gaar for vorm lingi Larven usynlig, lidt og fort legemet findes ovenpaa sporer. In uno Lappo findes i Sverrig Inder i Jorden sub herunde arenaria.

2. Pencralis ligger for med Dorn, paa Stammer i America trange skjegge, naar de gaar om Morgenen finder Dyrene nye Saftene paa Jordens, som bliver fig i Solsolnedgang liggende skriver og giør ulcera Cackoelica, som gaar til Bennerne, giør Caries og blomst Dorke. Calesby figur viser nu Gaffel i Stammen paa ved den mosne Fuld blem nu Podura, Brown siger at Ruser Solden nu Sandsten Legnet Calesby Gaffel for Solder Rolander vilgiør den til nu Lus, nemlig oppe.

Genus VI

Acarus er Dyre paa Kiøt opfolder sig nesten i Ostaugh rimellem Bennener som ad som den ny fødte mogen Anus nu ligesom forstoppes, den faster sig fast paa Bennener gaar ind ad Huden. paa Blomst nu de mest.

Species

1. Elephantinus som en semen lupini albi

2. 3. Reduvius og Ricinus nu ligger ellner at Ricinus er paa rund at den naar gvilk og Reduvius flad og ikke lygt Dyr folder sig mange i Stammer mere Ricinus mest paa Kiøt, Hubnerne for giøre nu Fugl, Cotophaga lil at ved den Ricinus

4. 5. Vespertiliones og Passerinus er de monstreuseste Dyr paa Jorden folder sig som Lus paa Fugler og dersi de nu flere i mode, paa er synet paa Huer under Kroppen. De Geer for giøre den ud for uger uden Rhedi saa eller under Ball ved den.

6. Telarius giøre store Skade paa Vinter i Sommer med det som Dragen antager den, der som Dragen Tvaar ryller sig som Araneæ telaria Linné Arthropodes at som Mere nu Spinde. Den folder sig paa den Gjordnegrøn eller Spy det eller Blesne mest Det Dyr at den gaaer paa Spinder den ligger paa Jord, Ligeler ikke at Dolnu Fikker, Naar den ligger Kaffuer den med og Lau nu. Gjordtiller Mopn og med mere end Aard Dæmmel. Tela Diva virginis er en Boraane paa Agner signs Ontgjd godt giøre ny Dyr, de mere end paa Dyrene paa Agner under microscop kunde de gamle Physici at det var nogen meteoron som Lou med ny Euflen. I Orangerier indaverer den Dyr Dyrene Lumer og Sordiems med Dagene som ud i Skygger opfolder de sig mest.

7. Siro det Mennesker som ofte er i omgang med Afformere eller Ammer som ere
Ofnen. Paa paa det Mennesk som har haft langt er det altid lidt ømme paa
øyne og øyne hvor de kommer, og er meer end det blimer Brødet hvilket
det var Barn gudens med Mennesker og Stabb Commer positivt ved Menesket
i Sviblen acaris opholder sig og alle for gjør Ammer Stabb uryopholder sig nyt
selv pustula med den Engen Sin og Tarm gaarer Ammen efter Fødsel alle
ofne fulci i Fødsel Ofnen for Ammer gemeinen Epidermis og ikke noget mere.
Phtisis Smitte og indre kan smitte i den det som er Ammen for et Barn
Data Ammer men i Phtisi er acari Siroes som Arch: saa snart de er
Patient sies Dyret ombragt dyrlig ikke acari Siroes. Ofne Upsala
febrer kommer meer gemeinlig Stabb, Stabb Commer eller Siro meer de alle
constituere Upsala febrer fordi de er i samlede. Ingen Slange og Varme
Paa paa Øyne
9. Lactis paa Mødr som er Ammer finder sin altid om Sommeren paa Mødre
ovenfor Ammeidagen paa ipsum vas de er en fens Lyberd er sved
9. Dysenteria er ingentlig Siro dog naar Ammer Sveed Kundsbørges Sygdom ikke
som paa mange differente Dyr Ammer ogsaa og Ammer Dyr ogsaa, paa alle
er Stabb Kunde paa Ungdom, paa igjen Dysenteri, og paa Upsala febrer
Sveed Sveins Sygdom Lin som sidder i Kledder gaarer i Sommer de er en dyr
den Ammer. Kolander opdagede Ammer paa nogle flog med anima Khabarbari
paa andre Emed: Liquid paa en anden Spiritus Vini paa nogle essentielle Olier paa
andre oled expresse de Mødr flog og anima Khabari Sveed Ingen Lated
liquid: langt: Vini og Mødr ikke eller olea.
10. Tericktorius er ny opgjort at Dens bites mangel fra Africa for ny
ogsaa Sygt Mødr er Lokken igen som Slogne Sammen med gul
11. Baccarum paa alle Dier
12. Coleoptrata Dyrber algemeinlig paa Scarabei. Paa Coleoptra findes ogsaa
en anden sort acari som har bidet Pediculus og ovenfor en bidet Kuop som
fens med microscopio ligner nogenlunde en Mødgardt, gemeinen Pediculus
som altid mundr med ord drogne de Sidden til sig
13. Vegetans findes som en Kuop paa en Sverm for den blimer udslaaet

Genus VII

Phalangium som 8 Fødder og 4 Øyne 2 ommen paa og 2 paa Siden

Species

1. Grossipes opholder sig i Sammen Bom under Fiel som ofte Sjunes paa Mennesker

underligt at dette lille Dyr kan giøre det. Kroppen hvidt lidet mere Sølvfarvet med 3 gange Øine eder Øiestilene og forst Findes den Island

2: Opilio gangen paa Vindue og Væggen for lange Ben.

3: Cancroides hvor den Termes pulsatorius opslaaer sig i gamle Bøger, hvorfor Exempel at den gaar igiennem Sadel paa ned Rand Ermforan fagnt Forfreelig Vand Blæse, ustula som feden suppureer.

4: Balænarum sig Oniscus balænarum mere end hinsaar 14 Fødder mere end 1½ tommer omkrins

5: Tricarinatum hvor udfor acarus Ricinus saar 3 Carina end Vidt paa og ned paa hver side.

6: Reniforme Thorax reniformis antennæ ligger chelæ cancrorum mere end forgaar den ydelige Fagger pedes primi paris svømmer som ny gaar overhaal lange femora pallida fasciis nigris.

Genus VIII

Aranea saar 8 Øyne og ikkun 2 oculatis galle Øyenen staar paa Siden af Thorax mere i Ringe Skikkelse. Saar over 8 Fødder. Der Dette kan den 2 Kiæber udseende med Tænder, mere ingen Øine paa ryggen Kiæberne er 3 Ful, med Ser lange Ben Skinne og Fødder hvoraf for at fir ud Dette. Saar ligesom de Antenner som paa uoyler, nar Capitatæ de forne saar capitatæ nem mares hvis penis udgiøres af disse capitula. Vulva paa Hunnen findes en axillis der abdomen nedre. Hun vinder nogle ligesaar Hunnen ikke Hunnen saa til hvem ugaarden af nr lystne adskille som Frøe og forfølger Coitus nr Handen Øyeder saa sig bort da Hvemsand gaaer op Ret, Hvorom Dersom altid til Hunnens Lidog mere end paa Hunnens Tillarkelse saa den med Enga giøre Tillinger. Spindlerne nen de mandfolkeyder altiginkinnyt Ilforst Bytter de ofte om Skind, nogen Hvor Hvorved, paa valse Forvandlinger. Vorn fuoar Spindler nen gaaer noor de forst Ponner ud med en Hvid punct midt paa, men noor de nogle til Skinn de gaar Cella aptera nr forst fuoar og nogle faden til Vidt mere end paa Dens Oeconomi det mange nu angaaende Ellers Glas Øyer, de nr den Hunn ede Dog sammenlagt.

Year 1707 blev udgivet i Paris. Verdens Spindlinger, eller Spindelvæbninger fabriceres Vogn Hom og Dille, mere Forgeds Hvor Dette findes mere Dyr Hunder Foar at paa Spindler til Konge Ludvig den 14de de Fødder ollen af Dir og Skinn. Spindlernes Forst Fænder nr Phea som betyder Schneumon Ligger finde gi Hun. Ofte findes i Kiøler Spindelvæv Dragt Fandu ric

Ellers til den anden, man for langt under paa stand at vaade det gaar til, de Spinder ny Konefluer, til de Lister paa den flyver og paa den det paa i den Kiøbe udi Siembrits mens Bier de mieden den paa at de lagde den Sæder paa det til samen og flagende med disse i Spor om er lig det gie paa Ren de dyr i Jøyden og kra den nur Dieb til den anden de de Kellger sætt den Erar ellers sig igiennem til fange nen ræuer udvagerfige Erarne, mere Eraguiefor kommer ved nu den glutineus Lasten den Spin fuu vil ellner med at Hugs oplende. Af paa den forum ny bestom Oplenner om Kommenyne med Spo med Kors Erar nur paa Kormes i ganlinu de circulerende og Lilis radi for fuu mener Bifuer Ely giver paa de skal faa mun fuldens de de mar fuu med Varuffne giør en fort Erykning. Alt mere de gaar et Nyttl Lefer de fuuar Eraagne paa det at det ny mere gaar i fra i Spinderne, giøner selv de Hvanne i fiøren Bigger at lidet Bor Vinnes i Spinderne og de for drager de nu Erar til Paa Kus centrum, for at fuu ellner de sag Kon Kommer og og med den med mander fuu mere ogsaa Skur Kommer i Vanne om den Afflæring om Spinderne er sungrig den op Fraa Kommer gang ellers, pinder omdring den og gienmaner til fuldes Bison. Saa Spinder for different Vand friøl for Skillder ny mere Kos med Tuggne ner Lalden paa Lasten fig med Eraarner. Nogler opholder fig i Jorden en bor i Lanzer Spor den graaner paa ved mere Hybl og under gaa det ved vanne ned Vand gaaer at Lal paa ellnen ny Lasten med mere nun Kaulne med selver Lanz Kaulne, Spinderner paa giøer de der sul opholder fig med Myrner og paa der paa under Lifnel mere mogel Insect flyver for bi de de fogger i og Jaage det med montpellier fruchs i olaandem mere nun ny nuden det bedre delfruchiren

Species

1° Calycina opholder fig i calyces floum. Hasdnyaa mere Bing Kongner for vi ger de i rosel og Kragne den paa det ellner bide til fig paa eller paa Bunder Turner i Kommunter og Kommer ny de vistra paa paa mere Moraad Lasten og Kunne fig Last med Asclepias syriaca i dens Blum i den i Blommerne mere ellner det det paa paa mere Blad paa det i florum corpus pentagonum.

2° Avicularis Kommer mere Brunn med langt paa opholder fig i America i de Erdne paa den Lugter paa Fugler for at Kommen paa dens Ang de den giriterer dige til at flyver de de flyver fig paa med mere de de faldnyen og den faaer for den Den mest sygner den ellner sommerig Fugelnes. Americanerne sige at mere den bider Fold skal den gøer de geftigster Drue Kiødsymptomer. Ellen for ny casus paa at nom Spinder nu gelegen om Ellen Vier paa for de for Kiødnet det paa faaer de mere det mere Spinde

ved hvad Salgibor Fremmelsum smukt, Lakkur Mand!

7. Tarantula findes i Italien, Apulien, Berbarie, grøn Sid i Forhaven
ved en Fibr Lokkes Sommer ellers giftig i Sunde dagen, geder dog Dyrene
for cureres med Dans. Mogle blanke de urpur farvede Ind for Øjne, Øjne
mere Øjne for mange Observationer Ingen Bagiv nu ikke observator
for bruge, mest Skjørs Bid.

8. Aquatica Dort og Flour, om Vinterne bor den i Sommer Dunst Stal for
Ulykke Ænu med Mad.

9. Diadema er mangt smukt, Listig for Øjne de 1680 for gjemt nu mangt smukt
Beskrivning paa den dejgt, Albinus for og vidst den er nu ny accurat,
Plere ligefor nu ny fri er derlig smukt og observeres at den ofte bytter Farve
also bør ny Dræbt er vidste Ænu Jungens. Imuer Lou Lakkelig Languens
ra at den Kender igjen Folk. Arck: for fort den i sin Forstand Fod Imuer
op med Flugt da den Ny for Lou at den altid Lou udspringe mere Arck:
Gil forbi den.

10. Fimbriata springer paa Vandet

11. Saccata for og under Bugne springer for Legt Sammen om den Lungen og Fallen
ud Øgner for fig blæser den forviglald Dvorner ind i Øgnet Friske mangfoldige
mere.

Genus IX

Scorpio for 8 Øjne som Spinden nemlig nu cancer Klaus at for nu
med Cauda Langsom Sprik Kroppen og nu Chela i Vinter Ænu Spillen
de Fiskes, de Ligger den altid ogner fig for at Øjnene sidder ned Sommer de for
om Oniscii Øjne Fald den Hvor vraadnet Øjne nu, og i Ænuer Sæs. De for
aller Under Bryst de som 2 Kommer for chelæ som Cancer under
canceres for udbygt Ninde under Øjne og ad fig mennir med 2 Øjne. Foran
den under Under om Klømer for de 2 Sid Hvor Ænus arma nu fordelt de
Sidder ikke Hort forander med nu vespa cureres med Olie mau fat apo
lequet oleum Scorp: ænu nor ad uvidelige gjør det Sommer. Sudnal
Øjne ænl at Scorpions Bid nyne giftigt ænu observeres at jo udgrøner
de Kommer Nordhu jo under blæser Ænus Gift for for Italienerne
og Hort regardere derfra.

Species

1. maurus ny i Africa Øjne med fig Sid ligefor den som ny i America.
Den ny nor og Ænu som en Krebs.

2. Europæus ny i de varmere Dele af Italien almindelig og fikker
Ænu Lou det paa ny Ænl Skarand. Jeg Kolder Ind der for Langue
doc. ny Nikkel ikke giftig. Det ny ny det mere genus af Insecter ny
for i Nordhu og det ænl ænl.

Genus X

Cancer Paa den denne ved Insecten, ikke har fødder, ossa externa, og musclernes punctum fixum, dens organa respirationis, som aranea er paa Cancri i Samml. Mange den er species gior alle meget mere ligt, alle fuldt ud 3 a 4 Tommer bredt i forl. 8, de unge i forsøg. Den cancer deres i 2de Deele, cauda og thorax. Thorax har en testa communis corpori, Cauda har flere incisuras. I dette genus er cauda bøyet paa 2den Maaneder, ruhed er den ester la apice foliacea, vel inflexa totaliter sub pectore absq foliis. De unge have 8 Ben, som meer ligner klouen end en Fod end der paa foran, men meer tabt. Den 10de trigonum pollex. Pedes er 10 Ben, end paa den, udi om den 8de det kortere kaldes manus, og paa den Chela. Dens Chela er ufrigt paa ulige Slag, paa nogle spidsige, paa andre foliacea, paa det andet Sømmer den bredere, de fem gaar paa bøyet ligt end de andre. Munden er midt paa Brystet, bagom den er Dørene som fødder og som Fødderne, og der end Sauger mange smaa Chela. Ved Munden har de nogle palpi som er chelifera, og Digaciyli paa de unge. De Krabber den samme ingen Sømmer, og de fem par, de fem i Brachyuri, som de 8 Ben Caff Krabber, hvis Skind er oftelens indbøyet under Brystet, og har ikke Blod i Ryden, Macrouri derimod har en cauda semicylindricam longitudine fere corporis apice foliacea. Ved Cancer betroglos 8 eller 10 Ben Thorax (a) har mange Sauger der er ligesom oculos (B) om den har Øyne ellers Øyne (γ) om den er glat ellers lodden (η) Cauda om den er foliosa ellers acuta (III) Pedes om de har Haaler (de forste uneulig) Øyne ellers ikke, om de bortfødder er subulati, ellers Natatorii, og fritte Par, de 8 Ben er ligt. om det skal svømme ellers solstitium æstivum, og det undtagne Vinter. De maar have 8 Ben i 8 Dage, saa at de blive meere, siden er Skallet hengende ud, og fritte bryder det ud ellers Fødder, og siden klo den ophigende testam totius corporis slotter Vandskiftet for den, at faar den skinnen gen fig, og den er det ikke saa meer end paa den den Dager er paa end en fig, ikke den mere end det ligeende. Naar den forste Tøyer er den for den ikke det den fig den fiart paa dette. Sammenfarde Ben, og naar den skal paa 8 Dagen den fig paa Øyne. Ova fidder

sub cauda extra corpus in Racemum postquam exuviasque ere, de fiske først
under ovne, og fiske under ovne, til de de igonder, de fiske kommer de byder skal
mellem ryg fiskene og gemen skallen, og monder just naar de skal byder ove
skallen, fora at ove under den Lid vorbuen ligger, foraar mogen fremmed kræfter
ligger derinden. De byder sinnet Dyr ove skallen, og naar det fora mengt under
skjøner de skallen bestaar ovenpa crusta calcaria, og ellers ny lave udviske
og ny igen fremmed Vinterne fiske skallen fast, men fiske bygger skalen at
gjælle imellem skiddenes basis langt neder fora at kroppen ikke ligger
klemmen. Reamurs afhandling om Canceres som er gjemt ind i Paris:
acad: handlinger meriterer at læses, som beviser denne corporation ved
det, det som conserverede den ind Glas-kar og betragtet alle dens functioner.
Han har fundet at Dynnur generere ved det fora skiddet forandrer gaar
under ovne, skallen i disse Dynnur kaldes oculi cancrorum, de ere ikke
i alle species, men hvorfil kommer de? maaske ikke ved kræbsens skalle ove
bytte under ovnen som larverne, og dyrene ligger i den skalle blev
paa det ikke som det i begyndelsen er meget tynd. Dens Dyre flaar ud
og ren flexibel til alle tider. Kræbsen siges ikke nocturna. Foraar
der er i Europa mere end to slags i Middelhavet og Indierne. Dette
er differentia specifica er gemeen nemlig, de som ere uden ikke ved
undersøgelse Rumphius som er professor ved ansøgningen de Ostindiske Canceres.
I America findes mange canceres, som nu kun ude udelukkelig ere brugte
til Vaadet og Dyr ere skadelige for fiskerier og udøverne, skjønt det
det paa dem fora skipene de ikke fora det. Fornemmelig er de grønlandske
skabene til at skjule Vandet mulige cadavera, de gaar over ensom
skallerne, og de gaar de op paa strandene paa skibene som er blevne skad,
ad og alle det utnelige fod er opkastede: g: medusa og andre kræ

Species

1o Cursor kræbsen gaar fort, men ikke fora mengt paa det løver, men
igen løber og det fora fort at ingen kan det tage den. Ellers
de skriver det at den paa skygnud fremmed ved Joppe og Alexandria
fora fugt Vejen gaaer ved Lommen den og 1000 Cals og ved fem mon
nen fem er fem ligger Vandet

2o 3o Pinnophylax og Pinnotheres bor ved fellen af Pinnapk fra Jac
quin observeret findes i Chama gigas for forsaaen igen skal fem Pin
noth: de findes i Pinna. det er 2de species fem ere mere end ligger
for dens Dæmon staar fos muscler, Aristoteles, Plinius og andre gamle

Dennes Dele er et Concha pinna eller Dueskjæg som den ikke langt fra
Pinnotheris der for man holder for Fødsel indtil Hasselquist forer den und
ganger Øyne i Orient. Af species sepia octopedia Dele det lauter en kreds som
en bølgende Lær og nederst Fødder som opslugt, men er Concha det fast sig over
de øverste Dørner og stænder fast for at opsøge den en kreds ligger nede Dem,
de nu Concha for ligner Øyne men er den total blind og skuderlig
de flyver Concha skulle bøy lever selver seculer, skulde de eller ikke men
Alder sveb Skolbenne ny Land de gjennemhuse Dumer Tilslag. Pinna lig-
ner dumer eller Cancer skuns fod sig men pinna er den ny fier Dørner for
at de springer dem ud for at søge sin Føde, men den octopodia kommer
slimer den selv bruger springer endelig sin Vandende og over Ellerne
hvorpaa Vandende skrøp skulder Dørner og rede den bord sig og sin
lille Krafte.

4o Auricola findes sig i America paa Caribiske Øer og en Kreyzel
marcherer alle til Mandene for den at ligger sin Æg men Vingerne har vent
den ½ Aar i Øyen Sommer til Land de Caribiske eller noog man kom-
mer i dens Øer som er i Øerne og er det befinder lig at de sigter Blom
er og nede Caribes Ohela eller Sølv Dumen. Eller gaar paa vingen
til Jorden og kom alle Sølv Dal er den nem bredelse, men er
den for gaaer den ny er Vinyen men man bør gaar sig vinter Øgen
og zul vogter sig for at opæten den, se de ungen at sin Blom og i Vin-
ter og er den lystelig som sigter den sikre mand Lænd. En gillige at de
og debiler er den til Hippomane mancinelli Træet som er den giftigste
blomster og dumer er den i alle verden lig, men bør ellers Reaumurs
observation minder at alle de som ny blem vær i Regjeringen er
gifteligt.

5o Mazapus Arch. saa faaret den ovp Basker som forstørrede den
er bedre, saa de Fødder sværmer den Fiskens for de oveden.

6o Minutus alverdelig i Sargatsø.

7o Floridus saa forneuenlyst Sauder og rød Skeller paa en blæng
dosia.

8o Vea saa paa Øen Vidne en Fuglsyning som ligner et underdrestal
sammenhæftet H A.

9o Vocans saa en Fød Blom den under den bliver ligger under Dennes
Dumer oppe og Dieber i Sangnerne, den bliver Fødes som en Blom
fødder fra for facies.

10. Granulatus saa ud som et Crucifix paa Skellet det Land
Fødder.

11. maculata har nye ens

12. Caput mortuum consistentia alcyonii og nu lexfur midt mellem spongia og alcyonium! Er lodden og bygt af Kjerne 6 Lover klæder med testa, men Spidserne ellers snevl af Kjeger uden löfr, og fig for Kjøbenhavn under testa hemysphærica tormentosa flexilis og stel en substantia carnosa med fiellen melk Kjøbenhavn ingen Bagtil hvers Spidser formuemæssig saa at som Lou löfr, og Huur für foran og Bagen den tilbagevendende. Er ubekjendt om det er en Sjur for begynd af Sjur den.

13. Pagurus Sand dod med fem klöer foran fuldvuxne Apolegued under Skallen om Chela cancrorum.

14. Hastatus for 2 Jaggner paa i Sidsnur grönne ore Sjusnur bygger ellers udenfor Hvuur filler de bör conciperes som Skal.

15. 16. og 17. Diogenes, Bernhardus og Eremita ligger fig i Dunt Skal, Rumphius klogner ungt og den den vendt den fundet krøbe i Dunt Skal som den lagde med Skraaden for alpudsens om den fig foldnede Skjynne, men som ellers klöernes Nöttelse.

18. Gammarus (Fuunn) liguns Astacus, men bruugnaal bjerg den fast med et Forand fiegger den i Sönni gjemmer den Sjel det ad for blinde de unge til Ende.

19. Astacus Skinne Sand om uuzgjemmer den Ron Lynner ligger for ovenfor Ryg und acetum lil Kjøbenhavn ny Dell fiele mere mindre end mere end er fiert optog om Kjøbenhavn Krøbet paa Land op i Bækkener.

20. Pulex Lidet Soppen i Mordet uden Skynn Dand som nu Sugen mord und Skrömmenter og Lou fins paa Skrøde den Snor de Lindes fi uden paa nu ordet den lidet Dyrbuding. Sugelen Recurvi rostra bryner ny dist og Sougner den paa den Skorod det fun Skiller fil Skab under Dorsum ligger som den Lofnde Dorsum.

21. Stagnalis 2 linier lang liggen paa Skiggenner i Siller staaende Skorn og fanes ud som nu Gjæden. Midt paa fig for den nu rod med Dolne Skammende Sogn Korn som er Ovarium og er udi Skinner fg. Steffer for nu fand tractatom den. Jom Snod Skorod den Kommer den Kommenn paa Langgner und mere ille om ny Sugenner end den og Siggner fidne den fg, som forelendes Sorglouter.

22. Salinus i Dall-Kilder i England.

23. Linearis paa Skin rund og linearis paria pedum remota.

24. Mantis Soldr fig i Sommerhuset cauda triplo major med Clypeus pone oculos duos lobos ciliatos og under 10 ovate smaar lameller som ligger ad oculos under den Ommer.

25. Strigosus har paa 2 Sider Horn umbracula er ydersst krumgent.

26. Gymnista Kinder paa finer serratura celiæ

27. Dorsipes 4 pedes paa ryggen

28. Latro har ungt tyndt Skal Soldr figpera Landslag i Vandet.

29. Gammarus ligner i Sommergaarn, er oge Skallen er den som, men snart Cocos Skalden som den bider om Grenen og sidder der, den Soldr som en Skoldr.

30 Depurator Mancus ligner: al ringen Fuck bor med Skraabner ad mare adriaticum hvis ikke denne var den ene som Horn Mange den ene Skal mere bort med oplaadt Kiuknud Cradsner som former fig om Dagen paa al Sner Skorgen er Skraaeben mere.

30 Maja Krold. Krabben.

genus XI

Monoculus er en vorskelligt genus al Dyr med mange Soldr natatorios og ikke Klove. Skallen bedekker hele Kropen som ligger med Dyr i Vandet, men lyttes Inflorat ved Hvorden den lid fil Stem, da Pulex som var den ene Cors blev og dagen, men for dog 2, under den ene som maar Ligger i Vandet.

Species

1. Polyphemus Navnet er taget af den Polyphemus, som hande ligesom Cyclopes med Dyr i Vandet, Soldr sig ad den Farkis og Cagibus, man med al de Ulysses med fire 4 Skaldbroder blev Gragen i ene de Hulder, og blev paadr. Ulysses den ene igien blev med Lyster Sten med Øiet, og Stak ned gloende Jern i Øiet Dyr som al Forblev blind Svor med Ulysses lid Skyr. Denne monoculus er og gigas blevet Inth Slagt, findes i Indien og Norge, men lidet den Storst insect om aller. Paa den ovden er Skallen forneuerlyst, men den ikke er Skal ikke paa en cauda med 3 Lunder langen med Jern Kroppen, ligger flad i Vandet.

2. Apus har et Dyr, som Inflorat ved, 4, Soldr apus Skiuch den har Skinnet Soldr med nogen andre insect, men fnes ad

med korte porafnuck, som den nyforandrede er membranacea findes i Sverige.

3. Pulex lyshrøde Soldersfige i Dandlerøgnefigurer. Ignis ovaria nu vide hvor fare Dyrene ofte blodige ud. Antenna dichotoma og gruuger som nu short.

4. Quadricornis har 2 langere og 2 korfere horn, findes i Stallenstraaen i Dand paa Kongs Engen ved Upsala.

5. Conchaceus 2 valvulos som ligger sammen.

6. Utricularia i Magnuerpora utricularia, har Professor Linné for nogle Aar siden opdaget ny monoculus som er og Conchaceus, den er nudum uden skal. Det mærkeler noget at andre har hvorom utriculi commer frad Vandet de har hvorved sin Inne paa Maaden den genereres.

7. Entomolithus paradoxus er petrificat er ovnu monuculus som absolut maar findes i Norge Sammt.

Genus XII

Oniscus er et det genus det Linné har 14 Sølder nogle Soldersfige paa det Tørre ovenpaa i Dandet som nu paa Land i Apotegnet mille pedes gaaer meer end den vidler de sig sammen som Dasypus Armadillo. De have en i Dandet har med Trinten Øiet som ligger oppe og nogle under ovale med de forige.

Species

1. Entomon eller op all hvad forgaar eller hvad som Sæk.

2. Cati De 2 allere 4 fraguste Soldere er inermes ligger som Crocus Salem De ent bidt ungt lig Phalangium Cati uno den har kun 8 Sølder Dyr nemlig Cites Kroner som Skillingen de eller Sommer fulgere halfsten paa ofte den fogne ved Lufter sig Sorten den ligger oppe i Dandet ved de Sæk. Maaderne og under Commen ved Lufter den.

3. Aquaticus med Spuer har meer grønt flere Forfog end Soldere ved Siggens vaar de fuart igenen.

4. Occeanicus lig Asellus ungt ved Strandelig i Norge Sammt.

5. Asellus Soldere fig der paa Dalogne Vaaren i gravt bidt lig lig Strandelig i Sammen paa Apotegnet Soldes den mille pedes Dyrene meer den i Byerne som har den nu paa Lugt som Salmiac. Ved den Engger fig paa Fuerfig meer Vingerne Kommer frem end de de Sommer og de Vinger Skallen igenem Huer i de Fluer fig de ede eller op Cotyledones Plantarum.

6. Armadillus Soldere fig i Grønne paa Dandet meer meer Sommer

til den vilde den sig sammen som en Klod. De Skorpe-slagte som den er som
Sommefolde sig i samme nem mange species ovenvælnt Colutor Sølver og Kil-
lens lut ved Nærmere og paa Skadeser som en Ungen Dugge.
Ad. og ikke allenen Sølen men og Stoderne findes ligesom i Indien. Sammen-
ligner Klod under Nærmere.

Genus XIII

Scolopendra bestaar 20 til 130 Fødder, Klo og Snerk Ende med Fod. Hvilken
den har den 2det maxillas nederst Klør som de søger at bide med paa dem
til paa Dyrene, som paa Mennesker.

Species

1o. Forficata er almindeligt 2 Klør med til paa under Dyrene.
2o 3o Gigantea og morsitans er Klør fra ¼ til ½ Alnemaal Felder med
numero pedum som regner Mænd. Dens Kiæber er som paa Mennesker
Bide giftige Bid som nogle fra en Timeaand til ½ Aar. I Sommermaa-
neder for den polerede Ens, er de Dyr under Sengen at de ikke maar
komme op om Natten lader en Lampe brænde at Chamaleonen maar
ikke krybe ned den op og ned den Sinder.
4o Electrica opholder sig i Jordens ny Blod, Ved, Erter som en Drue væx-
ner med Ind i Stor kul grøner den ligesom Electrisk Gnister fra sig.
5o Phosphorea Castor og Pollux er navnet fra de ælder Grækers Ind
bildning, en Ild som falder ned fra Skyerne og forlader sig ofte paa
Masten om Vinteren de gemeen for bevarende Sømænd Venner om
lykkelig eller ulykkelig Anger. Physici for bruger det sig mange med
alter Klorn det de ælder med sulphurische Dampe som concentrere sig
igen med nogen Røg som generere i Luften og ved undfaldende
Skinne electrisk. Ostindiske Capitainen Ekeberg var for lykkelig at faa en
fordum paa fil Skib i Æthiopiske Havet mellem ned 100 Vestfra Land,
der det faldt ned paa Skibs Dækket sprang som Fisk til. long og tilstrækkelig
og vendt 2det Scolopendra ved ukjendt species som Augen fremme Øjne
som Lunde beskriver at et Insect ikke Vingen Lunde flyver i Luften 2 Arth.
var for lykkelig at faa en Doct Halmand der fra var i Spanien en Scolo-
pendra Skikkelse noget bestraalet vinde med 4det Segment med Øjne som
oplæstet Skulder 2det sammenvendte Vinge er til et klart Syn at
de kan flyver og ikke nødvendigt mere colop: Phosphorea som er ligesom Skrivt Eke-
berg ikke for Lunde observere det, fiske Vingerne var indrøgen og
Arth: vispaa et Sider Øjne for Lunde indflyver Sammenstærkeste
Entomologi Øjne.

Genus XIV

Julus. De nye alle meget glatte lange uden Fødder og Fødder som Ormene. I Indien er nogle species af 1 quarteers lange og langere end som en Fuglefjer alle forenede som Ormen. Den ene Ende af den er som en Ormehoved hold sig med under Jorden med en ubrugelig Hale og ligger som Slo-pendra numero pedum men de Øjne som Fuglen Den Øjne som Fuglen microscoper.

Species

1. Indus og maximus er et quarteer lange end en Fingerne.

I Monandria

Monogynia

1. Salicornia herbacea er en liten Urt, som en Forårsnar er dem Ungdom blad, som Træs og Forårsbrænde, ellers med fulde Kilder. Den ligger i Kull. Ingen Dung er Forårsnar for begrænsligt som Gruus.

2. Fruticosa voxer ved Havet under Kalmus og som en Kort, og er en ulige Kylen der hver mark Dagen Dørn. Den voxer ligeledes i Sydlandet den ingen Kalm voxer, som nu er i dagen oeconomiske Nytte. Af den brænde det den fossil alcali.

3. Hippuris vulgaris Hver Vand er og det for at Hele ny Dem med fil Vandet om Vinteren, der vox ni ny gjerne nogen andre, Ifi Vandet er Lo Kold.

Digynia

3. Callitriche verna og autumnalis er meget lige og voxer i alle Dage hver Vand Forårsnar i Vårtiden er verna en ikke meget ovale og ned i Spidsen, men autumnalis har folia linearia, og er fuldt i en om Efteraar og Vinter. Dagen Blad er ved Jorden 1. er ondelig Vandet. Insecter og mange Sikker Soldne figgjerner under den, Under Bøjning der fig er det ved Vandet og Solden fig i den, om de for ellers Insecter eller de Vandet vandgry ikke.

II Diandria

Monogynia

1. Ligustrum vulgare, voxer ved Gaarden ved Storgy Valdhalla er mere den Lander Norske Ellmatek, det Lorelen og er vox i Sverige ellers er det Begrænset i sin ytte Jord. Den dør ny Foraar i Lø og god Vinter, de da voxer den Lønnen og Bigen ny Foraar igen med Kulden i men den bør Foraar i Grønsagtig Jord Blandet med Lønt Vinter. Ingen er ydelig Sorn som vor Dager Lorelen, og er ingen Foraa Lipelig til Incogs Sedlen, som Gruus og Buxus arborea. De den Lorelen ny ellenen Lipper fig Ynet det, den og i alle de former man vil, som Hollenderne Gøre med det eteguere. Ellen som Foran kyl Vanden den ny med Lukken til Sedlen, men Gruus gjerner ikke dig til Dør blomer i det Yngste Sog som nu Kogt. Den propageres ved Frø, ved Rødder man selv den ovenfor vinter den Sorte med Lorelen, og er altid er Lorelen Kommer ved Sengr med Avisten, Skillet Foraen det Planten Vanvaren Lønnet Lønt Foraar ud, bør ny Planten i Skygge. Den Vaarsen vinter den Gruus Blomster, og om Høsten Forårs Bær, hvor ovr Virgilius signer alba ligustra cadunt etc: Skillet man signer om den som Dagen er Sen ikke Skumtrimmer, som Kelsk blizzer Sælig. Ludvel gjor Foraar ved Verg:

vaccina nigra er det samme som var Vaccinium myrtillus, men skal
vand Botanices ignari. Indsamle sig nu röd bruun Dafl med hvilken de
male Kort. I Italien lægger de Blomster i röd Vin for at saturere
for vinen

2. Circæa hvorvnen 2det species; Lutetiana hvilken er høy som en Kort og
vokser ret op

3. alpina som findes er meer end 4 Qvand lang, og ligger næsten i Ruff
Dennem beskriver Hermand ret for at Frøer, og i det Fød Ekkerner. Lutetiana
vokser ny gienem udene ensellen høy Træer, allerhelst i Løv-Skov, hvor den
vokser tæt som Græs, alpina stod med Haar i Hvinger Bygge, men paa aabnet
Fell, og er ny vand ret plante for Kroatien.

3. Veronica maritima har ingen Blad ved Hvert Leed, voxer ved Kiøgenen
ved Havet til en Alnes høyde.

7. Spicata er vanskelig at gienkende i glabretis, om den er Balle eller høy Fell
hvor ny omkring næsten ved voxer Aaker festuca ovina den ringe Græs er gla
breta er den høy eller Vrelse visner om Vinteren) med det Eiendommer
den forbrænder Blomster, og bredder Fellet med blegar Farve, Bier og
andre Insecter fører de i den hvilket ny giør aldeles Ende til Dendes Indsamling.

3. Officinalis om hvilken Franzii Veronica theizans er Kommen som
benytter den som Kaffe-Surrogat i Stadet for Thee. Naar man
bleiner vand Hvand paa ny ing vis paa at den fuldgode bigfora god som Thee,
men er ingen mere stiptica, og de Thee klager paa Øyeblik Smerte.

En Dreng i Smaaland 40 Aar gammel, som gaaende og bevegende conti
nuerligen, alle Dage om Sommer Lengsel, som dreng ny omkring Ehr med Hvem
ellen Franzii Reisende, og levende omtrent 80 Aar. Den stod ligesom lot
sue, voxer i Skoven, Balle ny gienem paa Fugner, men allerfølge
voxer den paa Mørke-Land, hvorfor den der ny udenen evident. Den for nu
Veien Lige, naar den er tørret skal den ved Jordens Fald ner
4. 5. Anagallis & tica og beccabunga voxer som 2det Øyne er Vigner og
Bilder. Anagallis voxer ret op, og har folia lanceolata, beccabunga ligger
i Ruff og har folia obata. Anagallis er annuel Lynde med Sorter Farver
Kraft som beccabunga, men forde den voxer mere Fallen paa Bredden den
ny, men beccabunga findes i Kiær, Diger, og Kildevand der hvor Vandet ny
Krøyer om Vinteren, og Øyeblik Snelen Balle. Den er grøn Sommer Vintermen
Den Vinter men findes ny Vallade, men Sommen Blad som Ahb, og
har Sommer Dage og Nytter som Vallad. Slahtianerne som forgiøre,
at den er en fare Øyeblikelig Kraft, bør de falde ved at Fordøvoy,

Indtil de Lærer, at den ny er uman med Vallad

6. Chamædrys stilles Lærer sammen med det Vilkaar for 2 Aarhundrede, som man læser. Voxer ment paa Kirke-Gaarden, og i Øl-Sønny. Den med veronica officinal, at den er for meget adstringerende, og altfor ny for delicat, derfor kan denne lægges i Dennes, og skal den i det recommenderes i acta Berolinen.

7. 8. Agrestis og arvensis De almindeligste Vidende: Kiøb-Sønny. Vil man sætte en Kiøb-Sønn i ny Haand, der den lægges 3 Gange om Aaret paa det Vidende, saasom man Tænd for det ustemte i 3 Year.

9. Pinguicula vulgaris kommer paa de Steder som aldrig bliver tørre, men dy paa det Vandet at drive Sommer og Vinter, meget almindelig i Sønderjylland altid paa fordømte Steder, som ny Gøgt Gras er, og der skor Fersken ny Fodder den hvad det at Kiøbe gaaer Kort paa nogenlegt Blomsten som er den violer med en lang Spurver. Den ny vor ikke Lands-fugne Vist i Vinter den for sin under liggende Blad, de nem den ligger paa ganske smuk og med Øjer, men dette Øjer veritabel Blom, Ej det kan dragne ud i langt Ermar. Jnnen Morsdage alt ønne for Gefle i Sverrige, bruges den til det Vaskel. Vilken snar om Sommeren at norge Vinden Lærer det at sætte, paa Bænk nostem Salen Inden Vaser med Bøtter under Stolene, som faaer nu igjensagelig Smerg. De sagde at Vinden fuuner for Sølv, med det er Pinguicula souveraint, ikke Vinden blinder Øjenne, Øjenrengjøring Smerg, og nostem ingen Voller. Den lægges kun 3 Blad og lægges paa Bordet Stoenne for Øjenne paa Vinden, de Menesker blinder det Øl-Vinden, hvilken man gror kun nogenlegen om Sommeren; Ej den har en vis multiplicativa, som de 4 liqueur i Vinden kun ny. Blomst paa den bruges med marisca, en vor Øjenmer gnide ordet ny den mener.

10. Utricularia vulgaris vokser i Sommeren, Kiær og Øjeder. Den ligger lindes ny Sønden aldrivanda. Den har Blad som millefolium under Vandet, med Sønn ramification og Bladner ny Fugl utriculus. Den er Øjer eller Fenkny med Bladner altsom Vinger med hel, ligesom en Decabolus Cartesianus. Sønn utricylus er en monoculus ikke Øjne, som er vor lidne og Øjer med at den ingen kan komme til egenduren Fuller paa Dieden. Man bør ikke gnide Øjne den det er.

11. Lycopus Europæus med alle Sønderender, alle lige med Øjner. Zegener ne Blad den ogguich drufgel Øjenen paa den Den kan blæser sønder. det bør for sagne om den ny i Sommeren Lunde bruges til Gnid.

Digynia

7. Anthoxatum odoratum det man for Gro gnid gør Scheuchzer for forfaldt at den behagelige ugt paa Gnid, de penere

er ungt som Træer. Det lugter af Gouger uanset paa den Ende, hvor det
vokser. Det findes ofte paa sydlige Bakke ofte paa den Side om
Vallen, som er ifra Solen. Man fælder hvor det selv vorder af for
ungt Græs for Kreaturerne, men det skaber ud fiur Blad og Blomster
lilig om Vaaren, fødes formiddelst det selv Sommeren og vokser igen
og om Høsten med fiur Blad, lugten kommer ungt under Melilot
og bliver skarpen paa den tørre Vegetes med paa den grønne.

III Triandria
Monoggnia

1o Valiniana officinalis vokser i Engene som en lidet vaad. Roden
har en stark, ofsynderlig og ogen lugt, ofsnu hircinus, ogen ovgn
unmuligt om, den kan beholde lugten i tørre 50 Aar. Katten
er ikke ungt Roden. Den som curerer Ben Ras, bruger den for Rum
vaar Pynuerlet er at purgere den, ved at blande den med Vinal
Eger og gifn den at drikke. For saadigt skal bør man ordiere den ~~med~~
~~Vinal~~ Eger og drikke.

2o Dioica er lidet, den ven paa den samina. Vokser i Skaanegaar
dene, men ny ikke paa loca uliginosa. Dræner og den selv primula
veris vigt nu oeconom hvor loca uliginosa er. Locus uliginosus er det
hvor Vandet staaer under Jorden og fugtes hvorafhænder, at ingen
Vegetes vokser der for, ikke alt fuvat og stærkt. Jeg nu oeconom
som curere for dem fort, og den drikker fig, som aulinger der Degn,
de skiøt forgaar Digner fra er det og forgaaes; de kraftige blomster
nu forgæs fort og aldrig fa de baarnet, af hvilke hvilke det faar Græs
hvis, men vel det 2det.

3o Locusta er annuel, vokser paa tørre Bakke, ogsaa paa den i Sanne,
den bør faas i August Maaned, at Bladene kan fage vokse og om
Høsten, paa tørre Bakke, ellers vaadne den bort. Bladene staar
grønne om Vaaren, men dunne bort de Bladene bruges til Salad,
og er den bedre end det, af hvilket bliver 2det Kaalen.

4o Iris palustris for pragtige blomster, og vokser ved Kilde og
og Aaerende. Det fordiger fig med Roden. Kreaturene æder Bladene
naar de bliver tørrede.

5o Schoenus marisius vokser som store Ager, men Bladene er fra
Ager paa Rødden, ved fuaar ufyldige Eggene hvilken er fra Ager
at uden Ben skiver hvidere ufyldige om paa fig. Fra Jotland bruges
den til Engfolen, og til at tæde Sog ved, ikke den vorner lange.

Inbuygr den og om Søen til Søen for Kornet. I Storaaen Kiær er ofte
huoer Dønn allene stagna uden Bund. Den kan ingen huert saar lie
gen ved at plaude ouermuldt og Kaalen, de den indeni ligger Kor
nene tilsammens som en grøn Sug, saa at man uden Fryd kan kiøre
Kornet ind Vogn, saa tæt Kaldt Aldeskorn tilsammens, nu ligne stab
sen ingen Vegt i Hele Volumen saa. Insula natantes kaldes
den Ø. I Vinter Skaen er huoer Gras som voxer i Vandet:
4o Scirpus palustris voxer i alle Kiær og ved alle Søestrande, i sær
der hvor Lerren er, og forøgnt sig ingen. Voxer fiildeen under ned
ad en ½ Alnes Dyb, den maa hver ind Sommeren forskellig Ingemelig
ved Vinter vaden udtør at de den, men i hver Indsøgelig den kiøraar,
saa fuuger de Fuglene Rodne eller Bladene løber.
5o Cæspitosa er navn for en Oeconomi at kaunde, man vandat
alle Vestens bestaaer af Tørv, som ligger i Vy og ude Vestkant er maa
det en Skjøgord (I en hver alle Vøder løfes op om Sommeren af Kul
den) som Tørv bestaaer under af Humer, saa paa en forøuderlig Skaad
forøger sig ind Rodne, saa at bestaaer af Langr og brunerguma
som er rudimenta til den Blad, eller huert forgl den rette Blad,
som voxer alternatim op, efter Ager staar den Rodne ud om saa
lenge voxer de altid til den de voxer sammen, og saa lenge bliver aarets Kiær,
som allene bestaar af en ny Vy, endelig tillægger ny Stagna,
saa den sig mellem at blive steilt Kiær. Disse Corner saa, saa lenge
den bliver bygge, varer Ellen secula. Den Culmi er for 3 quarteers
for Blomster lad om Sommer, og den ved Vinter begyndes
af Gnedes.
3o Lacustris voxer Sammen Strandene af Søer til 1 a 2 Alnes
Dyb under Lynet: crustra quarts nodum in scirpo, det er, en Sy
dian Vegt, som bygger Indierne, som taaler ingen Frost paa sin Ved,
hvorfor den findes aldrig uden i det Strandene hvor Sten kan ligge
Bunden, Fisk samler sig ingen der hvor den staaer i fem Geder, hvor
den ny slaaer Roden de Gamle gal Strænder, og er ensbetydende ny
ingen Fisk der, saa at den baade gribder Strandene og giver den Fisk sig.
Søndmer bruger at bedekke sine Cag Instrument, ifølge er ny og under
i Spongies. Naar de mangler Sør klaar de den varme Sommer og gø
ver Kraftermer. Den lader ny ingen, men ved kan de ogsaa bevart
ind den.

4° maritimus har 3 kantig Stilk og mange spicæ sammen voxer i et capitulum. hver nu squama i capitulum er 3 deelt. den voxer ey uden ved Søe Strandene, og hvor de ere nøgne kan man faae den grøder ved diger.

5° Sylvaticus har som den forrige 3 kantig Stilk, brede blader, og en stor panicula. voxer kun i Skovene paa Fjeldenes Kanter [illegible] Kreaturerne æde den ny kommet heel begierlig, og hvor den voxer starck kan den samles til Føder for Kreaturerne.

5. Eriophorum alene voxer in locis uliginosis paludosis, hvor intet Græs ey trives, og det i saa stor Mængde at hele Enger [illegible] Blomst. [illegible] man faae nu foranstaltning, skal en Oeconom kunne at det er [illegible] som [illegible] til [illegible] Pedicularis. I Juni [illegible] Frønger ere modne [illegible] Uld, samles [illegible] for [illegible] Klædninger, og [illegible] den [illegible] til [illegible] Bolster.

6° Nardus stricta det [illegible] Græs for Landmanden. [illegible] man [illegible] Stov og [illegible] vil [illegible] andet Græs trives [illegible] som voxer med [illegible] Blade [illegible] Bolster [illegible] Stov [illegible] [illegible] Bønderne skal [illegible] skal [illegible] det er [illegible] at qvæge [illegible] saa [illegible] for de [illegible] har [illegible] nogle Slaag, saa [illegible] over Græsset, da [illegible] som [illegible] og [illegible] 20 Slag er den [illegible].

Digynia

7° Phalaris arundinacea [illegible] paa [illegible] og [illegible] hvor [illegible] Stov voxer, der det [illegible] for [illegible] med [illegible] det [illegible] det [illegible] som [illegible] og [illegible] til Foder [illegible] det er [illegible] med arundo, [illegible] det [illegible] 3 Gange om Aaret, [illegible] at det [illegible] kommer til Panicula [illegible] det subtilere og [illegible] giver [illegible] Kreaturerne.

[illegible] Phleoides et [illegible] og [illegible] Græs til oeconomisk [illegible]. Botanici kan kun skille det fra Phleum. Voxer [illegible] paa [illegible] i: e: in glabretis hvor andet Græs ey vil staae [illegible] festuca ovina.

8° Phleum pratense et [illegible] og [illegible] Græs [illegible] for

kraluurner, uenn vil forn grød og snud Jord, uden hvilken den ikke kan
uend profit. Snor som det vogner kun ved Agner Enuur, ellers hvor Kraluurnes
skarn ligger.

9. Alopecurus pratensis er et av worn forenuft Gres, krydt voxer
forredt. Det voxer helst paa Bidzeln ligger, kan og voxe paa temperata,
uenn ny paa sorder, hvor Vand staaer og flyuer ovt Vommenne, eller
hvor det ligger ledige uu Vaarnen. Det bør haandvogt ledigner eller
bygner den for skarn. Det voxer tat og sort som en Kaal saa at det gierne uergl
fra. Saa den ovt det er det ufortiguelig Gras, hvorved at det ska-
lanagraminis kommer, logner den bort vilt for forudnichnen ellner,
den kommer igaen gierner fuer 10 Aar efter 2 a 3 Aar i Aarsaa at det bør
recommenderes at haand om oeconomer kunn for ellendt Gras.

20. geniculatus er ynl udenuf skagl og voxer paa fuier der hvor
ovdet ny trinns, uenn biggner i Kall, og den uiggner uenn lommer ned
den forrigr. Hinl den finder det i Vinter lund skyldes blad, og er saa begier-
lig for Kraluurner, som fremmer udnytter det.

10. Milium effusum er ikkeudt de storste og gragtigste Gres, uendfuer ynl
lystnedt, og uiger blad, og stoor panicula. Det er ny profitabelt for en
oeconom, hvis det skal voxe paa Eiendr om Vinterogaa skelter uend Lov-Ere,
endskaldt for Kraluurner. Det bør fuer løb og god Skuld.

11. Agrostis spica venti at ugres i Agerner udgoer vilkyt det ny fremdeles
logner Kørdne, fra Korn-Sæd, uenn er aarnuelt kan det for ny blandes uend
dugne, for finder den uenn skoulner ned nogler av fuer Lod, for at det ny
kan faa ud den vilde Agerne.

12. Arundinacea i skoul paa de sterileste Steder, hvor skoulfun-Bukker,
kan ogsaa faa Skaar ud av fuer det. Bondnen bygger det meest fuer Cobals-
Jiden uenn. Faa en stoor Ko som gryfner den udgroer det mest Gres, som
paa uenget uiger, den vokser der som en Agner. Jeg forsøgte paa at skillige
Kraluur, saa fremmer den som fremer. Jnden vogner de mest tilfoer paa Ejne
uenn de dog snellnen av fuiger ned aarden.

13. Canina et stolonifera voxer som Buskenner i vom fugn, og udgioer det mest
Gres, som uiger blad, og det skaan er ongiuelig fremm for andet for i efter
canina, ellnen at forden er uegnt fuglig og Bidlaul. De ligger uenf i
Kall, hvor de ny skaanes av uegnt.

14. Aira cærulea paa de sterileste Skyrner og bredellner den uendfuer blad

som unger nu i Sommer høy, ellers ikke ulinulige til hø. Dens Culmi nu med
et par Aarene høy, men voxer ikke over et aandet Aar. Ellers er den ikke profi-
tabelt for Husholdningen.

2. Aquatica voxer ved Kilder. Arch. hos Sauveon om det nu er den Rø,
som forvandler sig ved den Sommer i Vand. Det er ikke ypperligt Græs.

3. Cæspitosa er ovenfor forrømte Græs. Jugum Regio i Sverrige er ikke ringere
end ved Jakkum, hvor er ovenfor med Græs og Lichen islandicus voxer,
som er Engen til den vorgenste Jord. I Indbyggerne der nu Mangel på
og ellers mangel på, ja det er ikke ungt engang med Dagen, men det
den er ovenfor vorden der. De giør Kostbar med Giødsel, som det koster
den 3 Daler Kopper (24 til) i det, gravet Tørv med Jorden over i
ligger Giødsel. Ved det Græs for Dunes Skyld. Skaar den ikke vil blive
mere Græs, giør de den til Aker for Dunes Skyld. Skaar den er vil blive
Korn der, 3d. Aarene for ugrin. Det Græs er profitabler end det
den giver det herligste Vand naar Engen er skaaret. Det er Dimensk. voxer
ved Aag under at Jorden er giødt.

4. Pleæcosa er ligesom forrige, voxer altid i Bjergs Kliipper. Den har fuldt Blad
og pedunculi ere krøgede.

5. Montana er Birkes

6. Canescens dækker ellers paa Hvilende Egen i Skaane, er altid grønt for at
holde Kreet fra gravet ud.

10. Melica nutans og ciliata voxer Egen i Bjergs Kliipper, men ud af Jorden
Frø; men det er Duoglumæ unget Lager ovenfor. Ciliata voxer i Furbuskes
er vøx i Vinteriger. De ere er Konst tenkeligt

3. Siberica vil er Græs paa Bordet Fell, vil Gøde sig paa andre Græs.

14. Poa er det almindeligste Græs. Den har Kraen flosculi i en Calyx og Corolla
lydt, Larved og Lyrform scarious

1. aquatica voxer ved Vand, krøger sig ovenpaa, og under Enkel det
bredt paa vorde Dentes. Den har bredt Blad som ikke Fingen og er for
som en Kaff.

2. alpina Det er vant i Finlandet, ellers er en ungt Græs som er
proliferum palæ petala voxer ud til Blade, ja de falder ned og Græs Aarene,
de Kronen Lucid Kuagt mordet i en som fort Commens for der er det
er Dem 40 Græs Dentes i Finlandet som er Dunes Gnuffes. Den er ny Mærd

at faar.
3. 4. 5. trivialis angustifolia og pratensis Trivial og angust: voxer flerre, faa
blad ovenvelk og findes i fugne. Pratensis for mindre Blad, men er ungtvar
Lagt med dem. Trivial: er den stærkeste, dennem og agrestis stolonifera er de
almindeligste Græs i vore fugne. Angustif: findes i Ranaturner den laadne
nye faar paa Bakke: Pratens: er lidet.

6. Annua er lidet, lyser mindre lidet. Den kan dog er fine Spid panicula
naar man gaaer forbi den. Den gjøer ej mange for mere gat til Bunke.

7. Compressa findes paa Bakke og Berg. Den er fast ved sin bedst formindre
lig Stilk, Blomsterne sidde nesten i Ane spica, og Kaltner med de under, dennem
gat at faar paa funs Berg, hvi den fasten forikke til formindre.

8. Nemoralis er sort men mere fugell, i Blomster flere fee og fer al
Græs. Den er ej Blomst ved ~~fad~~ forens.

9. Brica media voxer paa tørre Steder, den faar paa glabretis; men
det er ej uegnet speculation i at faar den lett.

10. Dactylis glomerata findes ej det naar det vel vomere. Den flygter Blan
det med andre Græs i fugner. Derfor ligger i foliation midte i Kommer
ud, snart andre end det med andre Græs. Det er en af de stærkeste Græs, at vil
de faar fugner og den er forgjengs.

11. Cynosurus cristatus Bractea ligger foran Kommer. Den vil flygter i locis no
dis, den voxer orchides voxer. Den for mygg og Blomster blad er høy foran korn,
og gandske tal.

12. Caruleis voxer den voxer er locus aliginosus. Den for faar Blodvanne tal,
men snart tørt. Det er ingen speculation i at faar denner. Den vegner ligger
foran Lichen centrifugus.

13. Festuca ovina for Arch: Linné bragt Jerb. Culmus er obtus, 4 langt
ru man faar voxer paa den. Det faar paa alle sterile Steder, findes 2 a 3 Tommer
høit. Enten og Sæder vegt, foran Stærnen den voxer den faaer. Paa Sydder Sidden er
Gothland er ingen fort Stuall Pun Grænse, den voxer ej den den med denner.
Faar Carls. De findes unger under den Skaft med denner, Foragner foran gaaer
den Blim paa Sinde, at de ikke den over Sidder. Nedne for faaer for under
Arnuner, men Foraarsen Blom Fellen fos den under, med at gaar forog det det.
Men Pun er faar det til for. Den findes fielden i Lob Jord.

14. Rubra Fellens for Ovina allegur med Bredden Blad og rød Øy. Det er
ej fornet ved den, findes paa sterile Steder.

30. Decumbens voxer det vøyner høyt ligger det altid i Kuld. Den er det største og
stør af alle vilde Græs i Sverrige. Den voxer gerner paa sterile Steder,
og blomer høyt naar det staar paa fuchtige Steder.

31. Elata er det lidet Græs for Ensaatenner vil gjøre voxer med Øgne Aarene
for den er mel gibt. Den centerer med aira caespitosa i Skoventer og Gjerd.

32. Fluitans (manna Græs) vexer findes mogent Steder med meget Dybde
den. Er det delicateste for Geder.

33. Bromus secalinus voxer den er ungt i Ligner, paa blomer Stanlen
mørk.

34. mollis er overaarsgræs Sand-Mark og Skovbl.

35. Tectorum voxer findes paa Staver Huse, men Sun paa aller Huus-Tag.
Den Dæmer ny at faar.

36. Giganteus ungt stort. Lidet staar Skov Kra Skov. Den bør staar
paa Sandmul Steder Vinyml ny staar overbygd paa den.

37. Pinnatus voxer den Kommer staar Aprun horizontelt ud, paa
den erecta. Voxer paa sterile Steder og er ny stort mærket paa.

38. Stipa pennata er ny mærket paa.

39. Avena fatua. Naar den kommer i Sæden forøger den sig saa
at paaden det udtrænger. Men den bør ikke paa Agerjorden voxer uden for Kom-
ent, ifø der lignes den i Skaden som dragen den til sig. Den anden Mangel
er, at ny vøxer Sander alner og at faar Korn. Er den ungt for den, som
er det bedst at skjær inden den blomer monden, da den falder ryster
ud den til en Side, da man kan gjøre Faster den som eder den grønner.

40. Elatior er det delicateste for Heste. Det formerer sig stærkt, og
er ungt nøyt

41. Pratensis voxer snart i den Dæler, Sandes og ødlandt Græs paa Kom
Jorder. Den rienerer Sæden og den kommer i Blandt den.

42. Arundo phragmites den bruges at bedekke Tag med. Den er panicula
kommer i Stør Rom men forøger grøet Strøm. Det føyes at om den
Tag kommer i Gjemer, paa blomer men Sør.

43. Epigeios indtil er bedre at faar Skolde med den, ifø Voldene
paa kiøkkenmenes.

44. Calamagrostris for Skofsom Græs. Bør planes med Sider over Sæt
ner, da det grøner ny frisk og ungt Græs, er ramosus, som ny slutter
Græs Sammenhænger er forøvrigt det.

4. Arenaria er det underligste Græs, som maaer skjønne-Sandhede komme i den, som komme den, udgjøre i sine Skoder komme ind og tauche finde ved den Skjønne-Sand, den ødelægger ofte hele øyne i det. Halmen er den under rudskiftet, den maa Korsten stønne i den, som voxer den fig Sand.

72. Calium temulum er annuel og voxer i Korn. Frøkorn gjøre det i Korn. Det i Frø Korn skiem som voxer, de skiner meer som det Kuk. Den og siden Klid. Dunn og Myagrum er det værste Græs i Øyne under øgt Smaaland.

73. Perenne voxer med Agne Anum

74. Elymus arenarius voxer som Sand. Den er Dyster til arundo arenaria. Kjøretøyer ad den ny gjøre.

75. Hordeum murinum voxer ved Veiskiel. Det skiner ligner Korn i den. Er giftig og ulnudig.

76. Triticum repens er det kortredelige Ukraud i Korn, og dog er det det Korn de herligste Græs som ligner, og det skiønneste for Ketnatøyer. De ivinter vorde nytte Agrene efter den Ager. Skorpe de Jorden, men ei for bedre. Boerhave bruger den som Blod renende for gavn, det Frøkl sommerlig Frøn kiemer. Decoctet som den er det blev susceptibelt. Det panicum sanguinale lagde de radix graminis i det Øyder Kunder, men ei er ny kuer.

IV Tetrandria monogynia

1. Sabiosa succisa kaldes det at den bruges i det Form, som er den meer de forunyttige Kræfter til mere Ringe-Blod Skarps; det gjøre meer den vorbuns fin Blomster som vonduns Vinter-Ringe

2. Asperula odorata voxer ved i Øg Kopper, og for nu ovegrunne odoramosiacus. Det meer gjøre det i Sølver som Øer den Skjønne i Skygger. Det bruger det lagde den ringellinen Kledzøne Sommerne bord for at gjøre den ret god Lugt, forresten for at bevare den for Ødelæg, de de ny Kloralen Odor ambrosiacus. Den bør gjøres med Korn, skjem med Øder gaane ny om.

3. Tinctoria voxer Den paa Sorlner i varmeste Grund, og ved i Kollegrund. Kroy er Grundforrenn til de mørke Farvenne, og ved Vød, men ikke. Det Blomster er den er ny allenen for god uden vaer Enlig bonden, som flenen occomer i Sverrige for for Sogl, men Korn skal lagde bliv

Og for allerede i Januar. Det er fuldkommen Urtene, at blomstrende for Urten som
med Stilken er annuelle. Dennes øvrige tykkelighed, og ingen Ranke giver imellem
Dør og Urtene. Blomsten er forunderlig med sine fem petala, ifølge blomsten
er rosen, og med det fem hvid involucrum, ingen Horn med de under blomsten.
Bladene er Blomst med vitis Idea, ikke fore rød, men lyse, vanskelige rød, lav og
noget latua, hvorfor de ikke allerede er fuldt borne. Og mellem i forend for
med Stygge, den Kulde fornemmelse Sand. De vokser ingen i Mordskov og Smalen
nye Steder. Du jeg for Stedet ved som taler de ny Inn Jord.

5. Trapanatans vokser ofte i Indien og Europa, men kun paa Mand i Sverige
er en underlig Urt. Frugten er Stenen som en Valnød og Solds i Venedig Selv
er Skal den, de Halvdele Skrøbe Sammen som under Skalden, for 4 massive Sorger, hvor
i Bord med Fremsiden og ingen tilbagebøjning som et Dukke, ikke Hjelme og Ringe
de Urten lægger ny Skal, ikke vokser op mand en kraftig Stængel, og Stam i superi-
ficies gives Blad, ikke for en fuld petiolus og convex hvor med de Skjed, og med den ligger
det fordi Skalden Skal som et Dukke og forkiedne at den ny Skal flyder op. Stærkere
Stamme ryemptes. Den vokser i Damme og bør skaffes den. Den fuldgar vaskes fem
Saldnøder.

6. Alchemilla vulgaris Stamme Hinderskorgen med mange ogsaa de Blad, at Ruggen
formelig i Skjul Dig Zugnen formele for at tvelte Drusighed skjuende, alle Skal
Stamme fine Sat; de at Dig er sapponacea. De formele alchymister bruger den til
Saldmagerne; men er Colours arles deperdites, som vi lykkelig kan undvære.

Digynia

8. Cuscuta europæa Den som er fundet Stamme og Bine - Ligner, Sag vokser
med Pinede Den. Det er den underligste Urt ogsaa som findes for at bevare
at den ny Sæd mindste Lod, eller Bøjning til at Stamme ind i Sommermaanedene Bøjer
den Frøkl, Ikke coreulum ligger i Frøet, ikke Cotyledones, Spiralt, ikke sjæd,
og fastknuger sig til den den tørre og ikke den Urt. 2. at den ny Sæd 3.
at Frøet den vokser ny den Urt, som Stamme den er ny bidre Vorter, som
under sig fast med den Ende som ny Jord; fører om den forgrener sin Sæd og
udvokser sine Grener. Mange Skøslner Vokser den Sæd den, Stamme
ligger den ikke at Frøet bort Snel Vinkelrette. Sugen bøjer sig mod den,
Den Sæd er nye Snel Sugen - Stamme den. Den udfolder ny Stamme ikke Vokser,
med Stamme Sugen er Stammen, at de ingen Jorden og Bunden om. Underlig
er at den er Dyrene til Cassuta, som ikke alle Sprøfarver ødelægge, Vokser
Stamme big den, men til fructificationen ikke som Vokser, Sag, som
Stand Urt den vokser Sugen den som uno Kraft og qualitates i sig, forat

den falder nu for Kraft, men faaer en den fem den sidder paa. De bruges altsaa en Brød bland den, men den blifver mat. Den underste Linie maae den Commen Inviblomt, da man maae byde om Agnes.

Tetragynia

9. Potamogeton alle den Species ufskabar Fiser

V Pentandria

Monogynia

1. Myosotis scorpioides nu kaldes af Westpaa Forfatter, fuer de under Benaturne paaer den Forbi, men i Norge frest med Kild. Wold blifver den i Calzen lange, glatt Blad, og 4 gange saa store Blomster. Den er nu en de Forhaabligste Urter for Haar, en af paa Vesings Dr. Sød alle Sygdomer for dem ad til Ens de mest nyttige Kaldes
2. Lappula vogser Lim den fuer Inner paa den.
3. Lithspermum arvense er en de almindeligste ager ab blant Weiter Augne, som ingen Landmand vaad fuer som Ful som Kommer. Flere Ord ungelenguster for nu Fugsolder er, at Penud er Eruden i Vaden som paa differente Gyder differente og vised at adskille den. Addener nu vord i den paa ogsaa for de Fugser og vise Woraarne, lagne Fugsier i Helligland den, fyller den Lös i Wand, og gaaer med Andres eller Dunl Kindner paa det at man blier vord.
4. Anchusa officinalis en Upsala bruges Blomsten en Woraarne til Kaal, den gryder Flordnu for den Haaren med fiun 2de Slags Blomster; de den forste Sagen man de snelt vord, og anden Sagen Sieraa.
5. Cynoglossum officinale Lodden bruges paa nogle Steder at Sygs og Kaelt Sotte med Lor Ens.
6. Pulmonaria officinalis vogser i Skygger. Den fuer ligsom Anchusa vodrog Haar Blomster. Den fuer fuer Urter en Woraarne, og finder efter St Hans Dag, skal ej gyde at den er fommen Urt, de Blomster fuer Lond en en Woraarne er fuerder og longer, men efter St Hans Dag Lommer runden Blad en Aarden fuer pri ud om Sommer. Den observation fuer Gmelin fuer in act. petropol. at Urten gryner ennaar Dyr med nogen ordne, er meent for en physicus at efterfor Kiøbenhavn.
7. Symphytum officinale vogser for os gamle Ens, Snes in locis uberatis. Den fuer mener mucilago i sig med nogen ordne. For de Korst til angolik Inneder til Sinnerige Kiel er gier det med Qanel Gagn for Lunde Skrøbnd fraad Det i de Ned er fuger med til fremgynes, fuer Lor Alstromer Kiøbe ud en Wand in loco Natale, som Eilds paa efter paa Gard Wstrad det Sandstrandes en Fudbyggere. Den bagner de Aarden en Borago orientalis, som er en Fremmed Gaarder

og Dunes navnefter Slægt. Ved Decoctet af denne faaer de Svovlgrøn, men
de Dunes af friske i Sommer, saa lægges denne som for ulykkes Sommerfyn-
dab.

70. Asperugo procumbens er en annuel Urt med Ryggskallen og Sparsom. Frugtens
aller vanden Urter om Ring sig.

80. Lycopsis arvensis er ulmindelig Ukrud og paa mange Steder ungt ulæg-
ligt for Korens.

90. Echium vulgare Ingen anden om vegne Blomsten er saa ungegnen for Sinz
ovenfunder og Verbasum. Den som saa den Lube bør saar den paa Sommerlange Bak
lev og tal med Vaynerne, saar den nyallerede prøvet med Lier for blaar Blomsten
men og giver Stadig besøgelige med Dirne ens Gemmeder. Den skal saans Kaar i Ard,
Ved den bærer ny Blomsten for Raam.

100. Primula veris er en af primula ellers for Engelsk den vegnemmer
Ard. Bladene liger til grøn Kaal om Vaarnes Corolla langt i Skrin,
hele i Kommungen refrajcherende, ofenne som Pimpinella. Den Blomm
er den ensfarvelige Lid om Vaarnes.

110. Farinosa Den vælte Sted er Sirlinger. Den er saa smuk, forugde Enlig
for Oeconomer. Den giver Jordmandens tilkende, at det er en verra dum
hala som ikke opbrænge til vegne Eng.

120. Menganthes trifoliata Vesterbothningernes mise er Calla palustris,
men Finnernes mise er Sneer. Det ligger grøns Sted i Syr Eid, men
det skal for at tørres, pulverisere og ikke for valens i Øl. Vegnet Ihlede
Sidne af og de tørres det. Brodet af menganthes blomster langtrækkende
Lugter end af Calla.

130. Lythrum salicaria voxer som som 2de Stifter med Kor-
kerne og gaar en besøgelig Fæ ihe.

140. Anagallis arvensis voxer ungt paa Sæder Ager. Frøet bruges til
Canark Fugler.

150. Azalea procumbens voxer ikke paa Steder som Lyng, Eguen Skiø, og ogsaa
det som bleppet paa Klukes Dale, overdækket med de Skønneste Blomster
Smelle ner Ribbersmede.

160. Convolvulus arvensis, er overde ulmindelige og paa mange Steder ikke
saa mange Urter paa Ager, i Stor Sommer den Blomsten ned ner; Ile den
Sindrejg om Den. Den Ceu ungen Udrydes med Flamme, jo mere
en Jorden er jo bedre er den for den.

170. Sepium kryber op for Ovfagen, og giver Fælles Lysrød med sine store Sneer
Blomster.

16. Campanula rotundifolia Den almindeligste Fremmed for vore Engen, men
paa Sillerhuset blaar Blomsten.
29. Patula voxer paa et par Steder omkring Tahlun i store Mængder, i fler
para viis Egnen.
30. Latifolia Den som hedder om ikke hvide Blomsten, den skal saar Dunsch
Mor vogne Øyen ny.
31. Lonicera periclymenum til gråmer Lysestikke er Dunen ablandt vore indlandske
Vaxter den overtrifter. Den skal Lukt som Citroner. Naar den blomstrer
den ny ungnum Lugt som en Pomeranser eller Citroner
32. Hyoscyamus Saldes Sob og Dræn mand, ikke sudstantia ligger er ikke saand
som Dræn. Grunnen bruges til Vandsnedder og Fiskefaldne. Blomstaller
vore Dyrene til Sakkene i Sotten, saa er ingen som Cuder sig bruge Kiøer, og som
staar under oprent med Dauer, saa det den omrygaarne Ribes alpinum,
vil snesk staar. paa Vor og Høyt Nord.
33. Cærulea som ellers er sjeldnen i Skoveis Sor saant sig paant Nordi Nerike
og Dertra er den Ford til Upsala Botanisk Gaard. Den Kogelen vore Stin
kens ret pel. Grant er ud uforandren ned paa Hyoscyamus. Grunnen
er tod som paa Cornus sanguinea om Vinteren. Dernæst er blaa og
paa Afmagnligen som paa andre Lonicera. Den er formuskelst fin Vinsted
nedun bruges til Ølkes ned den forrige.
34. Verbascum thapsus er den Største Urt i Sverige. Vokser paa de Vorpen Dalen.
I Morgen bruges den mod Ungsot Sob Dræn Vinter Sviken bør forsøges.
35. Nigrum Sor perendal. Den er uomgiengelig for Øyne
36. Daturastrammonium er kom dennefra America. Den Sar ud saant
sig ikke om vinter under Europa Frieden og med Nuxidsing og Strengnäs
37. Hyoscyamus niger Grænsen aden Dueny, og bør et saant, Tidnu i Dufvar
Sor Dauer vokser, Forskiellen, ikke den Lod Ceu i Klagen i Steden for
Forstenelen. Alt ellers hummeret paa Sagen de Symptomer naar den
den. Det sigres at Lodderne forderver Koldne ligger om ledum bør forsøges.
41. Salanum dulcamara bør saans med Geiendes Gaarden og Eiendt Gaard.
42. Rhamnus Cathartícus er et gammel Træ til Sneder, Grimes Sø og 3a
4 Aluer Sohl. Den er mas og fæmina separat om Dræn. Det Dæmer
giøres Dalgrø og Sommer. Det ungsten Sved er den Lagrede Blim til
fuldrøde. Grain d'avignon er en sort Rhamnus, og ikke fallor cathartícus.

37. Heracleum sphondylium som de kalder i Apotequet for Brancaursa
i Siberien falder de Hvilkuer, Leggner dem para Kjøgner under Lagat hvor
de der selver sig legger som Træn pro para alle Dyr. Dette kaarn de ogsaa
det er meet Hvilkuer, og bruger de meget i Siberien. De bruger og at kaar
det Vand dem og la der det gaar hvoraa de Distillerer det Brandevin.
Phalæna Heracleana er det nuuer som finder Archialen af faar Sver
ogsaa dem, de lyder med i Hvilkuer.

33. Angelica archangelica Den voxer meest i Lapp. Finlaar det med Dalen,
og er Roden for Kjøkkig som de finder i Forgaarer. Lapp Drengner kommer
aldrig igjen med sine Annuer udem de faar ze Dame ogsaa Hvilkuer. Den
gjøre vond Kragner de ogsaa sig, og de Hvilkuer som Ulver.

34. Oenanthe fistulosa er ligesom alle umbellatæ aquaticæ giftig, og faar baad
Kvæg og Menneskes ved Lemt til med den

20. Erotica er meed giftigner end den forrige

35. Phellandrium aquaticum Dette er Skalsmuus Hvilsfrøfler af for
dem naar den faar liggent oppe Hvilsmuus, og Pulpa er bortraadt de
det er ud som en Fisk Lugt.

36. Cicuta virosa er de gamles cicuta som de brugte formed Arsenicum
blev ofrendt. Den er meeget giftig og Socrates gav Hvilsen Hepke
ris Saft drommt. Dette faar alle ved Lemt til med at ligge den Lod.

37. Athusa Cynapium Oldrig ingent i Sommer for Insekter voxer. Boer
haave faar mange Exempler para den som Ild er ogsaa. Jeg har dem og
para ogsaa.

38. Scandix cerefolium Kjøkkuel voxer bidt i Skaane ligesom ved. er god
i Sallade, i der for den som den disponerede til Lugt fol. Dyr ogsaa
meeter Bøxter og Hvoxen. Den dem faarn 2 Gange om Aaret

39. Chærophyllum sylvestre almindelig med Gjærder, men aldrig udmyra
land Enger. Jer nogle Dræfinder fandt meen og i Sverige af Dræ
gravet og brendt med den. Den grønner Sommer Kjøkkuen. Dørfarven
blev klaarer end den.

40. Pastinaca sativa Ved den bor nylagnes op om Høsten, men bor
faar til Vaarmed de blier mere eeter

41. Carum carvi voxer ovenvalt med Egner Agnen. fuldtig kjøkkuen
med Lund, Ellen aldrig braden af Lund bliver fig ogsaa Gravet med med
af faar Dyr. De den falder i Carlscrona. Hvalmer vord den op i Engener,
Roden er meet ligesom god om nybraden med Jordmaden. I England faar
den i Gamer.

42. Apium graveolens en giftig Urt naar den voxer vildt in solo natali, som altid er ond Kildent jo körner den foraarsag jo földer blir den. Allesom nogen Tid faar kreuding ovr Slag, epilepsi eller nogen andre nervsygdom, bör vogte sig for denne.

43. Aegopodium podagraria er ingen dil grön Kaal. fu den recommenderet plante den, men selve med Hanne paa foraars den altid udgiver. Lidt urgent ovr foraarsmaanen er i sommer.

Triggynia

44. Viburnum opulus er en foraarsmand Kaal den bör altid staar paa sugtigt Sted for fuldt Cymas med storm sterile Blomster in ambitu, naar gelle Stormen blomm sterile Balls til Dunbolder. Den lader ny gröder sig til Aar.

45. Sambucus nigra voxer i Haane. Den ene fanner ender den Slygge, foraarsomd Verd ligesom ender Vaadnödder Aar. Den for lover Vaarn. I en Kjelder Qvistenur nen ulyge som Kort, Spille bruger at stikker i Sybe Foraar paa den ny Stal lagre. Det er et giftig Aar. Fuglen og Ænder Aar den Aar.

46. Ebulus paa lig den lovegr, at den ny Skellen under med den Aarlige Grönne og Skilden yderen Dom i Funs Aar. I Calmar bruger de at bygge den i Ba den, men Kvaldurner ny Salmen ledne.

46. Alsine media Det Fuldmagt Vetrud i Sommer. Det foraar fy allestuds. Gror Fold Land urinen den Dörr under Vegten med Dum ny. Det Dum Dom mere Folde Bunds 14 Dage Dunnuds.

Tetraggynia

47. Parnassia palustris en lidn fuld Urt forundrelse fuer nectarer voxer altid in locis uliginosis.

Pentaggynia

48. Statice armeria med Foraarsblomster under og Dundbolder. I Holland for de fuldt parterrene bedaldnes med den, de den fuer gregtig under den Blomster.

49. Drosera longifolia og rotundifolia den nogen varietete. Ernährlig er at foliat ionen er en paa silices, og spica gummer Gelyd. I Spica Aaren en Blommer Lyn Dyr. Blomster for foraar i Oudendsen og paa nur Sudden Spille udfile en Vaadder fom foraar mord i Sydens Domiken, bigr fom Koridula i Africa. Blumen kriner for Dörr naar Dynner nur Grukur.

VI Hexandria

Monogynia

1. Allium ursinum har blad som liljeens og voxer paa faar Steder. Den har privelegium exclusivum, den skyder den op om foraaret under Skiærbærret. De lange smalle og rund den lugt ni som ovenfor Log. Den falder Lugt paa Hænder og Dinor. Det siges at den fordriver Vildtvarme. Det er lækkert at den bortjager Ormer.

2. Scorodoprasium er saa navnflagt med Kollen-Bold, at man kan kun sige Snøl paa den.

3. Oleraceum vokser ungt i Engene paa Vallen. Den bruges ogsaa ved andre Medicin.

4. Schoenoprasum er det samme som Gras-Løg, vokser paa de allerbørnsfer Steder. Bladene som unge Løb kaldes Kallen. Bruges og ikke at give den Smer i Jerfondue Vallen ainallenei Gresinner.

5. Tulipa sylvestris Ikke ikke Kjendskjemgen er, o. Filamenta ujevne lil nen Lidur. Naar de kommer i nie saar saa forøger de sig ikke big. De lugter knurlig mel, og kan kaldes Ko-Ærunderhs.

6. Ornithogalum luteum Kommer tidlig om Vaaren frem i Kaal-Engene. Dens Løg er stor som en Stor Valnød og kan ædes.

7. Anthericum ossifragum vokser paa Vidanen Steder Stor Lant Gras er. Det bruuner blim Blomster Den er ny Grund. Naar Kmal Kmer ædes den saa saaner de hectique. Saar kan ny Sowns Ind den vokser, ikke at den Engnoind. Den har en bran Lugt, Fælles tillaind gimer at den Ser ugnt virulenti fig.

8. Asparagus officinalis vokser vild i flyer Steder.

9. Convallaria majalis Blomsterne lugter, meget ny gefligt. Det morbis nervorum bruges Brændvin af den.

10. Polygonatum vokser i Klippemur i Syd Ind for de vaalnt Vilanlan Kaldes en

11. Acorus Calamus vokser ved Dens som iris Gras er lik Vand. Naar man gnuger Bladene saa lugter de refraichant men midnu menen Lakke. Den Langsider sommer dimnsk som Jugnder.

12. Juncus conglomeratus i Kaalmyr paa Vestyen. Saar den Gran er vist Vand under. Vilaarne bruges til Lampen.

13. Berberis vulgaris er Ærs som i Gamen Tider for Grant jus civitatis Sobes kommer fra Africa. Det var ny Navn Sob Romerne. Saagnen ny de Kaldes som Kal kommer nogle Ord: Blomsten har 6 petala, og Bunden med Grind petalum 2 gange, som føle ud Sommeing Naar den vokser Ind under end Den saa bruger Filamenta fig, Staar lid og Kaster pollen fra fig. Den er yppenlig lil Fellen. Bærnet er ungt Gum. Dens Vand er det bedste i Sesfigr Febrer. Grant er gult som om det var tingeret med Safran.

Trigynia

10. Rumex aquaticus har i sandhuler ved havet blomst blomu ovenfra kraft til at curere sindsyge Mennesker, Colden beretter Arch: v. Linné at de Wilde bruge at drikke decocten af Roden hver Dag og at lægge den flydt paa Brynet.

2. Acetosa den Ægte og Spanske Syrenu nu varieteter. Den i Langsk Sidelen er den formuer differere Mul til Vortilsen.

3. Triglochin maritimum Skaar mere vil have Oens end Land, saa Fol gaar selv hernaadenner paa det Land hvor denne gror, saa de derom bliver ungt frid.

VII Heptandria

Monogynia

1. Trientalis Europæa er ungt smuk i Blomst og fleirle Steder. Engner med til Leipsig gaarne den ikke.

VIII Octandria

Monogynia

1. Epilobium angustifolium Den øverste af den er vore vilde Urter, fran-nuel med Roden, med Stilken Den Ryber ungt, som er insipid, og kan bruges til brød i Syd Lid.

2. Vaccinium uliginosum vokser ville in locis uliginosis, og der terra damnata er. Den er vor i Øyden Snedker.

2. Myrtillus i det Blom. paa marmel ved Veje paa fedt Land.

3. Vitis Idæa paa de Norske Steder. Den er Lappernes Kappa-Kermes. Den med Frid Det voxer ved Torneå Jer behagelig Det.

4. Oxycoccos Jer Sumpen og Moser Det ned Kraver.

5. Erica vulgaris Den al mindelige Ærte Norden, som Boenderne brænd Det forgaar Verden. Vortdrivens paa formuer Mærvid som Mose med Stenotation, om man medfrengner nu Mærk hver Dumr vogner, og Ender Det gaar og de Dr, saa Vortrivens Den og Blevne Derav Den bedste Ting. Den man filler nu Mærk saa er Brøvent med Ting under Mond saa Vortrivens Den ogsaa, ligt Lende om man gaarne paa Det, nemlig naar Kulden gaarne om Jorden. Den Dem oldrig Skaar under nogen Bog. Det er Mærdet allerforste Hvorlom er Ting vogner paa Det, som Gothland og Øland. Den er Jo et Dagen mest af sin Jordning om Dyr, hvorom Den og Blev er Dem, men hvor ingen Ting vogner blivne Den Jord.

4. Daphne mezereum er Ægte Ærter som vogner i Skygger, Det med Ringes Lødner. Det er den Ærter som blomstrer om Mordrum, og de rød Blomster staar efter igen naar Dunn. Vaarner er ny Skygger

uden kinnene for skarp at den giør inflammation i halsen, og kiæverne, naar man lygger paa den med uden nye vunder med ild brænde, hvor den faar det Wonder Kentker-salb, man bør dryppe et par Draaber Smudsvand paa den, de den gaaer bort. Imod ormekrig fry drukne Dyr for den nye fem ligr, men den giør ondt.

Triggnia

5o Polygonum aviculare vokser paa Veyner og i Dygnes er annual. Er den noget lig at faar bort om Gangen i Sommer. Den Frør for formaar Fugle og Dyrende Kvæg som Dogmid, men for maar at de med den kiøer for Dræbner dem, man faar maar Fugler Dyr og Fod fremgir paa Veynene og fuller det Dogmid.

2. Viviparum vokser at voxe ingen paa sterile Bakker og fugne i Norland. Lidt der nu Samojedernes mange vegetabilske Sæder, og den som den faar det mange Dyr for dette Dræt Vegt. Dræt er og den for mange Dræsvegt.

3o Amphibium Blomster den lægges til grøn Kaal.

4o et 5o Persicaria og hydropiper (Jomfrur Ærvel paa Ennuf) Frøne kommer gnuggen om Aftenen til Ryfigt mod Vrelen for at faar den grønser Sud bort, det skinner nye ved Vander som Ild. Sommeren lagr aqua Persicariæ, som dogne gnugen. Det er besynderligt nu for skiffig og skarp Urt, som Hydropiper kal bortlage den uslotsed i Munden naar man lygger den naar man lygger den, man skulde laver at den giør ond. Ennu en dobbelt skiller det dog nye grøn.

6o Convolvulus paa Dygnes voxagtig Gang det besvarlige Ugres.

7o Fagopyrum (Kallnøfter Vsaluridn kaner til Skyldig paa Ingbrænd mogt ondt, for de udøm den fgnukkad at den nye lyngen. Som bogmid af dalen mogt kald, uden mister sin blad vnskønner Kulde, og det lygn nye kaar frans ind i Upland, er det undrligt at Sollnye fagner Siberisk Bogmid, som er ligr for Korn til Frør, ligr for fuagnlig, og ford ligr til Jorder Vegtner, at man nye kan skiller den uden vnd fructificationer.

Tetragynia

8o Paris quadrifolia er undrlig Urt, ikke under Europæiske, vokser kug i skugner i Klygger, og er den undrligste ved det at dugne vand nutnu den nygiftig eller nif.

9. Adoxa moschatellina er ufølig Urt for dog privilegium exclusivum, som ficaria, at den skulde under Vaxter.

X Decandria

Monogynia

1o monotropa Hypopithys er undrlig Vegt som hvid og sollden er lyo gnid

uren indtagt altid fort. Den kan aldrig voxe udenfor Lofdrum og Fuur eller
Sten, fordi jeg paa Lofdrum med et Quarteer ikke forstod.

21. Ledum palustre Nordens specielle Gulst. Det er blank ad den nye Lovgivelse forenet,
som foran omgivet med fine Blomsterne, den skal udvendig voxe i Vestlyn
og der for Ostindien voxe. Den fand i Apotequet for Aldt den ros marinus
silvestris som med fint paa Bordrum, men aldrig lugtet den, Øsbrum fand den
den undtagt allenu at giøre Øyl. Lade, indtil Ingen Tvivl
om Siberien 1720. Skiller sandt Lærdt at Ladet smuggles med Øl og der er Lerk Vidner
Selv vaglet blev indtagt af det Danske Lade for gott som det Øyl, indtil Ingen lærdt
at man brug Øl-Olien Distillerede for og Ledum tillegges. Den fand for i Øyl indtagt
Gud ikke prestere Øyl-Indre, Ifi Ledum voxer der ny. Kiøbstæd Guld vart
Guldt som Koggen. Medici for forfølt udaliige medicamenter Dr. mod. Judic
arch: Linné lærdt i Vester Gothland at bruge Decocket af Ledum, og giøre det
det bekant. Det er nu et specificum, som aldrig skaar Skyl paa Voldens Dom
Vesl: for fordanner som ny for udlig at gaar ondt for Dvergnes Øyld og der man
lad den drikke likfrakenlig Decoct. Iforiger Lade fornud man fik Sukker,
brugte det Storgs Tors til Dl., men Forsøg var myrica gale som foraarsagede
det Sand-Øyl uny som Dem var priviligeredgjøngne Tør, for udvendes
en fordiger at bruge Ledum, skiller giør udvendt Farven Sand-Øyl,
Ifi den er paa det Øyrest indrøm. Naar Fæster allen Øyr for Øyes bruges
Decoctet at kvæle den ud.

22. Andromeda Flere species som den udgiøre pluralitetet af Øyl er paa fal
den. Jeg vidende Dem om at voxe ny for anlagt Cultur om Foraar Fenlder,
som altid kvisme paa Torn Ender som nye Øyl, den Blom, man finder ny
det kaldes Calmia, som er for ude Lagt ind Angromeda, og er det gifftig
for Faar, jeg for jeg Dem forfølgen Foraar ny Lam kvisme det ifi Calder i
Yorx og Clagton i Virginien kvisse af Faar ny Lam naar Dem Dem er

23. Arbutus uva ursi Foraar Dennes er ogsaa uvarnet, at giøre Øyl Lam kvisse
den udi Lichen islandicus, den fødte Kal for er andre Snit (Sc. alpina) den for
Blomst. Sverrige Foraar ny til Forekenlig Tildanger paa Fer-Bord, kvisse den under
for man at Entzun figer som Dem Blader, som er i varmer for Grad Septica
ost Flem. Til Jackaskapuck fordes ind Hinder Stibe Ladninger med 1740 fra
America til England og blandes med Cobal, som et for Dem Dalige Kiøbmænd
vil corroborere Tout Kiøbt med prøven som Lebrung, skiller ellers Øyl
Svage om Cobalt Øgnede, skiller tørgs om Dem, men fødte ni fand det fole
vilde ingen bruge det.

5. Pyrola uniflora er Norske for lentos at bruge Bladene for sure Øyne, ellers at lægge grønne Blade på øyne om Natten og ner det for ligt. agerpora forme er Ivaard, som hedera isoniana eller. Eller i det genus foliis semperverentibus.

Digynia

6. Chrysosplenium alternifolium er en usøy por under Bredende for Kilde-Vandene.

7. Saxifraga alle den arts og lægns forgyldte Boral. Hvor den bemøyfig med at fer para Blomsterne, som bedre nå para mares secundere sammenføre dog.

8. Gypsophila fastigiata er nu kun i Sjælland en Sandbunke i Kall. Herred Skum Blomster som er fra mat flagt med gypsophila Spirthum, er sømer grøn og den bruges i Medic. for Øjne, som er for mangt mere mærkelig siden den nyder fult Sunds. Den magnesiende at Erbiddelig, bilad precavere Blomen i Mennesker Tem, para mere det vam Skumb dad, som den indtager i quantitet, og totalt fordrive alt Slimfe ingen Slim generere, uden Slim først samlet i Øyne og Næse.

9. Schleranthus perennis den anden Coccus polonicus samler para Øerne over Skuen i Polen, siges Sæden i Syrbarsind og Sydvangaarn Coccionel

10. Dianthus superbus er den pragtigste Nelliker, para nelkefin Blomsing, Skeden er ildform den mere tredelt, som kelsein Kugl i Smukke Skuvangaarn Klingelden i Form, lugten glemlest med Aftenuren.

11. Arenarius Vaxen mere ensøy, para Sandsletterne i Maane om Natten, dyktens mere lugt som at faar ung Tre avnen Sortenflig augnum ligt, som den som er i Orangerier mere Pomeranter vogner, ringen Kulde gjøraat det mere Skum bliver, som for ingen Nidt.

Trigynia

12. Cucubalus acaulis Stamm og azalea procumbens Ligger i Sjælland Skovene Rydning, Sinn og nu Blomst i Udragne ofte Blomster quadrat Blomst, med Sandelle rødt Blomster.

13. Arenaria rubra er den filmste Dorlæsner, som ikke mere end Kolade Svanlost til Klokken 8½ aaben den fry, og om Aftenen indagnen 2½.

Pentagynia.

13. Sedum rupestre ads. und Mur og faldile og Lolds i Holland Tripmadam.

2º Acre smager ildeles som persicaria hydropiper. Dens Blomster siddes ædru Blomstrenes Kronner solstikium; Blomsterne Kronner staar gulr fraa 14 Dagenes og vnder paa den Dagen, iden at crabur sig, men den Dagen crabur de sig.

14. Lychnis viscaria som oscum omkring Landeveie, at Skyerne ny flor gaar i Blomstring.

15. Spergula arvensis har begynd at faar sig paa Smilende Agrene. Lifbrenfarer bruges den til Feber. Det er nu Vrak, fordi Smaalen ødelæger forgaanz alle Korn Agrene og Eiru Agrene. Blom de har Lorlan mig, som forst observeede Sporte Skordlaudner, stor nogle faar de Dadlet med sorte Skrouden nu Smilleu som oftest forindrinnes. De Spergula allenu flordigenu Smillen bestaar og begynde Brodan Skiver.

XI Dodecandria

Monogynia

1º Asarum Europæum er varig Apoteguer Urt for Vomeliv og purgation for Folk paa Landet bor alle Steder i Skyer

2º Lythrum salicaria nu er de ildrøde Urter som langplanteder er forundt fiur smukke Blomster.

Trigynia

3º Reseda luteola Den aller allerigeligste Urt til gult Farve paa Vmuk uniformer. Roten gaar langt forlanes gult Farved Blad: Kyne paa dages de grønne og. Den er det nødvendigste Farve-Urt, og belønner meest Skrøderen. Blomsterne staar den paa lab og lenge Stand, som ligner sønt, ildelugtig og nogenlunde succulent, og det paa spidsen af Stenen, mellem Korn Kronen Den Kronen, og snart om Stenen optages, da den unst faar sig selv paa fauer Stad. Taalnugr Agent nuden ny for blom uent bedre det, og ved ophalt som Blomsterne Kronen fanen. Agent mnuder sig nelen Dølnu og uidt paa Mellem med Norden. Smaatiernur bliver fly ny om at ad den.

4º Euphorbia heliosopia og Replus er annuelle, men palustris perennis Jugen fundsoldem bor forskrim Sporter Stænk saa langt forefar Euphorbia

Stilkene og den paa hvilke gibt forneden Vidjekiring, Frøhuitinder som i nu Jorden vil blive vel brugelige, dyppes i vegla Drabet i Stilkene og hvorpaa den Kindsen, uden Silbørnyssen ofte vande vil udvige at fra ud fra Kiirlingen.

Polygynia

5. Sempervivum tectorum bruges almindelig i Smaalen og planteres Jorden Tag de den bedekker Huse Taget, forfinden Vinter og Sommer nat vinter bort Jorden, de forderfet den norm Huse 100 Aar. Det Kalder Hexeur og lygger paa omuld Dør ne det beste. Flerrige Lidne de prodatiorei Kilde om gjøres medgivnede Jnru i Stilkenens presence, Lade de den som vilde Kilder at beskiger Sindsyne med Dæslen Dyrs

XII Dodecandria

Monogynia

1. Prunus avium er i Sommer Lidne blomster i udlandet i Sverige. Blomsterne som nu ser. I Januar Maal Sommer Kirsebær gjøres. og nye i ordinaire Kirsebær, ellers blomster Januar Dyl.

2. Padus voxer nye i hele Europa, det smukkeste om Vaarene med sine hvide Sprøde Blomster, som lugter vingemand, men Lukt om Natten med Dårlige Blad. Lredt er det at gjøre og Skiver, i der naar det er grønt, hvoraf de beste Lø. er Kiellne grønne, ovenfor mørt og nulle Skidgrønne de beste Cobalto Ziber-Blaat.

3. Spiræa vegodtil Sellen, den hvor Jorden Lofens og i Tigner, Ifeden Lippen med Sæner gemmen fig, men Lostvadrigt med det Krybende, hvor den nye Tigner paa Inger Sidder

Digynia

2. Cratægus aria Den mere patria er omkring sinus bothnicus og i Norge, findt ubekant Linger i Sjælen med Sverige vilde, men ligner det Ingt med Aaen, men Lærnen er sort og noslen latum, blomster meenger Lynud Frøsten Kommen. De forraarsager menen platus med omuden Kriegter, er det er Jorsog mingt Haard, hvorfor det bruges til at fælligt Skaftes, hvor det bruges de gamle Kinger. Den bemer ny Kriegt Sinnet Aar, men Sinnet ouden Aar.

2. Oxyacantha er den beste Dæsen til Sellen. Den voxer snart Frøner ligger 2de Aar i Jorden. Sellen Hesten mingt Skiv og Haard, lat, om Bugbøiet, om

den varighed klappes. Den bør saaer paa ordnet Fald om den skal vaere mulig om
exponeret for blæst, jo bedre. Den krøber ny. Lignum er gummilog som Ozgiantka
det bruges til Vogns Ogler.

Trigynia

1. Sorbus aucuparia Den er bør aldrig plantes i alleer, skal vaere blive noget gamle
stor uden nogen vaerdi Grønn. Det lader ny Digger sig, vaeksen ner de snuckeliger
Kuller til bord, Lørdsnirer ner som maker, tienen til Kurvfaetner, og andre blive
under glatte og skrinnede.

Pentagynia

1. Pyrus communis Vilde Pærer, ner taggige som Sorr- Torn. Frugten kienoktier til
Eder. er ret ner gandske forvent og laeder Polere sig
2. malus Tuer, Æbler. Den pen vil er nuer formuekligt ombygger nu Frugtsorter af
Æbler og Pærer, skal forse Kaster sig Kriniker af dette Ed. De bør paa gode Steder, ellers
gaver de ny og uset Dommen; skal de skal udmuldig bygger nu Dreiner i forden ingen
gror, ligger som Aske og Kul. Den skarpe Udvaekstighed Skyldes Ordnen mistorretris,
under Stok ot Koldes Vestuldsorve, skiellen skaller Bortenen af Lørdsnen, saa at den bedste
Frugtsorter, kan paa nu Dieneet Stillegges, Kirsebærtraerne og Æblerne ner gjuende ikke
ner Vestuldsorpen Den aldrig. Naar man krøber Eremsfra Hollandsigte de ofte bort
nem aldrig de som ner gjuende i disse Eremsfra Sværformeldiendelighed, ved nu delicat Frugt
faer Blomm gjuende skal blive Endnen i ner Ende af Grund.
3. mespilus cotoneaster om ner som Kalvenlegges paa Vaekker med Æbelsurugne, som
Æbler med broede Stikker, de Eremsfra man gjuende ved som de ned Kuer, skal
for dort. Frugten bliver finlide ovenn Æbler, men Lørdsæbler Æbler.
4. Spiraea filipendula Lørdsen kan ikke i Syd Lid. I Skov omgivnen den er ment fuer
Kiøkken, skader den dog fugten, skal Dreinnen vaere ofte den Lørdsen.
5. Ulmaria i Sverige bruges ved Øreen Blomster paa Julen og Høytids Dage, da
de retraichere Luften. Jeg med nyom nogen Kiendtegn ikke den, men ner
ved Grenen Smes Øvrige delicat ner. Ofte som man ved Øre og Kom for
og dod fugten, men Kuer Flugen, igen.

Polygynia

7. Rosa canina er Kuud med fuer Kroner Blomster den Skov den voxer uegnet
Kuer ny til Hekker ved Kuer, men med blomster nordenden. Den bør altid Kortes
ner ovenen. Vilden Lands brugen og Frugten til Suppe.

9. Rubus fruticosa vokser som buske ellers den findes blomster mellem Bladene og Stammens Dele. Af denne Frugten indsamles den Skovbærs Saft som i Apotekerne bruges som en Dryk.

10. Casius er et særligt Træ i Ægypten; det Træ er ikke fra Frøet af Blomsten men af Blomsten.

11. Bous vokser hele paa steile Bakker og Dannes Høyder. Dette bærer ingen Frugt, men under Barken og de Blade den. Blomsten grønne og Bærene, hvilke er larver og som nedlægger nyttige Bladene.

12. Nazatilis dette er ny planet

13. Arcticus er en annuel Urt, folia ternata langs Hvidlebay, og blod røde blomster, hvilke i paa samme Urt. Den vokser ved Torno, Kamscatcha og Hudsons bay, ellers den er over Verden Poel ticulen, Ægnes globen. Bærene er nu ny, de ungnumaste Frugter Europa, baade for sin Lugt og for sin Smag. Vaaben lagen paa vores Vejen, den er meget om Vagnen og Kold om Vinteren. Den kan let planteres ellers at ingen Holder Kulden, til den de Ikke for Ægnet ud. Hvilket Blomsterne om man bruger ikke og Fødsen, naar Fuldene er Ømtaalende i Jorden, Klimaet med Vinter, ellers bruger Ikke det, lag. er og Dem paa om Vinterne Hvilken er ingen og med Vand at Snublinger bliver, og Indvendige paa Drom-Ales. Men forudsen Ikke mere Frugten paa de Haver byger. Af Blomsten lykker Hvorved de kan forøges. Paa Vinter falder den delicateste Blygger. Men den lykker Hvorved de kan forøges. Paa Vinter falder den delicateste Mag med den.

14. Chamæmorus kan ingen planteres i vogne Jorden. De vokser kun paa de mosser Mosser om Sphagnum, hvor Jorden altid er ny lugtig. Den med Patria er Lapmoselnd. Jugen Frugt er meget humectans og fuldere for scorbutici, og den fem om obstructioner i viscera. Lappernes bruger at lægge den i Dunne for de conservere sig.

15. Fragaria vesca Den er en 2de Slag, som er meget ungt bliver. De ordinaire blomster Bæsk paa Stængler Lund, det under Slag vokser det Vejen, paa den er et Fil med Frugt Stor. Det er receptaculum succulentum og ny bacca. Men kan paa den let om Frøene, i Sommer bør de planteres i Haven for d. vaar de er op vokser for de Vinter.

16. Chiloensis er Chili i America, er meget stor, og har Frugt store som Blomster meget smagende de blander.

17. Potentilla fruticosa vokser Øen i York, paa Olands Vestre side, og paa et

Stadt: Siberien. Altsaa den varmste Dagt. Altid paa Dunsnor og Sand
omkring. Kongeaarens i Sommer til Juraan Fallen af ½ Alnes Høyde. Den blomer
i August und millioner Blomster.

2. Anserina visner om Jordforaarsnatten, ikke den er allerede grøn, men faaer snart blad
om den Blomen den Snor Enden er Rødbrun og den er vel Dagtaar efter
Juuns Mid. Snor den vopner sig man er langt efter Maand.

3. Reptans vopner kun den Snor Enden

4. Tormentilla erecta paa Tørve Mol den barde fil Ligner med Juuns Mid.

5. Geum urbanum Aegte Ligner som Mellem, den Mol lagns opom Moren
uden den gaarer i Skiel, ikke finden forloren den sin Lugt. Den gjøm Engen
Mid: Albedt Solder det sig ned Mørund bugner fra Byen ned allerede

6. Rivale vopner in locis damnatis allen aliquotis snoyingen omden vil
voer, den Grundner er vist Ørts Jord

7. Dryas octopetala saa om den smukkeste Blomster, som er i Sinlichen, skal
blomstre i Grønlands Jorden Blygger.

8. Comarum palustre Aadle Jorden vild uden Farmen er trist

XIII Polyandria Monogynia

1. Actæspicata er giftig, som det forstaaer om den Gnuner Lugt, forfar
der, og Clasen polyandria. Drugner for ofte den Barner blomst Briargolur
som vilde Dyr Sporer den for paa Stormen.

2. Chelidonium majus gulde Fallenpaa, er nu om den beste mod Øingesygen,
og er om den beste opskrifter mod Skrufoen. Juor Funer Øyen med Farven
ud, men snider forskrækkelig

3. Papaveres gryde ollner Øgenar

4. Nymphea lutea giver en remarquabel nota paa Vandets Jord,
den forste Blad vist sig flydende paa Vandet. Farven Øllaigner for
vinds om Aaden vinds paa Aiml Jnn, blomst und gulder Blodgibel
Mell da den bides protrept.

5. Alba er nu om vorn den ukkeste Blomster Sobel om Naturen. Blom
lenner er nu om den Silkeste at determinere Enum, ikke den aabnin sig
Kl: 7 og lukker sig Kl: 4.

6. Tilia Europæa er om de 4 Storm Ærens som Lader Bigger sig, og forder

og Gras-Dækning. Naar Kuglerne gjøre den nu Ligt og æbne som Pomeranter. Frøene bliver da klar ud i Sporsom det bruges om Bille-Skuggner. Hvilke gaarne ødelægger i det. Blomsterne giøre helt Sorte for Æsner. Det grøne kjøbenhavn giør. Gil Stikke-Kan Kunne det ikke, efe det giøre nu øjeblikkelig paa Stikken, Stikken og Blomster umuelig vaade Konner eller Blomster. Saaledes som Polen dragne ungt og Kuer, ~~nu~~ den er ond Sæd uden om Skadelige Slægt.

Trigynia
consolida

6. Delphinium præcis Dæcker-Lugnen uden forskelig for Landmandne Hvor den vopner for ungnet.

7. aconitum lycoctonum vopner i Skoger, med Sodne Bøkke Elmer, og Tørr Sodne med Kuulne Mælk eller Sand Sodne Blomster. Lues og Daglinus.

Pentagynia

8. Aquilegia vulgaris nu fun ved ubrugelig Blomster, uden giftig og ræmmes Ligt med aconitum. Dem apotegueve giver al fun Synipus violarum Skuddar, der Sikkert bærer Skaffne, uden Lugnen medicus kan overbevise den Skoog, da de falder Ligt paa den med pulvis Jreos florentina. Med Blomster Kronner er Skaal Skidel, uden Frøene maa i dosi paa Kosten det Ernt.

Hexagynia

9. Stratiotes aloides er den nuuser palme som vopner i Europa, under Vand, Blomster Kast sig med Ærgerlige Kolder, paa en basis planta er Kostende Grønne. En som Lest Kaar Kraan Lugnen Hvor Mandel Skaager og Elmen ovver Kogende Blomster Lugnen Kaaren paa ovenen af Kuer. De som saar Lyst til polypper finder aldrig Dem Brulal af species med paa Skaane Blad.

Polygynia

10. anemone hepatica paa ingen Ært Kaarder fens tilbøjelige Kaarnes Blomster med paa Kuer, Hvem man oarbeiner gemma radicis under Kordu Augusti Maaned paa den uden fen baad petala, stamina og pistil, og ligger under folia. formerede lil naser Kraz.

Pulsatilla naar den blomsterne Skiggne uden ud Sæsner

Vernalis er en de reinste Vinglner i Europa almindelig i Skoger

Nemorosa er Skidelig Dæckfor pecora, som nyland Botaniquen, Hvem som nu opladd uidskiemmelse Kuer, som den ikke, uden fremmerude Forskab

ved den og der som skiner, ligesom med aconitum.

11. Thalictrum flavum vexer paa vaade steder som Kobenhavns gadeskiel.

12. Adonis vernalis prydes saaledes ved Vaarens mere end halvanden Aarhundrede.

13. Ranunculus flammula maa undgaaes ny for dette rubefacientia hvor den vexer, thi naar den ligger paa nogen steed ved kroppen fremkalder den meget inflamation med Vand.

14. Ficaria har privilegium exclusivum paa alle steder, foruden Urtica dioica, Hvilket kan lægges til grøn Kaal, skiønt den er farlig paa forgaaede steder som Rogvirigner.

15. Aconitifolius almindelig og skiønt de prydeligste steder i haverne.

16. Scleratus nu uforgaeligt Udkast for Vestlandske Jugger, som dennes lagerskibe ere Vrunner, ellers sommelig, at de kan faa ny Liv ved denne lagnede 1ste Jugne.

17. et 18. Acris et Tuberosus almindelig paa Engene. Hvor Kreaturer ere, vokser ikke andet end Tæsmer de, som ikke gaaer Blomsterne op og ere giftige, at den ny skal faa ødt ud. Om Vaaren lillelille den faar Blomster.

19. Aquatilis hvor den vexer i Vand, plejer Fiskene ingen at opholde sig selv ved, Vandfuglene saae at dens Blomsterne paa mange Insecter den til Føde.

20. Trollius Europæus Den smukkeste Blomsten blev blom sagt af Alle. Den bruger at Herder Blomsterne paa Gulvet, den trinde ovenflade i lagde Tenlder, Laaden og Ennesord, men forøver Bygger og Fugtighed.

21. Caltha palustris almindelig ved Vaarens i Kiær, hvor meget Vand er og kiøl-Vand. Da den Blomsten fegnes i Sverrige at Konigaarn i Ener Vestfinden, thi de blomme Vaarens gaaer, men Kornen ikke Vaaren. Blomsterne faaeder Kvæg de Haar at bringes i Sindet for Capriser. Den er i naermere Slegt med Helleborus og allerede giftig. Den med Capris er ogsaa giftig men Frøene ere ikke dette.

XIV Didynamia
Gymnospermia

1. Aiuga pyramidalis findes ny i Tyder Landene, og ulig alle de andre at den representerer en 4 kantig Pyramide. Naar den begynder at blomstre blomme Vaarens gaaer ved Vaaren. Vokser paa in glaretis

2. Teucrium scordium er almindelig apotegaer Urt, vokser paa paa Gothland paa Eng og de Steder fugtige, just med Carex cæspitosa i Sønderjylland

som oftest bort for Apotequerne om Vinteren, skiønt ny imitere lorum naturalem
det er beqvemelig at den som Teucrium, og alliaria som Erysimum, dersom al-
ler formuer Lugt som Løg, Buurnt og Vitterlen Lugter af Løg der snor sig vogne
3o. mentha arvensis udmærker paa mange Steder Agrene med sin Vitnelse. Mentha
lugter med Vitnelse, gior at den ny coagulerer sig, eller med Løg kan blive til Sy.
Vinder Fuglrøver trøn af Vitnelsen er forskrøllet, naar de ny kan faar Ost af
den om Høsten, siden de for sigt Kørner paa de bugte Agrene.
4o. Gleoma hederacea lugter Vand og Vitnelse Dunkner Surt og Syaetel, fyre
gier minner Slæk, meuge for ny snes experience derpaa. Den lugt i Solskinnet
Ol. I bøuche gior Pl. Plant som Rajus siger, det er ostelligt bekræftet.
5. Lanium album er det almindeligt Ugres i Have, som nauseabig udvøder. Naar
kiellingen plækker Stilker om Vaaren lilgrøn Rood; lugter de meest Sæt
lamium, som ellers ligner Stilken, men den blomer meuder smuygelig.
2. 3o. Purpureum et amplexicaule al meindeligt Ugres ellers de for den
cultiveres.
6o. Galeopsis tetrahit: er det meest Ugres i Sunde Haverne, saa og i Korn Agrene
i Smaaland.
7. Stachys sylvatica lugter crugtigt ligsom cotula og er beqvemelig, at
bufones ofteremdelig Sæt sig blant de Urter.
2. Palustris voxer i Diekerne Agrene og gradne Dalen. Den har lydt radices camosas
hvilke Drømmer med det Kokuch søge udvøder, men ellers ner Sandmandens ru-
det Sal for den.
8. Ballota q. Marrubium og 10 Leonurus ner 3 Vaxter som ellers voxer ved
Haverne og paa Gaden, samt langs ad Kmaturner Arbeid.
11. Clinopodium vulgare voxer paa Bergs Klipper i Fugner. Apotequerne forveler
den almindeligt for Calamintha saaver nu Sort melisse og Sagt Laurbær, for-
dom Calamintha er kom nu ovn Brug; dersi medicisort ny fundne Lugt nu
Vistnung i den.
12. Origanum vulgare voxer i Fugner paa Bøsen Dalen, og ringe Klippe ny,
og kan bruges i Steden for paaste Krøuter, Jeuler Urter nu for mer bruges
men bør ny samles om Høsten.
13. Thymus serpillum ingen Blomstrer ner paa begyndelsen for Dine, som
eller species er Thymus. Naar voxer Stiller under Vinter nedvisnede

som omvendinger fra Fuurum Det i Ostlanden, hvorom man kaldte Vand, hvor concipere medici Vitrum som Sølvskaal, og Chymici sagde at det distilleres andre Gang. Sand-Vand begynder forbundet med Byer i Ostlanden, da er det bedre end at drikke brun Øl eller Skjænus.

14. Prunella vulgaris Agnus farm-bøn brænd med Origanum, man skal nytage Sommer eller vor Høst.

Angiospermia

15. Rhinanthus crista galli er almindelig Engu Sengaa Ordsprogel skaalt Ærter er vores Krøner og Sinner begynder at vinder og Kolden i Skørfuglene vore man gjorde mellem Dem.

16. Melampyrum arvense farver Øig Øyner i Skaane paa Ærterne. Den er skid Sommen fra Dannemark, med Ærterne mage nymmer vel. Det melampyrum har Blomer og lange Frø som det saa at det kan skilles i Øiegnes og Øigne. Og for øvrigt Sporgen Sinner vopner kun med Øigne, og nyttigt Kjøgen, ikke Det Kalvormerig Ærter nu Vinter i Jorden, altsaa vopner de i Vinter Dekke og nye i Vaar Dekke. Hvor Ord Sagnbøiner Den Øig hvor Den vopner De bliver Det godt og mennesligt.

2. Nemorosum er fugl Øyegat oplysse vornlugner, med sine smukke Blomster, bør staar i Lunder og blomer Cor-Crans i Lugne og ny paa vild Ostlank.

3. Pratense vopner i Lugne som nyder fugler

4. Sylvaticum i Kjøen Blomer blegt Farve Crans. Jugne Vaaler er Kaufsom fod ingent andre end Kjøer, og av Svillen de bruge sig for mat, den er pratensis og sylvaticum. Vand Lyskulle Kræk i Lapland kaaldt det bitter Duor i Sverige, ikke som om det var Lingerel med Safran, og med den smagende Sødmer hjerlom det følges for dobbel Øre mod det andet. Folket sagde at det kommer konsal og da jeg besaar Ostrø Ostlanden var den ungre ovenda Vand med melampyrum.

17. Lathræa squamaria vopner med Bugs Kjøder kilde om Vaarm, uden Blad og som bryder ny i gaarn altid med paa ovenden Crans Kjøder med sine Kjøder, ligesom Orebanche og monotropa. Den fordom kjøer den ikke Den bliver sort bør saar menes-Dem. Hvorom kommer at alle planta parasitica radicum ny for grøn farver.

18. Pedicularis palustris vopner i norde Lugne

2. Sylvatica i norde Vestmarken. Bygger Skim fonter vaar det Kjøer. Bygger vopner in locis aliginosis. Su Vest som Kirnat under forager, og som Blotte Ostlanden

forbaudne; ikke som maar findes hverken Dine.

18. Sceptrum Carolii kaldes den smukkeste Blomst af hvem man kunde cultivere; ikke den Blomst som nu Karl har tænkt Ledny, men forinden Corn Jord, som altid er fugtigende, den er ikke det pragtigste af alle pediculares.

19. Antirrhinum linaria er en meget liden Urt med smaa Blomster, men lugter som urinen af Kattene. Hvor man faaer fat i den blomstrer og falder af Sandsynlig, men Skuerne derom som af Slør-Dronning.

20. Orontium aquaticum er en ret lignende altid ny Jor. Den er gamle medici skilte deducerede vires plantarum a figura, kaldte saa fordi det Vandrige som dette, og det blomstrer meer dobbelt. Men i ligne ved Øyne for at Øyenes Kraft dermed ligne, da nu Øyet frygt lugter nu saa saa Øyenene noget, og under det samme tyggende mangt para Øyeblik, da sue derom blev øyne og tegnede, at de kaldte det Øye Øyet Øje, skiller saa Øyet fler.

21. Scrophularia nodosa er en ferskvand og fedtig Urt. Lemandsen ~~er~~ af Vanskab. Den mødes ved alle Gade, og er et Slags Øjnes miracul. De lykker Kolder ligger omen gra Jorden, ved en Sollerhus, og bedelle den at intet spatium skjærsinden den bestre den er Asylum for Ko, Fedder, Drenge, navnet Jesus etc: som vilde snuser fra for Ødemuskler ved Gaarden. For at skjule den for Slabnen privilegiere den den Øyenes Øjne. Men at den ny fuldt blev for mangt sar som grønne insecter, som al mindelig opæt Øyenes fructification ernære Thrips tabaci, Dermestes og Curculio Scrophularia. Det er forresten ligt at se Øyeblikke Curculio naar den for opædelsens fructification bygger en folliculus altid ligt Øyeblik, for at mange fuldt hvor altid var Øyeblikke, i denne for nogle ikke.

22. Orobanche major er i Øyeblik Corn saar ikke kordbende af saar i fin Øyeblikke Agne, skiller sig for Øjeforsøg som Rothanici saar navn, og forbinder ved plagiari af andre nationer. I Øyeblikke Øjne for dig den, men i fader Øyeblikke er ny mere end 2 Øyeblikke fandt, og er mig altid skilt.

23. Linnæa borealis er en af de mindelige Øyeblikke i Øyeblikke. Den voxer mest i Øyeblikke, for ny para secular er blevne Øyeblikke. Det er den vanskelige Urt at cultivere; ikke den vil fordø paa mager, tørre og Øyeblikke, men som er bedelle med kjøpnis, at den bliver om paa den mader Øyeblikke. Det er underligt at den i saa lang Tid for Øjeblikket var ubekendt for Øyeblikke botanici, skiller den Øyeblikke saa lagt den for vaccinium vitis Idæa 1740 paa Arch: Linne

gen Øen fuldes Haverne til nu forummunt Frøer i Stockholm under Skanzen og Lopsk
Skov, med hvilken sen bracherede under Frøenetrium, som admirede den. Den samt
hvor nu Skoug er beten Ekkeudlne og ny vongnunen, uden blomster en nu Frøe vugne
nemmere, og ingen uden Ekkeudl smoguck, som Nordlandsvillen Decorer Frø
udi Haven, hvorpaa jeg saae de smukeste offerbaloner. I Skoven bruges den i alle Erflag,
purpura, Herper etc. Ved den ny Fuldt linen til at udvier Kopper og Vinstinger?
Om vognen kunde finde paa, vil at cultivere den i Sanne, giør den som Botanici en
stor Tjeneste. Den nuhver Ekkeade som Øldelne for uigen følgende. Ekkeade
Øldes en Kruller med Gras blomdet med ¼ Sort Mould, Kerpaa og Kiøns en Kiøn
Korn og Feldes i Sette Drøms, samt lacke Gras Lidiche vogn og paa den. Ekkeade
Kuden overvente den i Kolde Orangeriet. Om Sommaren Feldes Kruller i
Haven: Dvaldes Lenne den vel, men vil ny gienner blomsten, i Sanne kraelne
den ny al Fiaar ude om Sommeren.

XV Tetradynamia
Siliculosa

1. Myagrum sativum fu Oeconom Fol uidenuerig observere, at den nu vesp Ergyl som
Fandt i Konud, vesp i Augen, og vesp i Frøenur, som Kuller ødvoldne Fendor alt
Sommerhaver i Linnu, som at det er forgeenes at velle persuadere bøndenur at
Lin forvandler sig til myagrum og Aug til bromus. I Brabant og paa nogle
Steder i Holland, faaes samt Ergyn Sinnet til Olie, som de bruger i sin Sæde.

2. Paniculatum vogner i Augen i Skaane

3. Tubularia aquatica er nu over den mindste Kreter, og kan med fier Je vulgare
Plantago uniflora, limosella, latine hydropiper, og Tillæa aquatica.

4. Drabaverna i Upsala udisputabelt primula veris, den Kaller som Kommer om
Foraaret. Bøndner i Smaalen paae sin Wooer Aug, naar den er udslagne
begynder at blomsten med de nederste Blomsterne og de i en Racemus. Efter
de som ny for udblomsterne Kuge med Erpt om Vaatterne, paae og med Angen,
og under Angent, at det ny naae Fulde paa den fructification.

4. Lepidium sativum bruges i forrige Tider som Mundbrød, men nu Bordet
Bønder noeden til Kubrøds Kiød, hvorav medici troede at det var Bittersal-
se, som Skriftlen omtaler. Men de ondreg sig, at Bittersalse er Centaurea
calcitrapa, som Forskalsen bevist, og fer nu den som en Skarn i Arabien.

2. Petraum er over den mindste Kreter paae som Tubularia. Ingen blomst

gräset som kallsenn bryttes, og kan ny cultiveres i Haven uden Kalkgrus.

3. Nidarale vokser allenuden paa Vinger og ved Haarder, som ikke taaler Græs vil voxe.

5. Thlaspi arvense er Byggl Ugres i Rug Agrene, og paa Sandt Agrene

2. Campestre vokser paa ruinerne ved Inne, Jord, som der er Linde

3. Bursa pastoris Den besynderligst af denne er bort i Kålhaven.

6. Cochlearia danica og officinalis vokser allenuden ved Havestrenden. De begge Urter mod Skørbug, ruinen succus expressus uden spiritus. Begge er annuelle, og forgaar strax efter St: Hans Dag so de fleste Blad med Stenen, som forargrbeder Smerter Buterne og ove Moderen.

3. Coronopus som er ikkun Karse, vokser snil i ved Vinger. Er vanskeligt at kende, de Blomster ligger ned imellem Bladene.

4. Armoracia er i Haven i ender blomen en ulemuchelig Kroes krydder til Kalkoner. Den bor ikke omsettes af Koldsmer som bliver Stenen, og gior uegnet med fuglegt Ved, der den blomer Haarpen. Er ny Skaden Stor blige Urter end officinalis, paa hvad Vederlag den bringes ikke ny Lyst, eller hvor Klasses Urter ikke den ikke Kvalitetenen Roguing. Ikke mindeligen afsinder den i Haver Gryn, og Skorp Jord Vestkysten, og Landet Haver vogter Dogny, ved Ikke knaller Pigtrier fug, det finder ved vogent ikke mere blomsnud.

7. Iberis nudicaulis vokser allenuden i Ville Haver Sukker og ovenfor vokser paa de marvarsk Ukrter.

8. Lunaria annua er en besynderlig, og Stor Vest ved Haver Siliculæ, som er snil ovale, flad og langsom de blomen.

Siliquosa

9. Dentaria bulbifera vokser allenuden i Lunder, ved Byggr Skyr. Den vokser Sidder, Gloutes den paa vorbent Snil Jord og bro den Hatog ved insecter, som nytter Snuger Kaar Sejr Haver paa sit Bend. Den Ser in alis foliorum bulbi, ligesom lilium bulbiferum, og Kaarrigne Skor nytter finer blomsten, uden Haar sig ved Sein bulbi. Det er besynderligt, at lilium bulbiferum og ligesaa denne er gamle vogne Skor, men vokser den uden bulbos Haa Haar den Stor Sin.

10. Cardamine pratensis Blomsterne al den Ved Siden gaaer, Sporter den og Kaldes Gøk Blomsterne ovenen Kvel, Haar det Konfet Blomsterne kom ned fuldt Lugter Kraft i de Senne fer Dage, og Lugten gaaer der i Afskarlebig Skod.

11. Sisymbrium nasturtium aquaticum er dyrket til Cochlearia officinalis, som medici vilde ordinere mod skørbug, og vinder ikke; at den er friskt nemmer end i Skaane, ogsaa forfaren derfra, men Apotekerne tager Cardamine pratensis i den mening at faa Vower med sikker Indvoegning, at den vogsen Botanicus formeiler dem det, som han paastaar at Cardamine pratensis er ikke nasturt. aquaticum i Sydtland omkring Leipzig og andre Steder; derfor vogsen Bilde er ugiltige for begyndte Kiøbere, gjøres de mange Dage i Kaarenlog foran den ægte skørbugs Urt.

12. Amphibium fra Linné ungen vogsen Vaegt, som er sig fora ikke uden vogsen fra Vand og i Vand. Fra det første er den lav med foliis pinnatificis i Vand oftt og som en Kard med foliis lanceolatis.

13. Sophia er vogsen hos os Linné Sinder Haar, som excrementer og grin, dømt alle andre Vaegter, Linné ville udkaste, som den er vogsen ungt Pøver. Den er og ikke ikke gaa ihus. Lag: Fruct. siliqua curbus af formuden Vand, uden Hoeger til Tøvrenes Lapper, som besøger Fuger med flettig som Vin-Frøe. Jurtige Lagne blanden Krøkis, og lydt af et par Aeng. I Sverige spiser de ikke gaa, og Bønne Dyrer gaa Engner, blomer i Kongeriget Vilkiin, Poldrfor et arcanum.

14. Erysimum officinale vogsen gaa Gaarder og Vejen; ikke at vorne vogsen Vofarbne. Fra vogsen gjøres den bekendte Syrupus de Erysimo Lobelii, som Kræfter gaa ungt Fuger; Pi om de gribe bran. Det om Oestrinne, og Lagne dropa fal fra ikke, blier de vøjige i Selpen, de Fuger er Dens forunder fælger Vestindie.

15. Barbarea Kalder Hos Vinter Vorland, Pi Dens grønne Blad ligger under Vinterne Trifer under Sunne, og kan ikke bruges som Vorland. Fra vogsen Dne og ikke fra i Sommer. Jer med Upsala vogsen Dne ikke tal med Vand Vaegt gaa Kongs Lugen.

16. Alliaria vogsen med Ager og gaarder Den bruges til grøn Kaal, og fuages ikke den som allium oleraceum. Det er befundet ligest den, pulveriseret til Ensigrøn Vøjning Lig som Helleborus.

17. Brassica campestris er en øfjubig Vaegt. Vogsen i Vaar Lugne og gaaen Den ligesom sinapis arvensis er i Korent, og fordens vogsen Culter til Dens udvid-Sund.

18. Napus er en Kor som vogsen som Kaal for til Sommer og gulder Lø Ny, og Selv Kaal ovna for Jorden, og Selv under. Dnuer er den under Gothlands Nor,

som var Thomas Bartholinus hvor mange berömmes, og hvornes mangt ud om lands, [illegible] naar man [illegible]. [illegible] i Ageren blant [illegible] Rugen paa [illegible] [illegible] Gothland, [illegible] Ageren [illegible] [illegible], og Rugen efter [illegible] gjordt. [illegible] [illegible] ud [illegible] at udrydde den, eller [illegible] den [illegible] importere andet end Rugen. [illegible] den [illegible] i Lifland og Flandren [illegible] til Olje. [illegible] [illegible] bliver [illegible]; [illegible] og [illegible] Frugt [illegible]. [illegible] [illegible] paa dens cultivering, [illegible] i [illegible]; [illegible] efter [illegible] paa [illegible]. [illegible] loco natali paa Gothland [illegible] cultur, [illegible] paa [illegible] Felt, [illegible] til [illegible] [illegible] blandet [illegible].

14. Sinapis arvensis [illegible] blant Kornet, og [illegible] [illegible] Kornet. [illegible] Rugen; [illegible] [illegible] [illegible] bort om [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] den.

2. Nigra [illegible] i [illegible]. Kraften [illegible] udi Frøene [illegible] penetrant den er for nerverne [illegible], [illegible] vellicerer tunicas nervorum, [illegible] medulla, [illegible] spasmi og convulsioner. [illegible] simple experiment [illegible] at spasmi [illegible] ab actione sensibili in ipsos nervos, [illegible] tunicas nervorum. [illegible] Senap [illegible] Synapis alba. [illegible] Senap [illegible] at peristroma villosa in Intestinis [illegible] den calleuse, at [illegible] Kroppen [illegible] torpid. [illegible] Kroppen [illegible] Sinapismus, [illegible] at [illegible] paa Fødderne for at drage Podagren [illegible].

15 Raphanus Raphanistrum [illegible] med brassica campestris. Den [illegible] blant [illegible] Rugen i Smålen og Scania sylvatica, at den [illegible] deducerer [illegible] til raphania, [illegible] Doctor i Jönköping [illegible], [illegible] argumentet, [illegible] som Kähler [illegible] Sardonismus.

16. Isatis tinctoria [illegible] at [illegible]. [illegible] i Plantagen [illegible] Isatis til dens locus natalis, som er paa [illegible] ved Gothland, hvor den [illegible] [illegible] paa [illegible], hvor Fucus og [illegible]

og begrænset mogle Gange exponeret for mangen Blæst, og dens Rødder som en gravader der som i Sanden, ikke Sangen ligger der løst og blæst bortsøg Vinden, til den maaskee radicula der kunde fæste sig i Grunden, som en Kalkvand som er malet Coraller.

17. Crambe maritima voxer kun paa Øen ved Havet ikke ved Østersøen. Den er saa lang som Kaal, og synes en ikke ringe Skade paa at det var paa gamle Blomsterne som fødte. Ikke Den vil lægge Kaalen Dyr, men ikke, ikke alle Blomster mere Skulle.

XVI Monadelphia
Decandria

1. Geranium robertianum er besynderlig med sin Lugt, som forer andre Europæiske for, at den lugter som Dyr.

2. Cicutarium er i sandhed Sanden blant de værste Ugræs.

Polyandria

2. malva rotundifolia voxer paa alle Vinger, Gaarde og Sanden uden at trænge for Jordens, nutskiøndt, at Spindel malva blader ligner giftige.

2. Silvestris er ogsaa fuldkommen vild Urter ved Vinger og Ugræs i Sjællandsk. Under den som de Gamle kaldte folium sanctum og Fulde bruge i at kiøbe for at sælge alvum apertum som alle Poter taler om.

XVII Diadelphia
Hexandria

1. Fumaria bulbosa voxer i Lunden som mere Skyggeud. Den plante er saa for paa Bupbonnus Urfarvningen, ikke den prydes sig blad for den Varme og gaar siden ud til Jorden. 83. paa Dugbonnen Urfarvningen bor ingen Væxter plante som paa er Ugræs hvor Sommeren.

Decandria

1. Ononis spinosa er det besværligste Ugræs paa Agerne i Skaane, som ogsaa ikke uden med Ploy. Rødderne krøbe under Jorden, og er de meget stærke og nutskiøndt at bortrive 8 Tommer paa Ploymen maatte saa dog ofte Skiærbil med Øxen, som er den Jorden kaldes saaer ret bove.

3. Anthyllis vulneraria voxer kun paa Øyder i den ullenstrøgne. Stortulasi fig. at om de lægger blader eller vil Sauer ovenbringe sin bulbos Blomsterne paa fremmer Sauer. Under vandring er vist, men det skal og Blomsterne paa fremmer Sauer.

hvorfor jeg fant med egen Øye, at denne som forgjæves blomstrer i den store kalkjordene planteres, faaer røde blomster, og i den fridske kalkjord hvide.

4. Pisum maritimum vokser og trifes under sandet med Aadderne som den skjøn er som en Dvergt, og ogsaa for Mandel. Engelsmandenes tal om nu, forinden Bispegaal skaar poder fig og faar med Skinne frøene.

5. Orobus vernus skilder grøn, gaar saaer og faar smukke røde blomster om den voxer at blive ved om faar hvide vinter, paa aarets tider.

7. Tuberosus har Aadder som filipendula, dreiner grasserer ligner allerede ellers skinne Aadder, ellers med filipendula og potentilla.

8. Niger vokser paa de tørreste steder, roden er sød som Lakrits. Da Kongen Tiberius indførte det traa i England, udfordrede folket i lang tid mod at det skinne Aadder.

9. Latyris pratensis er den bedste græsfugrene, men vil ikke gjøre paa ødemarkerne med Gærdes Gaarde.

10. Vicia Cracca er som en Kand i vore Øg Agrer, og fordrøver ungrøde den. Den ødes ligeledes om Vorfaaret og forraadnes. Dette Aar blev blomsterne om den ordnet Kunde faaer paa Engene men den blev den øverste 1 Alen høy.

11. Nativa blomster sig ungrøde Agrene med Roden, og er det Ukraut bruk. Den Ukraut er faaer den Fiel ira Dieden er at bruge den til paa Engene og lade Gjøg under den, skjønt paa Engen der er ingen ny Kunder plukker de Tiskaneog Ophøiet faaer hvor Agrene og Skuer for de steder, og flaaes en i 2 3 Gange om Aaret, ellers vil lade Gjøg vonde. Det Kuer bliver forgiftet med den ungrøde ordet, men faaer de ikke for ungrøde paa fig at blive blind.

12. Erucum hirsutum det verste Ukraut i Smålandske Agrene

13. Trifolium melil. officinalis er biennis paaer Vaaren med en Kand Lugt som Kanning Ost, paaen den er blomen Vorgaf, det fejnt at Kiøe efter den.

14. Repens den bedste Kvæg paa Ørets Vikenkrøer.

15. Pratense er den bedste til fø i Engene, Kvorfor den og staar paa Agrene, naar den skal Engen til fug, og er recommenderet af alle oeconomer

16. Hybridum vinnergraas alle trifolier, med skiønt at ingen det er den, skjønt den er ugjerne blev en ordnet genuum Mickelie, og ogsaa er bedrøgner mig tidlig uden fra Orienten i forrige Tider. Vopens premis eue det med Ingen paa Engen Aaren med Dyr. Den blev Kvor

hvidgrøn med Trifol: pratense, den ellers hedder Hvidgrøn Kløver.

5. Agrarium 6. Spadiceum vokser som 2de Øxhoved, og gives Høsteuk Dyrene Kød som Czarner.

6. Lotus corniculatus er og et af de bedste for Kreg.

7. Medicago falcata (Linnæi for Krøp) Vedhuedingen Hvidbrøstet Lucern, og Kintsforn, som ligger forderne Kalkjord i Persalens Foin, og Sver urgent Fior. er en Slags for Lucernen, som det dog aldrig lykkes for den. Denne falcata er Bestemt til Lucernen, men den vokser ny og op, under Skillerøy ligger den i Feil nu selv lange alle under. Det er den forunuft som vor Decomer i vore Inter Skal med Ligger jegen, men om den skal komme fand det vogt observeres den natale uneft 10 faar ny vore de meuster vaad er, uden paa Dalene og Sydder der alt Skaud vinden Herpaa 8de paa mere Nedre i Grund og Sæd Jord 30 paa aabent Sted den ingen Skygge er om Aren 4. 7 Fuger og ny paa Vedmoerk; Ifi Kraabumer gaver den Skiller ud til Kordin 5. Kreg de Ledger nummelegtner af Jorget Krøner mon Fur, og uns Fedes Sæden ny bergnet, Svorfor mon bor faar ny apan Kreugt Flads tilat faar Fior ovr.

XVIII. Polyadelphia
Polyandria

1. Hypericum perforatum Blomsterne bortfaldne inden at antherne ligger det pollen; Ifi de for i fig ny blod Dull med Svellet Sandinger forger det Uncadnum mold. Ellers er tinctura vel Stuk, og et af de bedste Sidder mod Saar.

XIX Syngenesia
Polygamia æqualis

1. Tragopogon pratense i Smørvigt Sadet Gavn i Hø, og Vedmoerk Sæbeli. Vidom Landsforaas den som Pastinaken. Andre Kogns og ders som asparris, men Mondnen er biennis, altsaa skal den optagnes nu en Pastiner eller Skaarmelonen den gaver i Skilt den vaaren ny Sver Milorgen kl. 3 og gaver til Kreugt kl. 10.

2. Scorzonera humilis Blade med bruges for rad: Scorzonera men er ingen Sorter. Vogner i fugne paa Eng, Sver den er lidet fugtigt, men Sadne for di Ensu alder gravde Selgnt Sver den Skaaner.

3. Sonchus arvensis et af vore bedverligste ugræs i vore Dyrene, tilligemed

serratula arvensis, og Cardus crispus. Denne Bondeuer lade den ny allerfærst blomsterne ud, og bære Frugt, inden efter Frøen, da den bort omkrænger den og lader den faae.

2. Oleraceus som er den blomst grøn Kaal Hvad ny den fungerlegger, men den bruger for Caniner og passer i Kaal Haaverne

3. Alpenus er den forgyldte herba i vort Sygr, indkommen i Sommer. Deraf bryggers. Lappernes Kraft er den ruden den kommer i Blomsterne, og er den som er ude Ubler. Med Øier og Eddik fuldt, den ikke nyttiverlig fungr mod. Den dreiger ogsaa den ny allerede ny Blomsterne aluindelig, og i morgen ny faaer Øyen Dagt paa mindre Florde, ofte den man vil ingl. Er den gynd, og er som Dallad, eller giver den til Øyeskarne.

4. Leontodon Taraxacum (nise er lil) om Vaaren naar den vaaner op, lugter man den Sommer Blomster blive hvid, og er den fæden som Dagfaar. Den drifner urinen, forlod Hollenderne nygenser giver for Sorø den om Aftenen, paa det de ny maar piske i Sengen.

5. Autumnale ungdes upper sommet man for afslagt det ruden fort, er den øyder Vidnerne paa Vinyaren, og ødelæg den over alt. Dette er ambidue bygsom paa succisa, plantago lanceolata, primula veris, og Valeriana officinalis

6. Hieracium pilosella og 20 auricula de ved mand kligter Vøjtne. Videlo den findes undertiden Coccus polonicus.

7. Umbellatum det er upper 20 Aar siden mange lande gyndegner høyrydal Korn gyldt, som med Reseda lutcola, og siger de som for for øgt den det Korn omme gaaer lutcola.

8. Crepis tectorum Den ofuge-dlegter Kortpaa vom Sycebeg. De som og pappum tror ny at fue kan ligger Jid. Jeg for ny under nogen tvist om Balanici saavel Korn Vaaren Enlighed mind, at Hiller fra andre species. Si den er polymorpha og sig selv ikke paa differente Stander. Den Hiller fra crepis biennis, den mandigner Skarp fra crepis Dioscoridis den mand at blomsterne ny om vor under.

9. Hypochaeris maculata mange Urter den paa Vor Sogne naar de nye Kortend, Hiller ny fungens naar de nye farver. Jeg kender Lund der om Vor Kunst mod, Denne som er de Farve mod Engene lysende og Stamme nu ny tor og funcus capitalis og Grainer.

10. Lapsana communis er Kniut Vigaes i Sanger, og under farven blomst Eden; Si jeg for fant nu Dyr for Lapsana saae forgaaet alt Korent

mere altid fant magre Oeconom som naval Svoen.

9. Cichorium intybus voxer paa Ærtemarker i Skaane tæt ved Veyrøer, med smukke blomster. Cichorium hortense er kun en varietet af denne, som vindes ved Kultur blomst, og mindre fillerne til Salat, stort og til Smagen meraden bedre. Endnu er det Culturen langt større end den Vilde, men den er ikke saa smagende, og ligner saa i Udseende.

Cichorii Rødder som bruges paa Apotheket skulde tages om vilde, men for Kiøkkenet allene om de Dyrkede; thi ellers er de for undige og bør inkumeres for de øvrige ad den Vaarsæd.

10. Arctium Lappa er en overlig Vaad med smukke calyces recurvi. Stoubrugen af giør den sved og klæber ikke Klædningen. Det er besynderligt at denne forsigter i Ilden ligt som Frangula. Svad mere Kraftigere er det.

11. Serratula tinctoria voxer i Vidlandet Lugnet: bruges til gult Farve. Det er en for Kiøbs Landmænd til Sverige under Frøe Navn. Satis og denne er det ønsket det for en gulult mand.

12. Arvensis er det vanskeligt i Korn Agerne, men det kan ikke saa ungt forgrøn med Vilkerne om det er ikke. Jeg Organen gnelig Ku, Sal alcali er ved gemme Vatter, gemme til praxi ulige til Vand Glas lagt Cinere es clavellati, men til de Ænder Glas lagt Soda, som giøres af Salicornia Salsola, og Beaumuria, men er ligt god Ægnu Fab blivner den Soda forgiøres af Degen.

13. Carduus Lanceolatus Ærtemarkel er Ænz blomst med Kollfarve, som brøunes paa ungt for Degen Dyrker, og fegnes af giøde Degnen, men gravens den Jæbt af, fordi er det den sterileste Jord, og ligner Vaad voxer i den. Denne Ænz holder allenlunder Vand under Jorden skiøtte er Vand det lenge som forder det og fuxnes, og blivner ubelagelig for Væxtner. Naar Ænzen bliver blivner den Jorden og kiøbe Væxterne som forarbeiden. Merga som den Ægnufore al den ny Jordens naar den Vinengrønne trabel da den er alcalena som bryder den Dyrenes fornem i Vand det. Naar nu Ærtemarkel er ogsaa stak Jorden hvor den Dyrenes fornem i Vand det Aar. Ukrænter uvæxtner. Ænzen fig lorst den. Ladnu gaaer bort smeldoudet Aar. Ukrænter uvæxtner. Ænzen perpendicularl Jorden Ænzer for Jordens, saa er den allenu for Ærtemarkel den hvor Ladnu for varmt. Ad Skillige anmelle Ærtenes faarne Jorden i Jend under Ænzer. Tournefort da fem ikke for de vires plantarum bruger den blaaal Vand Jagter af Jordens Dæl nu paa, Ænzens Dæl forandre ny Jagt Jord, hvorfor det er og en Dæl det kan coagulere Ærtemelken, ligeledes

galium, Wallkal og Nellikrod paa Tigner, Kirkestokker og Jugsler.
2. Crispus er i Upland det almindeligste Urtes i Agrene uden nogi andre provincier.
3. Palustris Guldrosenrod er alfra Jordrøn blomster om Sommeren hos Jordblomster Dunne om Vinteren, hvilket bør observeres.
13. Cnicus oleraceus kan bruges om fattig Fold til grøn Foder.
14 Onopordon acanthium Dens receptaculum kan bruges til Mad som Artichokker, uden af Calyces, Corona solis bruges undertiden, men denne er ikke annuel Foraar den dog siden 3a 4 Aar udskyder blomster.
16. Bidens tripartica vokser ved Veie, Porkker og Dommer. Den som vil have Guldskiffer i Sommer skal vogte sig at denne af vokser der; Si arista seminum retrorsum aculeata, kan fastes i dens Qvalg og blive der.

Polygamia superflua

17. Tanacetum vulgare Lugger med Bug om Sommeren, at dræbe skal voxder og Ostaffer generere.
2. Artemisia vulgaris er den bedste Urt i Agrene i Duvaloud. Bladene er glatte og tørre, for dengen at fælde Foraar og Qvier-Dyggiør den meget udrydelige. De Gamle sagde at om man gravede op Aaden Ostiskommer Eiden (f: Hans Jags) skal et Kuld finde den under, hvilket er det gamle Roes Ord, som de efter ingter
2. Maritima vokser ved Havs Strander sunnsvid, og lugter ud fra ved som Lavendel, men hvile bracken dræber Lugten. I Haven bliver den grøn, og forlorne under ej uagtet at den Lugt.
9. Gnaphalium dioicum vokser paa det sterileste Grund. Fell. Dræbe Capsle gnaphalier skal plante i Sommer Jord at om de skal komme fort fos ob.
2. Arenarium vokser mest paa Flyve Sandhinder, saa hvile Fiskeskyg uul. Calyces finder den Guld, og bevolder den Farven mødskøn Urten er lostend. Den bringt Skibene med gnaphalium orientale, som Frøen kunne med fra Jungen Ostogr cultivere. Ostenfor vi gnaphalium ignium vor det Sommer for alle den mest lyshed. Stoechas citrina paa Apotequet lagres om nu gnaphalium fra Spanien, men arenarium er paa lige det ringen medicus kan filler den ord. Den er om ingen Ostyrke.

20. Tussilago farfara vopner hun i Enen, uenu nysgaa ud den nu hvor nogen
Hovedet kram er. Jomfrn holder er den vel lærende og formende er det bedste
hustler.

21. Petasites har de store blad er vorden europæiske Vegetner.

21. Senecio vulgaris ungnetal uriudnlig, nogen har grønt alle nogr den grøn
haar, uenu er Enens blomen galer.

22. Solidago virga aurea vinder oldrig nogen blomsten fornud efter solstitium

23. Arnica montana bruges til Tobak som Pouder.

24. Crysanthemum segetum voxer ubekendt i Sverrige 1690, da nu bonden til
Halland kiøbte Frø fra Fyllend, fem korn forarde. Den groeg hvnd
blomsten komer i blant Korn, forafnerlige i Ogrnen Halle, ikke ad-
miscere den, hvi er den det mester Ugres blomt Stoer Sædn allen,
og kan ny udrydes uent uiuden Bondens Frø fogens.

25. matricaria chamomilla er Oldrig ikke, tobad sobes uent uiudmal den
er i. Chamomilla suaveolens de langt bekjendeligner.

26. Anthemis Cotula kiøbes ved alle Byer ouf gaden. Er nu ungt ildelugende
Dyr. Jo fem Skal udlage Sir-Dennur gnuggr pudnner uent Dnuer, fem forenu
udkurlig horreur for den og dette ny. Den bor oldrig stoer mor bein der.

27. Tinctoria ollenun paa Enen fard, og aarbent Fnlt. Blomsterne er under
uent serratula og Cyanus.

27. Achillea millefolium uenu den lauer Stefen al blad, allen vedel fetch bla-
den i Stefen og gnuggr.

Polygamia frustranea

28. Centaurea scabiosa Jn gamle Botanici kalder den Scabiosa major, og uensnut
det det nor fonger genus uent scabiosa arvensis. Blomsterne ansiatrosa arvensis
er yppeligr i Scott: Lynotum, uenu medici har aldeles kiøbt den og sigrat den
ingen effect for. Foa Apotequet kiøbes den ny uden den Centaurea.

Polygamia necessaria

29. Calendula officinalis har mer gulet fem Dafrer, uenu skal lagres i dobbelquantitet,
uenu for ny den kraft.

Monogamia

30. Sabine montana voxer Buu in glabrelis og grøn den snelt blaer. Den fem ny
er Botanicus lagner den det for Scabbrosa succisa.

31. Lobelia Dortmanna voxer i Sønen nu Dr: under Vandet. Blomsterne
er ud fem Stuer. Jugnen kreet for foradenner Stod. Radner under Vandet

en fælder, dreller i 2de Rum, ligesom en capsula, og lactescens.

27. Viola odorata hvis Blomster ny, bruunlige eller Farver er uvanligt for, og uvanligt Folder sin Lugt og Farve, hvorav viol Lugt, og Farve fil Blomst. Jeg gilligot Blomstrig Specacuanha er mange Sorter, er og forenen genus. Regici bør forlegge om Bruby, som ofterd kommer vorskue, og vel som Bru. Sibl Bynig Krobus om Almuen i Alle Bryd Byggdommen, med Kraft de finden paa Brøstet. Blad Bru forlegns acidum el alcali i Bunn Bryder Bland som om acido blaner rød og om alcali grøn.

28. Mirabilis Blomster om gred Aftenen for 5 petala og bezer ingen Frø, men Blomsterne finden paa Dillen for ingen petala, men den Krøgl.

29. Impatiens noli me tangere bør flaar i Ryggen.

XX Dicandria

Orchides for eller 2de Knolder, nu for Det Stor og nu for det Lillommunde. Den som nu for Det Stor flyder i Bund, og den for nafkommunde Egulne. Saa mudnel Saar de ud som Knuder. Den den flyder for ingen Kraft i sig, men Snuvender, mogt for ruden Knolder. Snela gamle Vurtden fugde alle som aphrodisiaca, hvorav de fort giord fin Confectio Diasatyrio i Apotegnet: En Sob for ungt Det i Saur-men eller, men Det bevises at det er found om Følgende.

2. Saar de Sirinen og menen mucilago nudicogen ouden 2. abodore ambraiaco et sircino eller ambrosica stimulere venerem hvor for hysterici ny Kaster den til ambrosiaca stimulere venerem vejns om Turquerne. Den Saar i Polygami kortdem fra ungnet ambra 3° Vanille ny Det i Chocoladen som opvekker courage, hvilken er om forenner ordo naturalis 4. Alle dreglige experimenter en Bonder giver dennem hvilke giver dens Kone orchides. De er en Familie Blomster for Dybbonus Afvidningen, men cultiveres mauffalig. Blomsten er ny nem for Det, for den Blad-bortbrugne rinden Dybbon og Vaarden Blag-ens Ind indeller, derpaa Blad Knolen ingnes, siden fort bortbrud Raa Saignen og derpaa bredelles ind Blomsten.

Polyandria

1. Calla palustris vokser ved Bund Kilden, ligger ovenfor for den, og ner Stanger som Ild. I Vesterbotten forud de Sifs Knolder, Skider den fondes som Kalnelser, De vorm mode, og kogn den i ingnet Bund. Lader Vandet falde fig lil ovenden Kaldt om Bundet, og tørn Mennet fneran, Sager de fil Mister Bodi for Eid, og er det fundet om alle panibus succedaneis.

3. Zostera marina vokser med Strømken som Græs. Blev den brændes til Glas i Skaane, og fås af det saaan 100 Kron

XXI Monoecia

Triandria

1. Typha latifola Dunvaa om Fronter bruges til Drugt.
2. Carex vulpina gjøre i Kjærmer mange Sodder, kun for Køer.
2. Cæspitosa gave Kier Dæer i Engene ledige det mester og bnfen Sodder, og dens Sod den giør Kuerne.
3. Vesicaria voxer som nu Græs i Lap Kjærmer. Bladene afskjæres Græs og fodres som Høe, gnugges mellem Fingerne, den for Lapperne i stor Brug og Moutner, som bruiserne den om Dørmunden fra Ild Brand, ogsaa Mutterne fra pernicies.

Tetrandria

3. Betula alba naar den voxer paa vaadt Fjeld for den mange Snøe Qvistene, men naar den voxer tørrere for den bentaalige. Men Bladene ned Dunur og melaleuca for den Skjøger Sneen bort. Bonden er ar den Ceder som nu Lacrymantes. Det samme Træ paa acer, Rhamnus paliurus, paa ulmus Carpinus Birken giøre Salt Tørv Bonden den Faaen ud Sinen Blade, men Lou i Markbetræ und. Naar nu Birk voxer i Sine den Ligger den ungd Qvistene under den, og Blanne aldrig Blom, ligesaa i Kier, men Ceder paa det Skjønne Sara Sarad som Bøgeboen, ar den giøre Lappernes fine Bunge. Epidermis kan Fallens ogsaa Birk 3 gange uneiller uhøre. Lapperne for engen under Sollen Lunge med ar Skaaner. Paa Birken voxer ad Fillige Kuender, Fuller Bøgende fan ud som mazur.

2. Dana er speciell for Siberien og Lapmarken. Den bruger i Laplandsommer at Ligger den paa Gulvet.

3. Alnus Dnvaa er 2de varieteter. Den Bladene Hanniger ovenfra Morgenrøde, den ene rød, den Dyrenød i Norlandene og Hanniger ikke den for Bladene paa det lydig Jord men og Snor Kalk-Jordene. Bladene er altid Hanniger Gjørsom Bondenen altid Kaster den paa Gulvet, de Lapperne Kaster paa den Bladene er godt til Faar. I Norland bruger de fine Gjem Dørdøre. Lapperne farver Bremmenerne ar fine Hinder Skuddene med den. Bodene er fuld mazur voxer Lagen og politur. Ved Fordøre bruger ud mod Vand, og Kommer ny Engen bort som Skog Bøge.

4. Urtica dioica bruges for at faar, og bruges for at giøre Korger, gjemme ud-
uarmes Snoer. Det Bladene forsyne gauel. Stærk og Bladene den Sauger gjøre
ny gjøre Garn. Bladene og Bodenen for Tartarie og giøre ar Urtica
Cannabina Polyans.

Polyandria

3. Sagittaria sagittifolia har en bulbus med Aorne. Chiralogus Aldrer og er Navne af det urimelige Fald i sina years.

6. Quercus robur er det Træ som er en blank alder europæisk, som den Ekes i Norden. Det er en Forraad nu den i Sydn. Eremt gemar 400 Aar. Jeg mener Lingonen er jo Forskellen Ekeens for den warme. Men Eremt er adstringens og for den bedste Gavnes bort af indtil Rhus. Den Calyx som Ollen findes i er rudeen Farven af garven med. Eremt forikke ny gienen, vaadnes fejet. Aaadnes Ollen bør ligge Under bulbi da de voxe ad mirabell. Vil mange plante Ollen Hal det grøns gentagende ny gamle Haar. Naar Ollen for visnet i Haaret, er det Tegn, at dorten for Fodt mod ny Ollen. Ollen bør faldes i Lunbrikken paa det ny Forlaaen mere end den Gamle. De bør plantes tæt til Hinanden da de blive bruge. Ollen giver det forskjelige Farve. Naar man fjel Faldt bortenen om bør det Fin om Vidaarne da Eremt ny Flades Aarom.

7. Fagus sylvatica Skiønnest af alle Træer Eremt bør ny Haar i Lugny. Den Gamle og Tørre Aar Ollen, men naar det Gjøl bagen, bør det warm Inkerd og Fort Tegnen for Volkelium. Vad den Eidogsagn alle Eremt ord wopni Mengne, og da bør alle Eremt Skiønne. Eremt er mange bon Ekeig og Lorder sig ind Skiger, giver gandske bidt Kul.

8. Carpinus betulus Forden Ekeig til Fedder, naar den Eremt wiser.

9. Corylus avellana er Eremt som ny bør rødes ved ovtigaren; Ifølge det Forang wopni altid godt Gras. Jeg Plant wopni et Slag Ollnus Bøg, som giver utrolige Ekeing. De Modder Skiver de kaldes Ollnus Modderlord: de dragne til Bunden af Ekeens. Jeg Plant bruger det at falde nu Forst Forbel Ring i Dalen ved Bugnen. Vil man ødrøde den skal man ophugge 3 quarter omme for Jorden.

Monadelphia

10. Pinus sylvestris paa de sterileste Steder. Fjerne for nu Skind af Jordom den Sidder mod mange Ollnu Skiver det ligesom et Skalt gemt, Skiden er gemt sig godt og langt ud i superficie terræ. Den er wanskeligt plantnen. Naar graver Jorden Kraanbom paa den falen Siden Jordne bort, og ophugger de Jordsten da den Under ved fucaan Skiden, paa den anden Siden ligger Kraftet dernæst da den kan flydes gruben. Den bør staaen lidet fugtig. Den for Resina i sig nordom den og flerane gruben om Skiønnen. Den woxer altid a summitatibus, og faaer nyad paa Siden. Den giver godt Kull. Naar de nen Lugn bør de staar Kraftet, da de blive bruge, og lidt nøen lidt fugtig bort. Dalekarlerne giør sig Sorbar Inuens bort. Dreenner blive gemte om vinten da den kommer og kogne.

denne (Torsmoen Sved) er øyenlig for den som for Klubbog Ærlighed.

2. Abies (Gran) differerer fra Furen, derigennem den lader klippe sig. Grantræerne, barkkulerne ved Furen og grønne mangel. Lappernes gjør Øksemer af Aldeneer, og giver Sporde af dennes Spar.

Pl. Gran findes som for Langt rami, uden nu Blomsterne, 2d. Dette er nu plantahybrida af Furen og Gran. Frøkornene falde altid spiralt ned.

Syngenesia

11. Bryonia alba for den Plante af alle Slægter i Sverrige

XXII Dioecea

Diandria

1. Salix Trærne er uendelig mange i Sogeriet, og findes med paa alle Steder. Dersom er at de blomsterne tidlig, og Frugtens modenes ved Frugt-Tiden. Den er meget den i Fuldmane under de forskjellige mordun fra Frugt.

1. Pentandra for vedvarende Qvistene, og Knop-Sporde Sogeriet Sølv og Gulnelige Klipper. Den unge Qvistene bruges det til Salve-Sengeriet og Sorrent for Sølvet.

2. Fragilis Det største Træ af alle Salices i Europa, men mangel hyppelig den Frost Tømmeren gaar ud. Det altid Træet paa mange Sugtige Steder. Det er Sølvgrøn Alleer gandskun meran mange Træer Creares, Ifø femina klipper sin Frugt ved St. Hans Dag og fer ud som Uldfrøene.

3. Purpurea er den prægtigste Salix af alle, og er nyttig til Korve Træer Grenen er flexibel af den Vandrende Sølvet Bladene Grønne ud, men den vinterdøde ved 100 Gange mere, planteres paa det Sted under Salices ved Vaar og Høst.

4. Lapponum bruges Lappernes til Bruch, og er den nøsen som de Gem.

5. Arenaria voxer i Elven-Sogeriet

6. Caprea Blomsterne er Sølvgrøn, Fuldvoksne den Sommer af Salices, og den er vel Træet tidlig, uden paa de Tørreste Steder. Naar den er vokset op i Skoven Kjerne mere end Kronen, der den Gjøre ud i uendelig mange Qvistene, og Træet meen Sygt under Træ af Qvistene. Jeg Skjøne den den mest Sølvgrønne, og trives mangel ved Gjerde, Sporbet den Salve gaar i Den Dørene mellemen. Vil man have Allée paa Torve Vaerne Træ man ungen Træ under ned Skuen. Kuskling og Sandhen Skalgar ved ned Skuen Dørene den Sagt. Naar Grenene voxer paa den Den Blomster den lugtende som parfum, og for Lagen Bringerne den ud i sin Ærlighed i Sar naar de Skalfrier. Er det største Træ af de Blomsterne

og foldes palme, hvilket blomster er for forårsten Kjøbenhavn, som altid blomster om
vinter i Indvendige Tørlum – Boldsog er de her 8 Br. Den som vil have disse
planter den overvinter Haverne. Naar vinter ou Haarne saae flyver vil
de have Ørlord. og gemmer dem den om vinteren ellers dør de, og finder
de den Eidom Aarets nogen Blomster om man ny for dem.

7. Vimineglis voxer til 2a 3 Favnes Høyde, uden blomster ny giver nogen formell
Frøer. bruges til Kurve og grønt der den.

8. Cinerea voxer overalt i Kiøbenhavn og om en Kant.

9. alba Voxer til Hvem Evan som Fjelene, uden nede overtagen til
alleer: Ifi Phalaena salicis den som ofte er alle blad paa Fjelene uden
ny paa dem.

Triandria

7. Empetrum nigrum er en Buske som taaler for Lofter Kulde. Høyde Fuldkun,
ved midte Tvirgrenes Farve brun empetrum ligesaa med Fakler Grønsvor
Bøjne gaagne op og lavagne Kuldne voxer ellers empetrum Naar man den
Bærer faaer man Hvad Drukbøjer ikke Dyrer.

Tetrandria

3. Viscum album er den mest Buske som er parasitica Lobobi voxer i Træer som
den vor gode. Den er semperviren og bærer Frøe, de modne i Marti
Maaned og fødes det Syder Fugle-Lim grønt.

4. Hippophae Rhamnoides voxer til nogen Favnes Høyde, er den mest Buske
som kommer til Fjelene med Sand. Straaender. Bærer en sure og ubehage-
lige.

5. Myrica gale bruges ny gammen til Øl i stedet for humle; de den giver saa mange Sand humle;
de den giver saa mange Hoved Varme. Fremmer en tiggaa og Hoved
med Dem om Kaar. I Nordre America voxer en Myrica den mange
lig, men 3 Gange Høyere, Fjelene faaer grønne Bar Blomster som Libo, de
Lugter til de de Frøkn og er al Dens pulpa Vox, som flyder op gaa Vandet
og fiske Drikke. Det for alle Fjelne Farbe som Vox uden blomsterne.
Den uden Lugter voxer myrica Frugt, humlen den Farve som finder den
Gaa, og den formelt Sand Pentandria grønt Vox til Lys uden grønne Lidt

6. Humulus lup: Ilt humle er en Tartariet, uden for en forant sig
selv paa ved Fjellige Ved, og vor ellers ubekendt for Skorne er formel
Gotterne falt ind i Italien. Florens Det er en Ellen den Gyrelse,
og den uden finder den vild, saa er det mest en Ellen indfaldet
Dennes, der ny Phalaena humuli den Flade Dens Modder, og altfor ungen

Sommeren dyg og nogle Dage. Dens Hovedrod glatte og lange voxer først ud af Jorden flydende, og kan faaes nu inficiered under Jorden, som ny gjøer Sukker ud af nyttig til Vand. Sukker Stilken bliver hos os Vanskelig, som linen til Tøiet og Garn.

Octandria

7. Populus tremula Er den allerlænge Træ med sin Blad, som ikke hvor af dens Petioli er forlænget og fladt som en Kageje-Bladet. Af dem er det til aller og Tømmer; Ifi den Lybske med sine Rødder og Skoven op forad det blomer Blæsbælge, foruden det at Bladene ligger 2 Dage inden de vorder, forskjellige den Gras Vinplan, den vokser fuldt, hvor som man saadan kan faa den Blomer den. Dens ny Skudt og det, som det ligger og rødt og lidt i en Kjelder Alder det sig lugn under det vraadne. Det Lærk det Skjegg sig. Skal forfaldne Blomsterne, og i den Ende Bordet det, hvilke Fuglene Magen under vernis det vaar og faa godt til Dag; Ifi det vraadne snart, Bønnens som er under Jorden af dyrer blomer Bønne Gallen Stor.

2. 3. Nigra et alba Ligger meer saaledes blomt alle Brugen Trænes lignum bruges til Mat paa Fyr i Gaarde Kjøkkenet som er glatte den ude Aal.

Enneandria

8. Mercurialis perennis voxer i Sunder ny giftig og bor ny lagne til grøn Kaal.

Monadelphia

9. Juniperus communis voxer med Furen og Granen bygge som Dyren. Den Krigs Fordrer 2 Dage ere Inge den mor Jeny. Dræbt Sort mænd Kjøbenhavn 3 Dage under. Det er en Sydvestlig Kulen voxer paa bornholm paa Dyr Lyn, selv snor Lø ny mu i Langeland min Dr alle Krybning, Ikke Kan den giøres af Dens Dræn. I Dyr Fuglene voxer med Spurgen paa gjøre paa Vi Vinskollen ogsaa paa godt Kjøkken, som vokser finde Ihes. Sobos paa Bærnen, hvilke lagne og Stø Ens til Sunbæ Ol, som ny er ubefaglig, men da det ny for giøre, fuurum det indu 14 Dagen. Alle vorm Blæsbælge for gaaer gjennem Fuglenes Stam. Den paa Fuglene af og dem blomer igjen, de blomer Dræn nu Ein, og nu de under Ein bruden og Kan nu fordan Kod vorm snart Secular.

10. Tatis baccata udgrøer i Sanne de Sunderlæ Stilen, og lader Skygge sig som Bugbone. Den Sort Sunellen, bærnen, og mygen blod ned de under bær Dræn. Dræt er Sort, Ifi i Blomm blæsen det Stort som Grøn.

Trant er smukt formindelst sine Skygger, og røde Sommerdage er pelytter Baccæ som de under ligger fulde ligesom propulum omkring sin glandem. Den mon vil foran Lazus bør, blomster ligger 2 Gange i Jorden inden de vorder mere end ploutens de vel ock ligger Qvæstiner i Jorden, som det ligger der 2 Dage inde de den sagde Lod. I vore kolde Vinter vorder den nye Jordvarme, hvor den ny ploutens i Bygge, bøde vorder den gamle lig det Nord. De Gamle holt den for Skadelig de, ikke er den ellers ikke Skyldig. Frøglæder alle den Gram for den 2 Gange inden den monden.

XXIII. Polygamia

Monoecia

1. Holcus lanatus almindelig paa Jorderne i Holland, for gamle ungt Hø.
2. Ooratus paa Sidenen af Vorde Dunes, ligner som meucus. Ved Gøteborg voxer den ungt.
3. atriplex portulacoides ved Siden af Jorns Vrøudenen. Bladene er salte. Paa Zeland bruges den til Vallad.
3. acer platanoides Vor forfrøunen og glatten Bladene Pseudoplatanus, for Saft som Bink, men ikke som Vaaren, og allerede vaar det for frøgtsom Skallerne.
2. Saccharinum i America er ikke Gran den Snorrave er lige Dens Hulkler, men voxes gerne ligesaa ungt og ligesaa godt. Koges til den De blomster lyst, Limonens ved Feltes i den Vinflaske i det Gran kaar, da det Flytteren, da det Vorde de Feldsers. Siden fundes det igen i Sydsud, hvorpaa den Gran aqua calcis til, Kogs og Limonens da det Flytteren. Sommeren blomst Kroe Granner, foran er foraarlig til alleer og landes Skipper pig, Cryber ny og for glatte Blader. Den Vorrene pr. de fundne lund fuer blomsteng. Ligkum er ungt Sneil, bruges derfore til Dørd, Collen Kruner og ad Skillig. Lod nu er gamle natur lobne, og Kru Dræn Kruns under pellucide Dagen.
2. Campestre voxer i Skaane blomster Sommer ud nu Kort, bruges til Sellno i Sommer.

Dioecia

4. Fraxinus excelsior er ogsaa Kroe Granen, men bliver ungt Stone. Ved voxer ved Sorgeder ellers Gerne de Jorder, ellers bliver det ny bran. Fugnigen voxer Gran Haaret fuer Skoy Sennum ad og ingen ud efter ned Dybe, Smellen er fulde Sumund ad Bladene ved unnergrønne Ved gaa ungt ovenfor Gran. Den Haven Sorund Upsala er ganske fuer Sommer inden formindi Juni og bør ny Orangerie Feldes til for. Til bouner

paa Vogenes nye Del, Del benes. saa og til Stedens, Dette saae øiegen peteja, men alle de ovenn i Dette genus saae petala. Blomsterne ere Sømme Farve ud, Spelkel alle monoica og dioica grøn, paa det ny Blomsten skal ligge sig mellem pistillerne.

XXIV Cryptogamia

Filices

1. Equisetum arvense er Knut Gras i Agernen, hvis det gaar langt under Jorden. Frøen bortaar mindsten Kold. Den er masog lamina hvis under saae Ap, og ovenny. Stoer mere ligger er Apie Dolne saae saaget, da ligger den fal pollen, feiner gaar det med microscop saae saadan de ouckling. Dette er mas mere end er lamina?

2. 3. palustre et fluviatile Haaret ere saae lil Tøm langt Egernen og sigrat de bedeck sig med Snoer. Bidloo siger i sig dissertatione at med Ilfrekt snoz saae mere equisetum vogne, det kunat ikke saae den nyer mere end ved den Ende, naar de ere ung saae saaret de Drivfat.

4. Hyemale Haaret er groel snelt Vinterne ovre. Eggelsegendrem ligger ved ovre Stoarnen Eggen ud over Stoarnen, Snoz mere equisetum vogne saae abortere de Snoz.

2. Osmunda Lunaria er den mudnerligste Ur Sengelinden. Ende i Vellen under med Ladne ligger Stelen Ærtne i miniatur, Vellen Fal komen ud Ester Aarr.

2. Struthiopteris Bladnen stoerre end i nu Skier bold.

3. Pteris aquilina naar man ofskiærer Vellen ere Blomsterne med Bladne saae gaar et Dort S. og C. Fladen man det paa Dunn representerer det nu Flaet Ping. Ellers finder Snoz de Sendens Kommen saae mangelen Dunn op, ved den bredeste vinkel Ladne i Vellen ny Lordnuede, hvis Agergaarn Forst er Ellen end, siden paa Fladen. Ellen Bugnes saae Debnoz vanden. Sugne ere i Sverrige taalne saae Liden Kulde saae dem.

4. Asplenium ruta muraria er den saae Stenspurgen giøz sin Syrup Capillaire ex. Er Kommen Snoz, det er Stenspos Flaen nu trackaten Syrupus ad longam vitam.

5. Polypodium vulgare vogner i alle Bierges Klippen, og Ladne fuagen saae Ligdirtia, purgerer Leydvigt, men er det observere med formen, at den ny Lagne Snuge, hvis de Blomne den bandt og purgerer ny i den bøn og Lagne Ganske tør.

2. Filix mas den hvor den staar er altid lund og fordomkring, saa er den lige som preparerer jorden. Det er ikke den fineste og subtileste humus, som findes der. Naar det blæser om sommeren og er vaadt, saa vil det flyde ikke er humus Padalea, og den bedste som flyder bort. Det er efterligt Rødflorudspe med Grønrødt Haar eller og med Rødt Skaft, ligesom Dunne eller Hindtenner, og flyder omkring med Fedtnen. Den maa dagne for varme om med varmt Sand, og filne Smilkes lagne til de det blanne sammen Dæmon maa ikke lagne et Øen Øverst om det, og lagne paa en Skikke for vaade for den bedre med om den fedtsen Giødsel.

6. Pilularia globulifera vaaner sammen med sommetzuellen Frøe.

7. Isoëtes lacustris vaaner paa den Bunden et quarteer fod. Naar Dampen langer, glasser dunne ud flyde og til Strandlauten.

Musci

8. Lycopodium clavatum bruges til Stoffen. Dræs, og den flores masculi, hvilke gjøre et Ustand som equisetum til ænes artificiales. Naar de er en Fuldlø saa gaaes de med Det. Efterhen fejer, om man finder den et Øiem fad saa skal Øiemen af fuuren.

2. Selago er perfecte Dichotomum, Grøndanen lager den, og bruger Kjøer Drøgend for Lus. Den er en giftig Urt. Fudel for Drøm med Decoctet for ent.

3. Complanatum den man farver gjuel med.

Palustre

9. Sphagnum er den øngste Stedet, som er alle Kiær er opfyldt med hvidlog foldet. Lagenen som er saa tæt og tørr den, og ligger om fiur bazu, de blæn altid Fuldlø, og de det suger urinen i sig. Det maa gjøre et Kiær til sig saa bar det fedte under Stand Grow, og blæner flere end et Kiær. Den Stofen er lagt kold paa aedema er det bedste Middel.

10. Fontinalis antipyretica det bruges at lagge den Kogende Fiben i mellem Ærter og Fiben paa Kakelovnen, da fat der af Ilden Dræ.

11. Polytrichum commune vaaner paa fugtige Steder et quarteer fog. Det er en meget gammel. Stoddenen, som paa sommeren Stedet er den ny som Stillens ved. Er den Stofe som Brosnen Skogen i det fir

12. Mnium hygrometricum og fontanum kjendes lettest ifra den fri
gule farve. Den er 2 slags Kulder, nu sort som optørrende med tørkider,
og vinder ny igen der er det klam fer og kold Vand, Tørra Kulder er nu faadan
og den vøyer Dømer vindt omkring
13. Bryum rurale gror paa Jorden Langs Veiens Grøfter
ne fore er de i messer gror ved det flere omer 100 Aar, ikke det fødner Sugtighed
den i sig.
14. Hypnum parietinum og proliferum er de mest som bredt Jorden
i kjøkken bar Stenner.
Ellers den forlegner ny Sømme for Vinpleier. Ikke den gaaer ny Tømmerend,
de drager sig Sømme ny igen Sømme uden med Blomster, ved Stenpynbr
varme de Vinpleier for Kulden, og den Tømmerne for Torr.
Bryum hypnoides voxer vellner paa Den Kiøgner og fasten sig i Jorden.

Algæ

15. Marcantia polymorpha bør spelns paa en paad Gallerden, naar
den Tømmer Blomsten for at den pollen bevæg sig
16. Lichen calcareus og saxatilis det er benyndelse paa Plandet
men ved vig den Calcareus ikkje paa Kalk Stenen og saxatilis ikkje
paa grøner Stenen med Mur fort myg vedy.
3. Parlareus Vestgotter farven ved gjerd Mur, Sødr den
med gren de den Blomer gandser vid, farven er det lager paa roxella.
4. Islandicus Kulsklaben ved Mur bør i det Bonsen og Skogen
Dem paa steile Bjerge, og paa Fisker voxer, den purgerer og ønsker
til Sykd. Den Ford Ønsker den i Forsø i Vand, og Drager det bort, det
er sin vis purgans, Lægen siger med Ostrillog Vand.
5. Pulmonarius voxer den paa gamle Træer og Træ, til Stamme de signatura
plantarum mere i Brug. Den er yderlig i gulle fat mere ny i Lungesot.
6. Prunastri voxer paa prunus spinosa i Ostrugen. Tørrede
terede den er det til Sudr.
7. Aphtosus Larver til Kunn som er Kommer i Ostrugen Den kan mere
end Adrim. end anthelmintica, men med end Drum.
8. Caninus er Dem en mere Lindrig grøgrum Stoene og Mead som
recommenderede infusum med galler Sudens bed.
9. 10. 11. Velleus, Deustus, et pustulatus gjem for ved Forven.

12. Scyphiferi nu recommendere med hiffosten, men grøn ingen Lung.
13. Frangiferinus I Indien voxer nu ikke arbores, men kun herba, i regiokibus frigidioribus, nu ikke gramina, i summo septentrione nu ikke muscos, og i frigidissimis nu ikke algæ. I Lapmarken fanes mere Hjortekød end Stærkelse gemt af den Lichen rangiferinus, som er Lappernes Agerdyrk. Ingen formue fole sig i Huse. Friedrichs Lichen fanes brændt Skorpe op, da de ikke 16 Aar havde haft Brød og Øl. Vesterbothningerne bruger det grim for Kød og Øl, da de have lidt Brød paa gamle Stærkelse blomme med rogfa lua.
14. Barbatus bruges, lappernes naar de ere fundne.
15 Vulpinus kaldes Ulvelav
16. Floridus voxer kun paa Bøge ved den speciesserte.
17. Tremella juniperina Naar det ingen ved Vaarsen finder noget lige som et brunt gelie, det er frøbes i et Glas, da det fuldvorne paa podagrici og grimme Ihuind, ikke skiøldt Uladis laus blev cureret.
18. Auricula alene de bruge medicamenter naar Øyet er zo Hjertelig den i Ørenet Vand og lagde paa Øyne ved Inflamationen. I Island bruges den som gargarisma
18. Fuci Ligger ved Havstrandenen og bryde Bølgerne. Drunken ikke den. Det lagde paa Vand Øyne i et ny Vand nu det dem bort.
1. Buccinalis (Trompel Grøst) Rauhinus den Første botanicus i sin Tid kan ej sende det, og ej nogen Botanicus ikke forunden det Caput bonæspei, hvor det Øyne, ny og Øyne langt. Det ikke er ved basis Øyet, som en lille Finger, og Øyne, det Øyne og Øyne, som en Ærme. Fuden i den Snil og er conglence som Ender. Fuden ligesom et Øyne, naar de Fuden vendt ved Basin som de Øyne Øyet som i en Lænke. Naar det kommer til sin Fuldkommenhed dreger det sig sammen som en Lancet og solid. Paa Fuden er der en lancet udgang Blade ved en Ærnus Lengde, og Ærnus Bende, de ere inlegerima, og paa mangeat de Øyne en Snil Grøst.
19. Ulva Intestinalis voxer langt under Vand og Øyne op til Strømmen. I Skaane voxer den paa Øyne Øyne Øyne det er en Øyne Øyne. Øyne Øyne og en Øyne Øyne, voxer paa den voxen Øyne.

30. Byssus jolithus er nemmen med Skynnen i Skorn med underliggende lysgrøn farve og blod, hvilken Stenen mineralogi kalder lapides violacei. Ung. er meen skyggen med grønne blizne skygtul, og ligner som viol. Stenbremen quabelse er at meen altid finder det under sten og stenen ~~som~~ imellem, saa at den under dette er komen op. Efter nogle dage blev den graa og er da byssus saxatilis.

2. Mosaqua En lidet gran grønt og rundt lysgrøn graat, der er fæstnet med, det gaar med sine stok og op sine tog.

3. Phosphorea Det er en ved det som efter en regn er dagen fungus.

Fungi

21. Agaricus piperatus er hvid med hvide lameller, er brydes meen sorendt saa som en Ostnik ud. Afbrænd af den.

2. Cantarellus Lamellerne springer ned for caulis. Farven er delicateste Gummen.

3. Deliciosus Som gul Ostnik fig.

4. Muscarius Hat og hed pileus. Den er lysgrøn skrøbe med hvide gran fig. er nu op den giftigste Svampen. Den meen skonder og ligger den saar i nu skrøbe, laver den staar 14 Dage, saa bliver den et liquamen. Det liquamen er et som den bedste Middel imod Daggrøus, man skyder det i springvandet for den opfølde fig. For Kuer er det ogsaa, man skaber da afgjøt saa. Den er meget farlig saa lave ikke, men yngen er ikke giftige.

5. Overcinus bruges nu ofte stemmen blod med, hvilket i lange tider er blevet i brug for Salamanderne.

22. Boletus bovinus naar Kornet begynder i ligge, saa er denne meget vogne, saa bliver Middelen syg og vanvittig.

23. Phallus impudicus ret et liquamen mennen nu penis med Skuer.

2. Esculentus Pileus er spiselig.

24. Rezza lentifera, den saa kalder Svoer og Svor, men der er et Svadt Ostnik i den, som saaer fig.

25. Lycoperdon bovista bruges ofte ligge Hovmelse. Den dogne ovn den Kommer i Dynd som meen bliver blevet, men ny for efter nogle dage, naar Vaaren. Boerhave siger at det er en Gift under Ligen om den Kommer i Ostarne. Forden bedre chamorhagier.

25. Tuber vopner gaaer fornemlig imellem Tænderne. Ligner en hirsutus, den gamle Forfatter det dog ikke var en Svamp.

26. Mucor unctuosus er det fornemste af en Svamp i denne Slægt. Det er et Stykke med Dage, er det kogt vitriol, og fremgaar paa saa lange Grundene en lugtig, der er ny kommen i Huset. Er den ikke af en vopn, og det fremkaldt Epilepsiam, forlænger det Flaadens.

Pedunculi simplices erecti interdum erecti, plurimi, parum curvati, vaginati glabri, elegantissime coccinei scapo crassiores et palma raro huthamo longiores in spica solitaria patentiuscula parum curvata terminati. In spicam solitariam strobili formam strobili ovato oblongi, acuti ex bracteis rotundatis, imbricatis, magnis connati Bracteis ad apices rotundatis, integerrimis leviter striatis, subcoriaceis coccineis. Flores singuli inter singulas bracteas, sessiles receptaculo communi adnati.

Calyx spatha diphylla, alterna, oblonga, nervis notata, membranacea, pallescens, subaequalis, tubo floris dimidio breviores.

Corolla monopetala irregularis. Tubus erectus, curvatus, aequalis, glaber albus, longitudine bractearum infra faucem parum crassior. Limbus obliquus quadripartitus laciniis superior erecta, planiuscula, oblonga, acuta, integerrima, nervis plenimq striata, alba. Inferiores duae patentes magis connatae, approximatae, lanceolatae, acutae, glabrae albae, nervisq striatae, longitudine superiorum aequales, infra divisuras labio seu laciniae interiori dorso longitudinaliter adnatae. Lacinia 4ta interior basi in tubum cum superiori connata, patens ovata, acuta, planiuscula basi bilabiata pincta sanguinei ac albis maculis lineolisq marmorea, reliquis multo latior, longitudine prioribus aequalis.

Stamen filamentum unicum, planiusculum, faucis ad laciniam superiorem adnatum, breve, coloratum, coccineum.

Anthera oblonga, compressiuscula magna apice corniculata, dorso convexo, glabra, alba, pagina interiori sulco divisa pollinifera.

Cornu filiforme, incurvatum, glabrum, apice minutissime sulcoque bifidum, coloratum, longitudine anthera purpureum, terminata petalo interiori brevior.

Pistillum germen inferum, oblongum, parvum, album. Stylus intra tubum capillaceus postea intra rimam anthera dein extra corum vix eoq longior, glaber albus. Stigma cum panulatum, ciliatum, album mediocri magnitudine.

Pericarpium capsula compressiuscula, parabolica, apicibus obtusiusculis pagina exteriori convexa interiori planiuscula, bilocularis polysperma (q vel plura)

semina angulosa

Amomum littorale

Radices nodosae, articulatae, filis filiformibus obnatae aromaticae.

Caules plurimi simplicissimi, teretes erecti, supra radicem clavati et globosi, glabri, singula vagina inclusi, postea vaginis 3. vel 5 alternis, remotis ante caulem adnatis, apicibus oblongis marginatis, ciliatis, adpressis viridibus usq ad 3tam partem caulis vaginati aphyllis ad apicem nutantibus homine altiores

Fotografisk gjengivelse av en side i et forelesningshefte, skrevet av M. Vahl under hans Upsala-opphold. (Originalen i Det. kgl. bibliotek, Kjøbenhavn)